تعرفه خدمات آزمایشگاهی سال 1400(قیمت ها به تومان میباشد)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اداره اقتصاد سلامت

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی | # | ۸۰۰۰۰۵ | ۱,۲۵۳ | ۸۷۷ | ۴,۵۰۸ | ۳,۶۳۱ | ۱,۹۸۸ | ۱,۱۱۱ | ۲,۳۱۷ | ۱,۴۴۰ |
| خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت | # | ۸۰۰۰۱۰ | ۲,۲۵۴ | ۱,۵۷۸ | ۵,۹۹۰ | ۴,۴۱۳ | ۳,۷۶۰ | ۲,۱۸۳ | ۴,۴۲۵ | ۲,۸۴۸ |
| خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء | # | ۸۰۰۰۱۲ | ۴,۷۲۴ | ۳,۳۰۶ | ۱۳,۸۱۵ | ۱۰,۵۰۹ | ۷,۷۷۰ | ۴,۴۶۴ | ۹,۱۲۰ | ۵,۸۱۴ |
| خونگیری وریدی از کودکان زیر ۵ سال | # | ۸۰۰۰۱۵ | ۴,۲۹۳ | ۳,۰۰۴ | ۱۰,۱۴۵ | ۷,۱۴۱ | ۷,۲۷۰ | ۴,۲۶۶ | ۸,۵۸۰ | ۵,۵۷۶ |
| خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر ۵ سال | # | ۸۰۰۰۱۷ | ۶,۰۸۳ | ۴,۲۵۷ | ۱۶,۵۸۵ | ۱۲,۳۲۸ | ۱۰,۱۱۰ | ۵,۸۵۳ | ۱۱,۸۹۰ | ۷,۶۳۳ |
| جمع آوری نمونه ترشحات واژن، پروستات یا مجرای ادراری | # | ۸۰۰۰۲۰ | ۳,۱۴۹ | ۲,۲۰۴ | ۹,۲۱۰ | ۷,۰۰۶ | ۵,۱۸۰ | ۲,۹۷۶ | ۶,۰۸۰ | ۳,۸۷۶ |
| جمع‌آوری ترشحات نوک پستان | # | ۸۰۰۰۲۵ | ۱,۵۷۵ | ۱,۱۰۲ | ۴,۶۰۵ | ۳,۵۰۳ | ۲,۵۹۰ | ۱,۴۸۸ | ۳,۰۴۰ | ۱,۹۳۸ |
| اندازه‌گیری کمّی حجم ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین | # | ۸۰۰۰۳۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۲۸۸ | ۵,۹۸۳ | ۴,۶۹۵ | ۲,۹۷۴ | ۱,۶۸۶ | ۳,۴۷۹ | ۲,۱۹۱ |
| جمع‌آوری شیره معده یا دوازدهه یک نوبت | # | ۸۰۰۰۳۵ | ۳,۲۷۲ | ۲,۲۹۰ | ۱۱,۱۳۵ | ۸,۸۴۵ | ۵,۲۴۶ | ۲,۹۵۶ | ۶,۱۲۷ | ۳,۸۳۷ |
| جمع‌آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مواد محرک مشابه | # | ۸۰۰۰۴۰ | ۴,۱۲۴ | ۲,۸۸۶ | ۱۳,۹۸۸ | ۱۱,۱۰۲ | ۶,۶۱۶ | ۳,۷۳۰ | ۷,۷۲۸ | ۴,۸۴۲ |
| نمونه‌گیری از ضایعات قارچی، گال، لیشمانیا و موارد مشابه | # | ۸۰۰۰۴۵ | ۳,۱۴۹ | ۲,۲۰۴ | ۹,۲۱۰ | ۷,۰۰۶ | ۵,۱۸۰ | ۲,۹۷۶ | ۶,۰۸۰ | ۳,۸۷۶ |
| آزمایش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص‌های دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتون‌ها، لوکوسیت‌ها، نیتریت، PH، وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی با یا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ویژگی های ماکروسکوپی و تجسس میکروسکوپی | # | ۸۰۰۲۰۰ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار ، حداکثر تا ۲ آزمایش، هر کدام | # | ۸۰۰۲۰۵ | ۱,۳۴۶ | ۹۴۲ | ۴,۴۱۸ | ۳,۴۷۶ | ۲,۱۷۲ | ۱,۲۳۰ | ۲,۵۴۰ | ۱,۵۹۸ |
| آزمایش تجسس میکروسکوپی ادرار به تنهایی | # | ۸۰۰۲۱۰ | ۱,۳۴۶ | ۹۴۲ | ۴,۴۱۸ | ۳,۴۷۶ | ۲,۱۷۲ | ۱,۲۳۰ | ۲,۵۴۰ | ۱,۵۹۸ |
| اندازه گیری کمّی وزن مخصوص ادرار | # | ۸۰۰۲۱۵ | ۱,۳۴۶ | ۹۴۲ | ۴,۴۱۸ | ۳,۴۷۶ | ۲,۱۷۲ | ۱,۲۳۰ | ۲,۵۴۰ | ۱,۵۹۸ |
| اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی میکروآلبومینوری با نوار تست یا سایر روشها | # | ۸۰۰۲۲۰ | ۲,۸۲۸ | ۱,۹۷۹ | ۹,۱۱۳ | ۷,۱۳۴ | ۴,۵۷۸ | ۲,۵۹۹ | ۵,۳۵۷ | ۳,۳۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی پروتئین در ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین | # | ۸۰۰۲۲۵ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی و حرارتی | # | ۸۰۰۲۳۰ | ۲,۶۹۲ | ۱,۸۸۴ | ۸,۸۳۶ | ۶,۹۵۲ | ۴,۳۴۴ | ۲,۴۶۰ | ۵,۰۸۰ | ۳,۱۹۶ |
| اندازه گیری کمّی هموگلوبین، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار به روش غیر آنزیمی | # | ۸۰۰۲۳۵ | ۲,۳۷۷ | ۱,۶۶۴ | ۷,۹۱۵ | ۶,۲۵۱ | ۳,۸۲۶ | ۲,۱۶۲ | ۴,۴۷۲ | ۲,۸۰۸ |
| اندازه گیری کیفی اوروبیلینوژن ادرار | # | ۸۰۰۲۴۰ | ۲,۳۷۷ | ۱,۶۶۴ | ۷,۹۱۵ | ۶,۲۵۱ | ۳,۸۲۶ | ۲,۱۶۲ | ۴,۴۷۲ | ۲,۸۰۸ |
| اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن ادرار | # | ۸۰۰۲۵۰ | ۲,۳۷۷ | ۱,۶۶۴ | ۷,۹۱۵ | ۶,۲۵۱ | ۳,۸۲۶ | ۲,۱۶۲ | ۴,۴۷۲ | ۲,۸۰۸ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش کیفی کلرید فریک برای غربالگری بیماریهای متابولیک ژنتیکی از جمله PKU (تجسس اسید فنیل پیرویک) در ادرار | # | ۸۰۰۲۵۵ | ۳,۶۷۹ | ۲,۵۷۵ | ۱۱,۹۶۶ | ۹,۳۹۱ | ۵,۹۴۸ | ۳,۳۷۳ | ۶,۹۵۸ | ۴,۳۸۳ |
| آزمایش کیفی/نیمه کمّی برای غربالگری الکاپتونوری (تجسس اسید هموژنتیسیک) در ادرار | # | ۸۰۰۲۶۰ | ۵,۳۳۴ | ۳,۷۳۳ | ۱۸,۱۲۹ | ۱۴,۳۹۶ | ۸,۵۵۴ | ۴,۸۲۱ | ۹,۹۹۱ | ۶,۲۵۸ |
| اندازه‌گیری کمّی مس سرم | # | ۸۰۰۲۶۵ | ۵,۸۷۷ | ۴,۱۱۴ | ۱۹,۲۳۷ | ۱۵,۱۲۳ | ۹,۴۹۰ | ۵,۳۷۶ | ۱۱,۰۹۹ | ۶,۹۸۵ |
| اندازه‌گیری کمّی مس ادرار ۲۴ ساعته | # | ۸۰۰۲۶۶ | ۵,۸۷۷ | ۴,۱۱۴ | ۱۹,۲۳۷ | ۱۵,۱۲۳ | ۹,۴۹۰ | ۵,۳۷۶ | ۱۱,۰۹۹ | ۶,۹۸۵ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تیروزین ادرار | # | ۸۰۰۲۷۰ | ۵,۸۷۷ | ۴,۱۱۴ | ۱۹,۲۳۷ | ۱۵,۱۲۳ | ۹,۴۹۰ | ۵,۳۷۶ | ۱۱,۰۹۹ | ۶,۹۸۵ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی سیستین و هموسیستین ادرار | # | ۸۰۰۲۷۵ | ۵,۶۰۵ | ۳,۹۲۴ | ۱۸,۶۸۳ | ۱۴,۷۶۰ | ۹,۰۲۲ | ۵,۰۹۹ | ۱۰,۵۴۵ | ۶,۶۲۲ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی هموسیستین ادرار | # | ۸۰۰۲۸۰ | ۲,۵۵۶ | ۱,۷۸۹ | ۸,۵۵۹ | ۶,۷۷۰ | ۴,۱۱۰ | ۲,۳۲۱ | ۴,۸۰۳ | ۳,۰۱۴ |
| تجسس میکروسکوپی گلبول قرمز دیسمورفیک در ادرار | # | ۸۰۰۲۹۰ | ۲,۶۹۲ | ۱,۸۸۴ | ۸,۸۳۶ | ۶,۹۵۲ | ۴,۳۴۴ | ۲,۴۶۰ | ۵,۰۸۰ | ۳,۱۹۶ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی مواد احیا کننده در ادرار | #* | ۸۰۰۲۹۵ | ۳,۸۵۸ | - | ۱۲,۶۱۰ | ۱۲,۶۱۰ | ۶,۲۳۲ | ۶,۲۳۲ | ۷,۲۸۹ | ۷,۲۸۹ |
| تجسس میکروسکوپی دانه‌های متاکروماتیک در ادرار | #* | ۸۰۰۳۰۰ | ۲,۵۱۳ | - | ۸,۱۹۲ | ۸,۱۹۲ | ۴,۰۶۰ | ۴,۰۶۰ | ۴,۷۴۹ | ۴,۷۴۹ |
| آزمایش Addis Count | #* | ۸۰۰۳۰۵ | ۵,۶۹۸ | - | ۱۸,۵۹۳ | ۱۸,۵۹۳ | ۹,۲۰۶ | ۹,۲۰۶ | ۱۰,۷۶۸ | ۱۰,۷۶۸ |
| اندازه‌گیری کمّی اکسالات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته | #* | ۸۰۰۳۱۵ | ۹,۵۱۳ | - | ۳۰,۸۳۶ | ۳۰,۸۳۶ | ۱۵,۳۸۸ | ۱۵,۳۸۸ | ۱۸,۰۰۳ | ۱۸,۰۰۳ |
| اندازه گیری کمّی سیترات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته | #* | ۸۰۰۳۲۰ | ۱۹,۰۷۰ | - | ۶۲,۰۳۹ | ۶۲,۰۳۹ | ۳۰,۸۲۶ | ۳۰,۸۲۶ | ۳۶,۰۶۰ | ۳۶,۰۶۰ |
| اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۰۰ | ۲,۹۶۳ | ۲,۰۷۴ | ۹,۳۹۰ | ۷,۳۱۶ | ۴,۸۱۲ | ۲,۷۳۸ | ۵,۶۳۴ | ۳,۵۶۰ |
| اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم/پلاسما، ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp) | # | ۸۰۰۴۰۵ | ۳,۵۹۳ | ۲,۵۱۵ | ۱۱,۲۳۲ | ۸,۷۱۷ | ۵,۸۴۸ | ۳,۳۳۳ | ۶,۸۵۰ | ۴,۳۳۵ |
| آزمایش تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (G TT) | # | ۸۰۰۴۱۰ | ۱۰,۰۵۰ | ۷,۰۳۵ | ۳۲,۷۶۸ | ۲۵,۷۳۳ | ۱۶,۲۴۰ | ۹,۲۰۵ | ۱۸,۹۹۶ | ۱۱,۹۶۱ |
| اندازه گیری کمّی اوره خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۱۵ | ۲,۶۴۹ | ۱,۸۵۴ | ۸,۴۶۹ | ۶,۶۱۵ | ۴,۲۹۴ | ۲,۴۴۰ | ۵,۰۲۶ | ۳,۱۷۲ |
| اندازه گیری کمّی اوره ادار | # | ۸۰۰۴۱۶ | ۲,۶۴۹ | ۱,۸۵۴ | ۸,۴۶۹ | ۶,۶۱۵ | ۴,۲۹۴ | ۲,۴۴۰ | ۵,۰۲۶ | ۳,۱۷۲ |
| اندازه گیری کمّی کراتینین خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۲۰ | ۳,۳۲۱ | ۲,۳۲۵ | ۱۰,۶۷۸ | ۸,۳۵۳ | ۵,۳۸۰ | ۳,۰۵۵ | ۶,۲۹۶ | ۳,۹۷۱ |
| اندازه گیری کمّی کراتینین ادرار | # | ۸۰۰۴۲۱ | ۳,۳۲۱ | ۲,۳۲۵ | ۱۰,۶۷۸ | ۸,۳۵۳ | ۵,۳۸۰ | ۳,۰۵۵ | ۶,۲۹۶ | ۳,۹۷۱ |
| اندازه گیری کمّی اسید اوریک خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۲۵ | ۳,۳۲۱ | ۲,۳۲۵ | ۱۰,۶۷۸ | ۸,۳۵۳ | ۵,۳۸۰ | ۳,۰۵۵ | ۶,۲۹۶ | ۳,۹۷۱ |
| اندازه گیری کمّی اسید اوریک ادرار | # | ۸۰۰۴۲۶ | ۳,۳۲۱ | ۲,۳۲۵ | ۱۰,۶۷۸ | ۸,۳۵۳ | ۵,۳۸۰ | ۳,۰۵۵ | ۶,۲۹۶ | ۳,۹۷۱ |
| اندازه گیری کمّی تری‌گلیسیرید در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۳۰ | ۴,۴۴۵ | ۳,۱۱۱ | ۱۴,۰۸۵ | ۱۰,۹۷۴ | ۷,۲۱۸ | ۴,۱۰۷ | ۸,۴۵۱ | ۵,۳۴۰ |
| اندازه گیری کمّی کلسترول در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۳۵ | ۳,۳۲۱ | ۲,۳۲۵ | ۱۰,۶۷۸ | ۸,۳۵۳ | ۵,۳۸۰ | ۳,۰۵۵ | ۶,۲۹۶ | ۳,۹۷۱ |
| اندازه‌گیری کمّی HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۴۰ | ۴,۳۰۹ | ۳,۰۱۶ | ۱۳,۸۰۸ | ۱۰,۷۹۲ | ۶,۹۸۴ | ۳,۹۶۸ | ۸,۱۷۴ | ۵,۱۵۸ |
| اندازه‌گیری کمّی LDL- Cholesterol در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۴۵ | ۴,۷۶۰ | ۳,۳۳۲ | ۱۵,۰۰۶ | ۱۱,۶۷۴ | ۷,۷۳۶ | ۴,۴۰۴ | ۹,۰۵۹ | ۵,۷۲۷ |
| اندازه‌گیری کمّی سدیم خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۶۰ | ۳,۷۷۲ | ۲,۶۴۰ | ۱۱,۸۷۶ | ۹,۲۳۶ | ۶,۱۳۲ | ۳,۴۹۲ | ۷,۱۸۱ | ۴,۵۴۱ |
| اندازه‌گیری کمّی سدیم ادرار | # | ۸۰۰۴۶۱ | ۳,۷۷۲ | ۲,۶۴۰ | ۱۱,۸۷۶ | ۹,۲۳۶ | ۶,۱۳۲ | ۳,۴۹۲ | ۷,۱۸۱ | ۴,۵۴۱ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه‌گیری کمّی پتاسیم خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۶۵ | ۳,۷۷۲ | ۲,۶۴۰ | ۱۱,۸۷۶ | ۹,۲۳۶ | ۶,۱۳۲ | ۳,۴۹۲ | ۷,۱۸۱ | ۴,۵۴۱ |
| اندازه‌گیری کمّی پتاسیم ادرار | # | ۸۰۰۴۶۶ | ۳,۷۷۲ | ۲,۶۴۰ | ۱۱,۸۷۶ | ۹,۲۳۶ | ۶,۱۳۲ | ۳,۴۹۲ | ۷,۱۸۱ | ۴,۵۴۱ |
| اندازه‌گیری کمّی کلر خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۷۰ | ۳,۶۷۹ | ۲,۵۷۵ | ۱۱,۹۶۶ | ۹,۳۹۱ | ۵,۹۴۸ | ۳,۳۷۳ | ۶,۹۵۸ | ۴,۳۸۳ |
| اندازه‌گیری کمّی کلر ادرار | # | ۸۰۰۴۷۱ | ۳,۶۷۹ | ۲,۵۷۵ | ۱۱,۹۶۶ | ۹,۳۹۱ | ۵,۹۴۸ | ۳,۳۷۳ | ۶,۹۵۸ | ۴,۳۸۳ |
| اندازه‌گیری کمّی دی اکسیدکربن یا بی‌کربنات | # | ۸۰۰۴۷۵ | ۳,۴۰۸ | ۲,۳۸۵ | ۱۱,۴۱۲ | ۹,۰۲۷ | ۵,۴۸۰ | ۳,۰۹۵ | ۶,۴۰۴ | ۴,۰۱۹ |
| اندازه گیری کمّی لیتیم سرم | # | ۸۰۰۴۸۰ | ۴,۰۳۷ | ۲,۸۲۶ | ۱۳,۲۵۴ | ۱۰,۴۲۸ | ۶,۵۱۶ | ۳,۶۹۰ | ۷,۶۲۰ | ۴,۷۹۴ |
| اندازه گیری کمّی کلسیم سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۸۵ | ۴,۰۸۷ | ۲,۸۶۱ | ۱۲,۷۹۷ | ۹,۹۳۶ | ۶,۶۵۰ | ۳,۷۸۹ | ۷,۷۸۹ | ۴,۹۲۸ |
| اندازه گیری کمّی کلسیم ادرار | # | ۸۰۰۴۸۶ | ۴,۰۸۷ | ۲,۸۶۱ | ۱۲,۷۹۷ | ۹,۹۳۶ | ۶,۶۵۰ | ۳,۷۸۹ | ۷,۷۸۹ | ۴,۹۲۸ |
| اندازه گیری کمّی کلسیم یونیزه خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۹۰ | ۳,۷۶۶ | ۲,۶۳۶ | ۱۲,۷۰۰ | ۱۰,۰۶۴ | ۶,۰۴۸ | ۳,۴۱۲ | ۷,۰۶۶ | ۴,۴۳۰ |
| اندازه گیری کمّی فسفر سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۴۹۵ | ۳,۴۵۷ | ۲,۴۲۰ | ۱۰,۹۵۵ | ۸,۵۳۵ | ۵,۶۱۴ | ۳,۱۹۴ | ۶,۵۷۳ | ۴,۱۵۳ |
| اندازه گیری کمّی ادرار | # | ۸۰۰۴۹۶ | ۳,۴۵۷ | ۲,۴۲۰ | ۱۰,۹۵۵ | ۸,۵۳۵ | ۵,۶۱۴ | ۳,۱۹۴ | ۶,۵۷۳ | ۴,۱۵۳ |
| اندازه‌گیری کمّی آهن سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۰۰ | ۴,۵۳۸ | ۳,۱۷۶ | ۱۳,۹۹۵ | ۱۰,۸۱۹ | ۷,۴۰۲ | ۴,۲۲۶ | ۸,۶۷۴ | ۵,۴۹۸ |
| اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC) | # | ۸۰۰۵۰۵ | ۵,۷۴۸ | ۴,۰۲۳ | ۱۸,۱۳۶ | ۱۴,۱۱۳ | ۹,۳۴۰ | ۵,۳۱۷ | ۱۰,۹۳۷ | ۶,۹۱۴ |
| اندازه گیری کمی پروتئین خون | # | ۸۰۰۵۱۰ | ۳,۴۵۷ | ۲,۴۲۰ | ۱۰,۹۵۵ | ۸,۵۳۵ | ۵,۶۱۴ | ۳,۱۹۴ | ۶,۵۷۳ | ۴,۱۵۳ |
| اندازه گیری کمی آلبومین خون | # | ۸۰۰۵۱۵ | ۳,۴۵۷ | ۲,۴۲۰ | ۱۰,۹۵۵ | ۸,۵۳۵ | ۵,۶۱۴ | ۳,۱۹۴ | ۶,۵۷۳ | ۴,۱۵۳ |
| اندازه‌گیری کمّی پروتئین توتال سرم و تعیین نسبت آلبومین به گلوبولین | # | ۸۰۰۵۲۰ | ۸,۲۲۴ | ۵,۷۵۶ | ۲۵,۱۳۷ | ۱۹,۳۸۱ | ۱۳,۴۳۴ | ۷,۶۷۸ | ۱۵,۷۴۷ | ۹,۹۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین سرم/پلاسما (شامل بیلیروبین توتال و مستقیم) | # | ۸۰۰۵۲۵ | ۶,۴۶۴ | ۴,۵۲۴ | ۲۰,۷۱۲ | ۱۶,۱۸۸ | ۱۰,۴۷۶ | ۵,۹۵۲ | ۱۲,۲۶۱ | ۷,۷۳۷ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ((AST SGOT در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۳۰ | ۴,۰۸۷ | ۲,۸۶۱ | ۱۲,۷۹۷ | ۹,۹۳۶ | ۶,۶۵۰ | ۳,۷۸۹ | ۷,۷۸۹ | ۴,۹۲۸ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ((ALT SGPT در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۳۵ | ۴,۰۸۷ | ۲,۸۶۱ | ۱۲,۷۹۷ | ۹,۹۳۶ | ۶,۶۵۰ | ۳,۷۸۹ | ۷,۷۸۹ | ۴,۹۲۸ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۴۰ | ۴,۰۸۷ | ۲,۸۶۱ | ۱۲,۷۹۷ | ۹,۹۳۶ | ۶,۶۵۰ | ۳,۷۸۹ | ۷,۷۸۹ | ۴,۹۲۸ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز توتال (ACP) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۴۵ | ۴,۳۵۲ | ۳,۰۴۶ | ۱۴,۱۷۵ | ۱۱,۱۲۹ | ۷,۰۳۴ | ۳,۹۸۸ | ۸,۲۲۸ | ۵,۱۸۲ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز پروستاتیک در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۵۰ | ۷,۰۴۴ | ۴,۹۳۰ | ۲۳,۰۱۱ | ۱۸,۰۸۱ | ۱۱,۳۷۸ | ۶,۴۴۸ | ۱۳,۳۰۸ | ۸,۳۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز ((LD LDH در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۵۵ | ۱۲,۱۲۵ | ۸,۴۸۷ | ۳۸,۱۱۴ | ۲۹,۶۲۷ | ۱۹,۷۱۶ | ۱۱,۲۲۹ | ۲۳,۰۹۰ | ۱۴,۶۰۳ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز ((LD LDH در مایعات بدن | # | ۸۰۰۵۵۶ | ۱۲,۱۲۵ | ۸,۴۸۷ | ۳۸,۱۱۴ | ۲۹,۶۲۷ | ۱۹,۷۱۶ | ۱۱,۲۲۹ | ۲۳,۰۹۰ | ۱۴,۶۰۳ |
| اندازه‌گیری کمّی ایزوآنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز (LD) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۶۰ | ۱۶,۲۲۳ | ۱۱,۳۵۵ | ۵۵,۳۹۸ | ۴۴,۰۴۳ | ۲۵,۹۹۶ | ۱۴,۶۴۱ | ۳۰,۳۵۸ | ۱۹,۰۰۳ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز CK (CPK) توتال در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۶۵ | ۱۵,۵۷۶ | ۱۰,۹۰۲ | ۴۹,۸۹۳ | ۳۸,۹۹۱ | ۲۵,۲۴۶ | ۱۴,۳۴۴ | ۲۹,۵۴۸ | ۱۸,۶۴۶ |
| اندازه‌گیری کمی ایزو آنزیم کراتین فسفوکیناز CPK-MB در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۷۰ | ۱۳,۰۹۳ | ۹,۱۶۵ | ۴۳,۷۱۶ | ۳۴,۵۵۱ | ۲۱,۰۶۸ | ۱۱,۹۰۳ | ۲۴,۶۲۳ | ۱۵,۴۵۸ |
| اندازه‌گیری کمی CPK_MB_MASS | #* | ۸۰۰۵۷۱ | ۲۹,۵۶۸ | - | ۱۰۲,۱۴۰ | ۱۰۲,۱۴۰ | ۴۷,۲۸۰ | ۴۷,۲۸۰ | ۵۵,۱۹۰ | ۵۵,۱۹۰ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آلدولاز در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۷۵ | ۹,۲۴۲ | ۶,۴۶۹ | ۳۰,۲۸۲ | ۲۳,۸۱۳ | ۱۴,۹۲۰ | ۸,۴۵۱ | ۱۷,۴۴۹ | ۱۰,۹۸۰ |
| آزمایش بررسی فعالیت آنزیم G۶PD گلبول قرمز | # | ۸۰۰۵۸۰ | ۱۴,۸۱۷ | ۱۰,۳۷۱ | ۴۶,۹۵۰ | ۳۶,۵۷۹ | ۲۴,۰۶۰ | ۱۳,۶۸۹ | ۲۸,۱۷۰ | ۱۷,۷۹۹ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۸۵ | ۹,۲۰۵ | ۶,۴۴۳ | ۲۹,۰۹۱ | ۲۲,۶۴۸ | ۱۴,۹۵۴ | ۸,۵۱۱ | ۱۷,۵۱۰ | ۱۱,۰۶۷ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در ادرار | # | ۸۰۰۵۸۶ | ۹,۲۰۵ | ۶,۴۴۳ | ۲۹,۰۹۱ | ۲۲,۶۴۸ | ۱۴,۹۵۴ | ۸,۵۱۱ | ۱۷,۵۱۰ | ۱۱,۰۶۷ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لیپاز در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۹۰ | ۸,۹۲۷ | ۶,۲۴۸ | ۲۹,۳۶۱ | ۲۳,۱۱۳ | ۱۴,۴۰۲ | ۸,۱۵۴ | ۱۶,۸۴۱ | ۱۰,۵۹۳ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۵۹۵ | ۶,۳۷۱ | ۴,۴۵۹ | ۲۰,۸۰۲ | ۱۶,۳۴۳ | ۱۰,۲۹۲ | ۵,۸۳۳ | ۱۲,۰۳۸ | ۷,۵۷۹ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم سوربیتول دهیدروژناز در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۰۰ | ۵,۸۲۷ | ۴,۰۷۹ | ۱۹,۶۹۴ | ۱۵,۶۱۵ | ۹,۳۵۶ | ۵,۲۷۷ | ۱۰,۹۳۰ | ۶,۸۵۱ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز(GGT) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۰۵ | ۱۷,۹۵۹ | ۱۲,۵۷۱ | ۵۶,۹۸۴ | ۴۴,۴۱۴ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۶,۵۸۶ | ۳۴,۱۳۵ | ۲۱,۵۶۵ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز(LAP) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۱۰ | ۱۳,۹۸۲ | ۹,۷۸۷ | ۴۷,۷۶۰ | ۳۷,۹۷۳ | ۲۲,۴۰۴ | ۱۲,۶۱۷ | ۲۶,۱۶۳ | ۱۶,۳۷۶ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز(LAP) در ادرار و مایعات بدن | # | ۸۰۰۶۱۱ | ۱۳,۹۸۲ | ۹,۷۸۷ | ۴۷,۷۶۰ | ۳۷,۹۷۳ | ۲۲,۴۰۴ | ۱۲,۶۱۷ | ۲۶,۱۶۳ | ۱۶,۳۷۶ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ۵- نوکلئوتیداز (۵-NT) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۱۵ | ۱۳,۴۴۵ | ۹,۴۱۱ | ۴۵,۸۲۸ | ۳۶,۴۱۷ | ۲۱,۵۵۲ | ۱۲,۱۴۱ | ۲۵,۱۷۰ | ۱۵,۷۵۹ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز سرم | # | ۸۰۰۶۲۰ | ۳,۹۰۲ | ۲,۷۳۱ | ۱۲,۹۷۷ | ۱۰,۲۴۶ | ۶,۲۸۲ | ۳,۵۵۱ | ۷,۳۴۳ | ۴,۶۱۲ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز خون کامل | # | ۸۰۰۶۲۵ | ۴,۷۵۳ | ۳,۳۲۷ | ۱۵,۸۳۰ | ۱۲,۵۰۳ | ۷,۶۵۲ | ۴,۳۲۵ | ۸,۹۴۴ | ۵,۶۱۷ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۳۰ | ۲۲,۲۳۶ | ۱۵,۵۶۴ | ۷۴,۹۱۲ | ۵۹,۳۴۸ | ۳۵,۷۲۰ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۷۳۴ | ۲۶,۱۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در مایعات بدن | # | ۸۰۰۶۳۱ | ۲۲,۲۳۶ | ۱۵,۵۶۴ | ۷۴,۹۱۲ | ۵۹,۳۴۸ | ۳۵,۷۲۰ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۷۳۴ | ۲۶,۱۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی پپروات در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۳۵ | ۸,۳۸۰ | ۵,۸۶۵ | ۲۲,۹۴۲ | ۱۷,۰۷۷ | ۱۳,۹۲۰ | ۸,۰۵۵ | ۱۶,۳۶۹ | ۱۰,۵۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی لاکتات در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۴۰ | ۶,۸۸۵ | ۴,۸۱۹ | ۱۹,۸۹۵ | ۱۵,۰۷۶ | ۱۱,۳۴۶ | ۶,۵۲۷ | ۱۳,۳۲۲ | ۸,۵۰۳ |
| اندازه گیری کمّی فعالیت مورامیداز در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۴۵ | ۴,۴۸۲ | ۳,۱۳۷ | ۱۵,۲۷۶ | ۱۲,۱۳۹ | ۷,۱۸۴ | ۴,۰۴۷ | ۸,۳۹۰ | ۵,۲۵۳ |
| اندازه گیری کلیرانس کراتینین (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار) | # | ۸۰۰۶۵۰ | ۶,۸۶۵ | ۴,۸۰۵ | ۲۲,۳۶۷ | ۱۷,۵۶۲ | ۱۱,۰۹۴ | ۶,۲۸۹ | ۱۲,۹۷۷ | ۸,۱۷۲ |
| اندازه گیری کلیرانس اوره (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار) | # | ۸۰۰۶۵۵ | ۵,۲۰۴ | ۳,۶۴۳ | ۱۷,۰۲۸ | ۱۳,۳۸۵ | ۸,۴۰۴ | ۴,۷۶۱ | ۹,۸۲۹ | ۶,۱۸۶ |
| اندازه گیری کمّی هوموانیلیک اسید (HVA) به روش HPLC در ادرار | #* | ۸۰۰۶۶۰ | ۳۲,۲۶۳ | - | ۱۰۴,۸۴۱ | ۱۰۴,۸۴۱ | ۵۲,۱۶۲ | ۵۲,۱۶۲ | ۶۱,۰۲۱ | ۶۱,۰۲۱ |
| اندازه گیری هر آنالیت شیمی بالینی که در فهرست خدمات مشخص نشده است | #* | ۸۰۰۶۶۵ | ۴,۰۸۷ | - | ۱۲,۷۹۷ | ۱۲,۷۹۷ | ۶,۶۵۰ | ۶,۶۵۰ | ۷,۷۸۹ | ۷,۷۸۹ |
| اندازه گیری کمّی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۶۷۰ | ۳۲,۲۶۳ | ۲۲,۵۸۲ | ۱۰۴,۸۴۱ | ۸۲,۲۵۹ | ۵۲,۱۶۲ | ۲۹,۵۸۰ | ۶۱,۰۲۱ | ۳۸,۴۳۹ |
| اندازه گیری کمّی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در ادرار و مایعات بدن | # | ۸۰۰۶۷۱ | ۳۲,۲۶۳ | ۲۲,۵۸۲ | ۱۰۴,۸۴۱ | ۸۲,۲۵۹ | ۵۲,۱۶۲ | ۲۹,۵۸۰ | ۶۱,۰۲۱ | ۳۸,۴۳۹ |
| آزمایش چالش گلوکز (GCT) | # | ۸۰۰۶۷۵ | ۸,۰۳۲ | ۵,۶۲۲ | ۲۶,۱۴۱ | ۲۰,۵۱۹ | ۱۲,۹۸۲ | ۷,۳۶۰ | ۱۵,۱۸۶ | ۹,۵۶۴ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه گیری PH مایعات بدن به جز خون و ادرار | #* | ۸۰۰۶۸۰ | ۵,۳۴۰ | - | ۱۷,۳۰۵ | ۱۷,۳۰۵ | ۸,۶۳۸ | ۸,۶۳۸ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۱۰۶ |
| آزمایش الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار ،CSF) | # | ۸۰۰۷۰۰ | ۱۱۹,۶۹۷ | ۸۳,۷۸۴ | ۴۰۳,۰۹۰ | ۳۱۹,۳۰۶ | ۱۹۲,۳۰۰ | ۱۰۸,۵۱۶ | ۲۲۴,۶۸۰ | ۱۴۰,۸۹۶ |
| آزمایش الکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F به روش شیمیایی و هموگلوبین A ۲ به روش ستون توا ماً | # | ۸۰۰۷۰۵ | ۴۴,۰۲۰ | ۳۰,۸۱۱ | ۱۳۷,۱۸۰ | ۱۰۶,۳۶۹ | ۷۱,۶۸۰ | ۴۰,۸۶۹ | ۸۳,۹۷۰ | ۵۳,۱۵۹ |
| آزمایش الکتروفورز همـوگلوبین به روش سیترات آگار به منظور افتراق هموگلوبین‌های غیرطبیعی | # | ۸۰۰۷۱۰ | ۳۳,۸۷۴ | ۲۳,۷۱۰ | ۱۱۰,۶۳۷ | ۸۶,۹۲۷ | ۵۴,۷۱۸ | ۳۱,۰۰۸ | ۶۴,۰۰۰ | ۴۰,۲۹۰ |
| آزمایش کیفی ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار) | # | ۸۰۰۷۱۵ | ۳۰,۲۰۴ | ۲۱,۱۴۲ | ۱۰۳,۱۵۸ | ۸۲,۰۱۶ | ۴۸,۴۰۰ | ۲۷,۲۵۸ | ۵۶,۵۲۱ | ۳۵,۳۷۹ |
| اندازه گیری کمّی نسبت زنجیره‌های گلوبین به روش بیوسنتز In vitro | # | ۸۰۰۷۲۰ | ۳۳,۰۵۸ | ۲۳,۱۳۹ | ۱۰۸,۹۷۵ | ۸۵,۸۳۶ | ۵۳,۳۱۴ | ۳۰,۱۷۵ | ۶۲,۳۳۸ | ۳۹,۱۹۹ |
| اندازه گیری کمّی هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی | # | ۸۰۰۷۲۵ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| اندازه گیری کمّی هموگلوبین A ۲ به روش کروماتوگرافی ستونی | # | ۸۰۰۷۳۰ | ۱۴,۵۸۲ | ۱۰,۲۰۷ | ۴۷,۵۸۷ | ۳۷,۳۸۱ | ۲۳,۵۵۸ | ۱۳,۳۵۲ | ۲۷,۵۵۵ | ۱۷,۳۴۹ |
| آزمایش الکتروفورزیس پروتئین‌های سرم | # | ۸۰۰۷۳۵ | ۲۷,۱۸۸ | ۱۹,۰۳۰ | ۸۸,۹۱۴ | ۶۹,۸۸۴ | ۴۳,۹۰۸ | ۲۴,۸۷۸ | ۵۱,۳۵۴ | ۳۲,۳۲۴ |
| آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های ادرار | # | ۸۰۰۷۴۰ | ۳۳,۶۴۵ | ۲۳,۵۵۰ | ۱۱۰,۴۵۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۵۴,۳۰۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۳۹,۹۵۰ |
| آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های مایع نخاع | # | ۸۰۰۷۴۱ | ۳۳,۶۴۵ | ۲۳,۵۵۰ | ۱۱۰,۴۵۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۵۴,۳۰۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۳۹,۹۵۰ |
| آزمایش الکتروفورزیس زنجیره‌های گلوبین | # | ۸۰۰۷۴۵ | ۲۳,۴۵۲ | ۱۶,۴۱۶ | ۷۸,۲۲۹ | ۶۱,۸۱۳ | ۳۷,۷۴۲ | ۲۱,۳۲۶ | ۴۴,۱۱۲ | ۲۷,۶۹۶ |
| آزمایش الکتروفورزیس لیپوپروتئین‌های سرم | # | ۸۰۰۷۵۰ | ۲۱,۴۲۷ | ۱۴,۹۹۸ | ۷۲,۴۲۶ | ۵۷,۴۲۸ | ۳۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۰۲ | ۴۰,۱۸۷ | ۲۵,۱۸۹ |
| آزمایش الکتروفورزیس آپولیپوپروتئین ها سرم | # | ۸۰۰۷۵۵ | ۲۰,۸۶۷ | ۱۴,۶۰۶ | ۶۷,۶۵۵ | ۵۳,۰۵۰ | ۳۳,۷۵۰ | ۱۹,۱۴۵ | ۳۹,۴۸۵ | ۲۴,۸۸۰ |
| آزمایش ایمونو الکتروفورزیس سرم | # | ۸۰۰۷۶۰ | ۸۲,۵۵۱ | ۵۷,۷۸۲ | ۲۶۹,۸۷۲ | ۲۱۲,۰۹۰ | ۱۳۳,۳۲۸ | ۷۵,۵۴۶ | ۱۵۵,۹۴۰ | ۹۸,۱۵۸ |
| آزمایش ایمونو الکتروفورزیس ادرار | # | ۸۰۰۷۶۱ | ۸۲,۵۵۱ | ۵۷,۷۸۲ | ۲۶۹,۸۷۲ | ۲۱۲,۰۹۰ | ۱۳۳,۳۲۸ | ۷۵,۵۴۶ | ۱۵۵,۹۴۰ | ۹۸,۱۵۸ |
| آزمایش الکتروفورزیس برای تعیین ایزوآنزیم‌های CK، LD و آلکالن فسفاتاز | # | ۸۰۰۷۶۵ | ۲۳,۳۱۰ | ۱۶,۳۱۶ | ۷۸,۷۷۶ | ۶۲,۴۶۰ | ۳۷,۴۲۴ | ۲۱,۱۰۸ | ۴۳,۷۲۰ | ۲۷,۴۰۴ |
| آزمایش Current Immuno Electrophoresis) C C IE (Counter | # | ۸۰۰۷۷۰ | ۲۲,۸۱۶ | ۱۵,۹۷۰ | ۷۷,۲۱۱ | ۶۱,۲۴۱ | ۳۶,۶۲۲ | ۲۰,۶۵۲ | ۴۲,۷۸۱ | ۲۶,۸۱۱ |
| آزمایش اندازه گیری کیفی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC) | # | ۸۰۰۷۷۵ | ۳۱,۳۶۱ | ۲۱,۹۵۱ | ۱۰۲,۴۴۵ | ۸۰,۴۹۴ | ۵۰,۶۵۸ | ۲۸,۷۰۷ | ۵۹,۲۵۱ | ۳۷,۳۰۰ |
| آزمایش اندازه گیری کمّی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC) | # | ۸۰۰۷۸۰ | ۳۸,۰۲۰ | ۲۶,۶۱۱ | ۱۱۶,۰۱۸ | ۸۹,۴۰۷ | ۶۲,۱۲۴ | ۳۵,۵۱۳ | ۷۲,۸۲۴ | ۴۶,۲۱۳ |
| آزمایش کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی | # | ۸۰۰۷۸۵ | ۱۰,۲۲۹ | ۷,۱۶۰ | ۳۳,۴۱۲ | ۲۶,۲۵۲ | ۱۶,۵۲۴ | ۹,۳۶۴ | ۱۹,۳۲۷ | ۱۲,۱۶۷ |
| آزمایش کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی | # | ۸۰۰۷۹۰ | ۱۲,۴۰۴ | ۸,۶۸۲ | ۳۷,۸۴۴ | ۲۹,۱۶۲ | ۲۰,۲۶۸ | ۱۱,۵۸۶ | ۲۳,۷۵۹ | ۱۵,۰۷۷ |
| آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) | # | ۸۰۰۷۹۵ | ۳۳,۹۴۳ | ۲۳,۷۵۸ | ۱۰۷,۷۰۸ | ۸۳,۹۵۰ | ۵۵,۱۰۴ | ۳۱,۳۴۶ | ۶۴,۵۱۴ | ۴۰,۷۵۶ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در خون | # | ۸۰۰۷۹۶ | ۳۳,۹۴۳ | ۲۳,۷۵۸ | ۱۰۷,۷۰۸ | ۸۳,۹۵۰ | ۵۵,۱۰۴ | ۳۱,۳۴۶ | ۶۴,۵۱۴ | ۴۰,۷۵۶ |
| آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار | # | ۸۰۰۷۹۷ | ۳۳,۹۴۳ | ۲۳,۷۵۸ | ۱۰۷,۷۰۸ | ۸۳,۹۵۰ | ۵۵,۱۰۴ | ۳۱,۳۴۶ | ۶۴,۵۱۴ | ۴۰,۷۵۶ |
| آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) متابولیت مرتبط با بیماری های متابولیک در خون | # | ۸۰۰۷۹۸ | ۳۳,۹۴۳ | ۲۳,۷۵۸ | ۱۰۷,۷۰۸ | ۸۳,۹۵۰ | ۵۵,۱۰۴ | ۳۱,۳۴۶ | ۶۴,۵۱۴ | ۴۰,۷۵۶ |
| آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار و مایعات بدن | # | ۸۰۰۷۹۹ | ۳۳,۹۴۳ | ۲۳,۷۵۸ | ۱۰۷,۷۰۸ | ۸۳,۹۵۰ | ۵۵,۱۰۴ | ۳۱,۳۴۶ | ۶۴,۵۱۴ | ۴۰,۷۵۶ |
| اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱C) در خون | # | ۸۰۰۸۰۰ | ۱۹,۷۴۹ | ۱۳,۸۲۴ | ۶۳,۴۲۴ | ۴۹,۶۰۱ | ۳۱,۹۹۶ | ۱۸,۱۷۳ | ۳۷,۴۴۵ | ۲۳,۶۲۲ |
| اندازه‌گیری کمّی هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی (Fe، Hg، Zn و سایر موارد) | # | ۸۰۰۸۰۵ | ۲۷,۵۴۹ | ۱۹,۲۸۲ | ۸۴,۰۶۷ | ۶۴,۷۸۵ | ۴۵,۰۱۴ | ۲۵,۷۳۲ | ۵۲,۷۶۷ | ۳۳,۴۸۵ |
| اندازه‌گیری کمّی منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروفتومتری | # | ۸۰۰۸۱۰ | ۵,۷۹۱ | ۴,۰۵۳ | ۱۸,۵۰۳ | ۱۴,۴۵۰ | ۹,۳۹۰ | ۵,۳۳۷ | ۱۰,۹۹۱ | ۶,۹۳۸ |
| اندازه‌گیری کمّی منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروفتومتری | # | ۸۰۰۸۱۵ | ۵,۰۲۵ | ۳,۵۱۷ | ۱۶,۳۸۴ | ۱۲,۸۶۷ | ۸,۱۲۰ | ۴,۶۰۳ | ۹,۴۹۸ | ۵,۹۸۱ |
| تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۸۲۰ | ۱۶,۲۴۹ | ۱۱,۳۷۳ | ۵۲,۱۰۲ | ۴۰,۷۲۹ | ۲۶,۳۳۲ | ۱۴,۹۵۹ | ۳۰,۸۱۸ | ۱۹,۴۴۵ |
| تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در ادرار | # | ۸۰۰۸۲۱ | ۱۶,۲۴۹ | ۱۱,۳۷۳ | ۵۲,۱۰۲ | ۴۰,۷۲۹ | ۲۶,۳۳۲ | ۱۴,۹۵۹ | ۳۰,۸۱۸ | ۱۹,۴۴۵ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین) | # | ۸۰۰۸۲۵ | ۵,۲۰۴ | ۳,۶۴۳ | ۱۷,۰۲۸ | ۱۳,۳۸۵ | ۸,۴۰۴ | ۴,۷۶۱ | ۹,۸۲۹ | ۶,۱۸۶ |
| اندازه گیری کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین) | # | ۸۰۰۸۳۰ | ۷,۴۱۵ | ۵,۱۹۰ | ۲۲,۶۵۱ | ۱۷,۴۶۱ | ۱۲,۱۱۴ | ۶,۹۲۴ | ۱۴,۲۰۰ | ۹,۰۱۰ |
| اندازه‌گیری کمّی باربیتورات ها به طریق شیمیایی | # | ۸۰۰۸۳۵ | ۶,۱۹۲ | ۴,۳۳۴ | ۲۰,۱۵۸ | ۱۵,۸۲۴ | ۱۰,۰۰۸ | ۵,۶۷۴ | ۱۱,۷۰۷ | ۷,۳۷۳ |
| اندازه‌گیری کمّی کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیک‌ها در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۸۴۰ | ۴۱,۷۷۰ | ۲۹,۲۳۷ | ۱۳۶,۵۰۱ | ۱۰۷,۲۶۴ | ۶۷,۴۶۶ | ۳۸,۲۲۹ | ۷۸,۹۰۹ | ۴۹,۶۷۲ |
| اندازه‌گیری کمّی سیکلوسپورین در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۸۴۵ | ۳۹,۹۴۳ | ۲۷,۹۵۸ | ۱۲۸,۸۷۰ | ۱۰۰,۹۱۲ | ۶۴,۶۶۰ | ۳۶,۷۰۲ | ۷۵,۶۶۰ | ۴۷,۷۰۲ |
| اندازه‌گیری کمّی Tacrolimous در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۸۴۷ | ۳۹,۹۴۳ | ۲۷,۹۵۸ | ۱۲۸,۸۷۰ | ۱۰۰,۹۱۲ | ۶۴,۶۶۰ | ۳۶,۷۰۲ | ۷۵,۶۶۰ | ۴۷,۷۰۲ |
| اندازه‌گیری کمّی سطح سایر داروها در خون/سرم/پلاسما یا ادرار | # | ۸۰۰۸۵۰ | ۲۴,۸۱۱ | ۱۷,۳۶۷ | ۸۰,۹۹۹ | ۶۳,۶۳۲ | ۴۰,۰۸۲ | ۲۲,۷۱۵ | ۴۶,۸۸۲ | ۲۹,۵۱۵ |
| اندازه گیری کمّی ۵-هیدروکسی اندول استیک اسید (۵HIAA) در ادرار | # | ۸۰۰۸۵۵ | ۹,۰۶۳ | ۶,۳۴۳ | ۲۹,۶۳۸ | ۲۳,۲۹۵ | ۱۴,۶۳۶ | ۸,۲۹۳ | ۱۷,۱۱۸ | ۱۰,۷۷۵ |
| اندازه گیری کمّی وانیلیل مندلیک اسید (VMA) در ادرار | # | ۸۰۰۸۶۰ | ۱۵,۹۲۸ | ۱۱,۱۴۹ | ۵۲,۰۰۵ | ۴۰,۸۵۷ | ۲۵,۷۳۰ | ۱۴,۵۸۲ | ۳۰,۰۹۵ | ۱۸,۹۴۷ |
| اندازه‌گیری کمّی متیل موالونیک اسید (M/M/A) در ادرار | # | ۸۰۰۸۶۵ | ۲۰,۶۹۷ | ۱۴,۴۸۶ | ۶۰,۰۵۲ | ۴۵,۵۶۶ | ۳۴,۰۸۸ | ۱۹,۶۰۲ | ۴۰,۰۲۰ | ۲۵,۵۳۴ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌های در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۸۷۰ | ۱۵,۴۳۴ | ۱۰,۸۰۳ | ۵۰,۴۴۰ | ۳۹,۶۳۷ | ۲۴,۹۲۸ | ۱۴,۱۲۵ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۸,۳۵۳ |
| اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌های در ادرار | # | ۸۰۰۸۷۱ | ۱۵,۴۳۴ | ۱۰,۸۰۳ | ۵۰,۴۴۰ | ۳۹,۶۳۷ | ۲۴,۹۲۸ | ۱۴,۱۲۵ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۸,۳۵۳ |
| اندازه گیری کمّی نورآدرنالین در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۰۸۷۲ | ۱۵,۴۳۴ | ۱۰,۸۰۳ | ۵۰,۴۴۰ | ۳۹,۶۳۷ | ۲۴,۹۲۸ | ۱۴,۱۲۵ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۸,۳۵۳ |
| اندازه گیری کمّی نورآدرنالین در ادرار | # | ۸۰۰۸۷۳ | ۱۵,۴۳۴ | ۱۰,۸۰۳ | ۵۰,۴۴۰ | ۳۹,۶۳۷ | ۲۴,۹۲۸ | ۱۴,۱۲۵ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۸,۳۵۳ |
| اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفرین آزاد در سرم | # | ۸۰۰۸۷۵ | ۳۱,۵۴۰ | ۲۲,۰۷۷ | ۱۰۳,۰۸۹ | ۸۱,۰۱۲ | ۵۰,۹۴۲ | ۲۸,۸۶۵ | ۵۹,۵۸۲ | ۳۷,۵۰۵ |
| اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفرین در ادرار | # | ۸۰۰۸۷۶ | ۳۱,۵۴۰ | ۲۲,۰۷۷ | ۱۰۳,۰۸۹ | ۸۱,۰۱۲ | ۵۰,۹۴۲ | ۲۸,۸۶۵ | ۵۹,۵۸۲ | ۳۷,۵۰۵ |
| اندازه‌گیری کمّی ۱۷-کتواستروئیدها در ادرار | # | ۸۰۰۸۸۰ | ۱۱,۹۷۶ | ۸,۳۸۳ | ۳۹,۴۸۵ | ۳۱,۱۰۲ | ۱۹,۳۱۴ | ۱۰,۹۳۱ | ۲۲,۵۸۳ | ۱۴,۲۰۰ |
| اندازه‌گیری کمّی ۱۷-هیدروکسی استروئیدها در ادرار | # | ۸۰۰۸۸۵ | ۱۱,۹۷۶ | ۸,۳۸۳ | ۳۹,۴۸۵ | ۳۱,۱۰۲ | ۱۹,۳۱۴ | ۱۰,۹۳۱ | ۲۲,۵۸۳ | ۱۴,۲۰۰ |
| آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمنیوتیک | # | ۸۰۰۸۹۰ | ۴,۳۹۵ | ۳,۰۷۷ | ۱۴,۵۴۲ | ۱۱,۴۶۵ | ۷,۰۸۴ | ۴,۰۰۷ | ۸,۲۸۲ | ۵,۲۰۵ |
| اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین در مایع آمنیوتیک | # | ۸۰۰۸۹۵ | ۳,۸۵۸ | ۲,۷۰۱ | ۱۲,۶۱۰ | ۹,۹۰۹ | ۶,۲۳۲ | ۳,۵۳۱ | ۷,۲۸۹ | ۴,۵۸۸ |
| اندازه‌گیری کمّی لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک | # | ۸۰۰۹۰۰ | ۷,۶۶۷ | ۵,۳۶۷ | ۲۵,۶۷۷ | ۲۰,۳۱۰ | ۱۲,۳۳۰ | ۶,۹۶۳ | ۱۴,۴۰۹ | ۹,۰۴۲ |
| آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test) در مایع آمنیوتیک | # | ۸۰۰۹۰۵ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار | # | ۸۰۰۹۱۰ | ۱۴,۴۳۶ | ۱۰,۱۰۴ | ۴۲,۸۲۳ | ۳۲,۷۱۹ | ۲۳,۶۹۴ | ۱۳,۵۹۰ | ۲۷,۷۹۹ | ۱۷,۶۹۵ |
| اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین توتال در ادرار | # | ۸۰۰۹۱۵ | ۱۴,۴۳۶ | ۱۰,۱۰۴ | ۴۲,۸۲۳ | ۳۲,۷۱۹ | ۲۳,۶۹۴ | ۱۳,۵۹۰ | ۲۷,۷۹۹ | ۱۷,۶۹۵ |
| اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار | # | ۸۰۰۹۲۵ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| اندازه‌گیری کمّی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار | # | ۸۰۰۹۳۰ | ۵,۴۲۶ | ۳,۷۹۸ | ۱۸,۰۳۹ | ۱۴,۲۴۱ | ۸,۷۳۸ | ۴,۹۴۰ | ۱۰,۲۱۴ | ۶,۴۱۶ |
| آزمایش اسید معده شامل اندازه گیری کمّی اسید کلریدریک آزاد، اسیدیته توتال، برای هر نمونه | # | ۸۰۰۹۳۵ | ۱۰,۳۰۹ | ۷,۲۱۶ | ۳۴,۹۷۰ | ۲۷,۷۵۴ | ۱۶,۵۴۰ | ۹,۳۲۴ | ۱۹,۳۲۰ | ۱۲,۱۰۴ |
| اندازه گیری فاکتور داخلی (Intrinsic Factor) در شیره معده | # | ۸۰۰۹۴۵ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۹,۳۲۸ | ۹۳,۴۰۸ | ۷۴,۰۸۰ | ۴۴,۳۲۴ | ۲۴,۹۹۶ | ۵۱,۷۷۹ | ۳۲,۴۵۱ |
| جمع‌آوری نمونه عرق | # | ۸۰۰۹۵۰ | ۲۸,۵۶۴ | ۱۹,۹۹۳ | ۹۵,۳۴۷ | ۷۵,۳۵۴ | ۴۵,۹۶۲ | ۲۵,۹۶۹ | ۵۳,۷۱۸ | ۳۳,۷۲۵ |
| اندازه‌گیری کمّی دلتا آمینولوولینیک(Delta-ALA) در ادرار | # | ۸۰۰۹۵۵ | ۱۳,۹۴۵ | ۹,۷۶۱ | ۴۶,۵۶۹ | ۳۶,۸۰۸ | ۲۲,۴۳۸ | ۱۲,۶۷۷ | ۲۶,۲۲۴ | ۱۶,۴۶۳ |
| اندازه‌گیری کمّی پورفیرین در ادرار | # | ۸۰۰۹۶۰ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمی اوروپورفیرین در ادرار | # | ۸۰۰۹۶۵ | ۲,۴۲۶ | ۱,۶۹۸ | ۷,۴۵۸ | ۵,۷۶۰ | ۳,۹۶۰ | ۲,۲۶۲ | ۴,۶۴۱ | ۲,۹۴۳ |
| اندازه‌گیری کمّی اوروپورفیرین ادرار | # | ۸۰۰۹۷۰ | ۳,۴۵۱ | ۲,۴۱۵ | ۱۱,۷۷۹ | ۹,۳۶۴ | ۵,۵۳۰ | ۳,۱۱۵ | ۶,۴۵۸ | ۴,۰۴۳ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمی کوپروپورفیرین در ادرار | # | ۸۰۰۹۷۵ | ۲,۴۲۶ | ۱,۶۹۸ | ۷,۴۵۸ | ۵,۷۶۰ | ۳,۹۶۰ | ۲,۲۶۲ | ۴,۶۴۱ | ۲,۹۴۳ |
| اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین خون | # | ۸۰۰۹۸۰ | ۳,۸۵۸ | ۲,۷۰۱ | ۱۲,۶۱۰ | ۹,۹۰۹ | ۶,۲۳۲ | ۳,۵۳۱ | ۷,۲۸۹ | ۴,۵۸۸ |
| اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین ادرار | # | ۸۰۰۹۸۱ | ۳,۸۵۸ | ۲,۷۰۱ | ۱۲,۶۱۰ | ۹,۹۰۹ | ۶,۲۳۲ | ۳,۵۳۱ | ۷,۲۸۹ | ۴,۵۸۸ |
| اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین مدفوع | # | ۸۰۰۹۸۲ | ۳,۸۵۸ | ۲,۷۰۱ | ۱۲,۶۱۰ | ۹,۹۰۹ | ۶,۲۳۲ | ۳,۵۳۱ | ۷,۲۸۹ | ۴,۵۸۸ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمی پورفوبیلینوژن ادرار | # | ۸۰۰۹۸۵ | ۲,۴۲۶ | ۱,۶۹۸ | ۷,۴۵۸ | ۵,۷۶۰ | ۳,۹۶۰ | ۲,۲۶۲ | ۴,۶۴۱ | ۲,۹۴۳ |
| اندازه گیری کمّی پورفوبیلینوژن ادرار | # | ۸۰۰۹۹۰ | ۴,۰۸۱ | ۲,۸۵۶ | ۱۳,۶۲۱ | ۱۰,۷۶۵ | ۶,۵۶۶ | ۳,۷۱۰ | ۷,۶۷۴ | ۴,۸۱۸ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن در ادرار | # | ۸۰۰۹۹۵ | ۷,۶۶۷ | ۵,۳۶۷ | ۲۵,۶۷۷ | ۲۰,۳۱۰ | ۱۲,۳۳۰ | ۶,۹۶۳ | ۱۴,۴۰۹ | ۹,۰۴۲ |
| اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن در مدفوع | # | ۸۰۰۹۹۶ | ۷,۶۶۷ | ۵,۳۶۷ | ۲۵,۶۷۷ | ۲۰,۳۱۰ | ۱۲,۳۳۰ | ۶,۹۶۳ | ۱۴,۴۰۹ | ۹,۰۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۰۰۰ | ۲۳,۸۲۳ | - | ۷۷,۸۶۹ | ۷۷,۸۶۹ | ۳۸,۴۷۸ | ۳۸,۴۷۸ | ۴۵,۰۰۴ | ۴۵,۰۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در ادرار | #* | ۸۰۱۰۰۱ | ۲۳,۸۲۳ | - | ۷۷,۸۶۹ | ۷۷,۸۶۹ | ۳۸,۴۷۸ | ۳۸,۴۷۸ | ۴۵,۰۰۴ | ۴۵,۰۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی سرولوپلاسمین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۰۰۵ | ۲۳,۵۱۲ | ۱۶,۴۵۶ | ۷۰,۸۱۳ | ۵۴,۳۵۷ | ۳۸,۴۹۸ | ۲۲,۰۴۲ | ۴۵,۱۴۷ | ۲۸,۶۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی آمونیاک خون/پلاسما | # | ۸۰۱۰۱۰ | ۱۴,۱۵۱ | ۹,۹۰۵ | ۴۳,۹۱۷ | ۳۴,۰۱۳ | ۲۳,۰۵۸ | ۱۳,۱۵۴ | ۲۷,۰۱۵ | ۱۷,۱۱۱ |
| اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک خون/پلاسما | # | ۸۰۱۰۱۵ | ۶,۹۷۸ | ۴,۸۸۴ | ۱۹,۸۰۵ | ۱۴,۹۲۲ | ۱۱,۵۳۰ | ۶,۶۴۷ | ۱۳,۵۴۵ | ۸,۶۶۲ |
| اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک مایع مغزی نخاعی | # | ۸۰۱۰۱۶ | ۶,۹۷۸ | ۴,۸۸۴ | ۱۹,۸۰۵ | ۱۴,۹۲۲ | ۱۱,۵۳۰ | ۶,۶۴۷ | ۱۳,۵۴۵ | ۸,۶۶۲ |
| اندازه گیری کمّی الکل (اتانول) در هر نوع نمونه بالینی به جز هوای بازدمی | # | ۸۰۱۰۲۰ | ۶,۸۱۵ | ۴,۷۷۰ | ۲۲,۸۲۴ | ۱۸,۰۵۴ | ۱۰,۹۶۰ | ۶,۱۹۰ | ۱۲,۸۰۸ | ۸,۰۳۸ |
| اندازه گیری کمّی میوگلوبین (Myoglobin) خون/پلاسما/ سرم | # | ۸۰۱۰۲۵ | ۱۵,۶۱۳ | ۱۰,۹۲۸ | ۵۱,۰۸۴ | ۴۰,۱۵۶ | ۲۵,۲۱۲ | ۱۴,۲۸۴ | ۲۹,۴۸۷ | ۱۸,۵۵۹ |
| اندازه گیری کمّی میوگلوبین (Myoglobin) ادرار | # | ۸۰۱۰۲۶ | ۱۵,۶۱۳ | ۱۰,۹۲۸ | ۵۱,۰۸۴ | ۴۰,۱۵۶ | ۲۵,۲۱۲ | ۱۴,۲۸۴ | ۲۹,۴۸۷ | ۱۸,۵۵۹ |
| اندازه گیری کمّی مِت هموگلوبین (Methemoglobin) خون | # | ۸۰۱۰۳۰ | ۳,۲۷۲ | ۲,۲۹۰ | ۱۱,۱۳۵ | ۸,۸۴۵ | ۵,۲۴۶ | ۲,۹۵۶ | ۶,۱۲۷ | ۳,۸۳۷ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۰۴۰ | ۱۳,۵۹۴ | ۹,۵۱۵ | ۴۴,۴۵۷ | ۳۴,۹۴۲ | ۲۱,۹۵۴ | ۱۲,۴۳۹ | ۲۵,۶۷۷ | ۱۶,۱۶۲ |
| اندازه گیری کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۰۴۵ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۵,۵۳۲ | ۶۳,۰۹۹ | ۴۷,۵۶۷ | ۳۶,۶۶۲ | ۲۱,۱۳۰ | ۴۳,۰۶۷ | ۲۷,۵۳۵ |
| اندازه گیری کمّی Homosysteine سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۰۵۰ | ۳۳,۰۵۸ | ۲۳,۱۳۹ | ۱۰۸,۹۷۵ | ۸۵,۸۳۶ | ۵۳,۳۱۴ | ۳۰,۱۷۵ | ۶۲,۳۳۸ | ۳۹,۱۹۹ |
| اندازه گیری کمّی Homosysteine ادرار | # | ۸۰۱۰۵۱ | ۳۳,۰۵۸ | ۲۳,۱۳۹ | ۱۰۸,۹۷۵ | ۸۵,۸۳۶ | ۵۳,۳۱۴ | ۳۰,۱۷۵ | ۶۲,۳۳۸ | ۳۹,۱۹۹ |
| اندازه گیری کمّی گالاکتوز سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۰۵۵ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| اندازه گیری کمّی گالاکتوز ادرار | # | ۸۰۱۰۵۶ | ۳,۱۸۶ | ۲,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۱ | ۸,۱۷۱ | ۵,۱۴۶ | ۲,۹۱۶ | ۶,۰۱۹ | ۳,۷۸۹ |
| آزمایش جذب دی گزیلوز | # | ۸۰۱۰۶۰ | ۹,۵۵۷ | ۶,۶۸۹ | ۳۱,۲۰۳ | ۲۴,۵۱۴ | ۱۵,۴۳۸ | ۸,۷۴۹ | ۱۸,۰۵۷ | ۱۱,۳۶۸ |
| آزمایش تحمل لاکتوز | # | ۸۰۱۰۶۵ | ۱۰,۰۵۰ | ۷,۰۳۵ | ۳۲,۷۶۸ | ۲۵,۷۳۳ | ۱۶,۲۴۰ | ۹,۲۰۵ | ۱۸,۹۹۶ | ۱۱,۹۶۱ |
| آزمایش تحمل گلوکاگون | # | ۸۰۱۰۷۰ | ۴,۷۵۳ | ۳,۳۲۷ | ۱۵,۸۳۰ | ۱۲,۵۰۳ | ۷,۶۵۲ | ۴,۳۲۵ | ۸,۹۴۴ | ۵,۶۱۷ |
| آزمایش تحمل تالبوتامید | # | ۸۰۱۰۷۵ | ۳۷,۳۸۴ | ۲۶,۱۶۸ | ۱۲۶,۴۴۶ | ۱۰۰,۲۷۸ | ۶۰,۰۱۲ | ۳۳,۸۴۴ | ۷۰,۱۰۶ | ۴۳,۹۳۸ |
| آزمایش گازهای خونی شامل (HCO۳, PO۲, PCO۲, PH, CO۲) و محاسبه O۲ اشباع | # | ۸۰۱۰۸۰ | ۲۰,۸۰۰ | ۱۴,۵۵۹ | ۶۴,۴۴۹ | ۴۹,۸۹۰ | ۳۳,۹۰۲ | ۱۹,۳۴۳ | ۳۹,۷۲۲ | ۲۵,۱۶۳ |
| اندازه گیری گازهای خونی شامل (PH, PO۲, PCO۲, CO۲, HCO۳)، محاسبه اشباع O۲، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، هماتوکریت، گلوکز و لاکتات خون | # | ۸۰۱۰۸۲ | ۴۰,۴۴۰ | ۲۸,۳۰۵ | ۱۲۴,۳۰۰ | ۹۵,۹۹۵ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۷,۶۹۵ | ۷۷,۳۵۰ | ۴۹,۰۴۵ |
| اندازه‌گیری کمّی مونواکسیدکربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون | # | ۸۰۱۰۸۵ | ۴,۷۵۳ | ۳,۳۲۷ | ۱۵,۸۳۰ | ۱۲,۵۰۳ | ۷,۶۵۲ | ۴,۳۲۵ | ۸,۹۴۴ | ۵,۶۱۷ |
| اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمّی منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون | # | ۸۰۱۰۹۰ | ۳,۸۵۸ | ۲,۷۰۱ | ۱۲,۶۱۰ | ۹,۹۰۹ | ۶,۲۳۲ | ۳,۵۳۱ | ۷,۲۸۹ | ۴,۵۸۸ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمی استن و اجسام کتونی سرم/ پلاسما | # | ۸۰۱۰۹۵ | ۲,۵۱۳ | ۱,۷۵۹ | ۸,۱۹۲ | ۶,۴۳۳ | ۴,۰۶۰ | ۲,۳۰۱ | ۴,۷۴۹ | ۲,۹۹۰ |
| اندازه گیری کمّی اسمولا لیته پلاسما یا سایر مایعات بدن | # | ۸۰۱۱۰۰ | ۵,۸۷۷ | ۴,۱۱۴ | ۱۹,۲۳۷ | ۱۵,۱۲۳ | ۹,۴۹۰ | ۵,۳۷۶ | ۱۱,۰۹۹ | ۶,۹۸۵ |
| اندازه‌گیری کمّی بتا-کاروتن سرم | # | ۸۰۱۱۰۵ | ۳,۷۲۳ | ۲,۶۰۶ | ۱۲,۳۳۳ | ۹,۷۲۷ | ۵,۹۹۸ | ۳,۳۹۲ | ۷,۰۱۲ | ۴,۴۰۶ |
| اندازه‌گیری کمّی اسیدآسکوربیک (ویتامینC) سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۱۰ | ۴,۲۶۰ | ۲,۹۸۲ | ۱۴,۲۶۵ | ۱۱,۲۸۴ | ۶,۸۵۰ | ۳,۸۶۹ | ۸,۰۰۵ | ۵,۰۲۴ |
| اندازه گیری کمّی تیامین (ویتامین B۱) خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۱۵ | ۲۳,۱۲۴ | ۱۶,۱۸۶ | ۷۸,۹۵۶ | ۶۲,۷۷۰ | ۳۷,۰۵۶ | ۲۰,۸۷۰ | ۴۳,۲۷۴ | ۲۷,۰۸۸ |
| اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول قرمز/سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۲۰ | ۲۳,۱۲۴ | ۱۶,۱۸۶ | ۷۸,۹۵۶ | ۶۲,۷۷۰ | ۳۷,۰۵۶ | ۲۰,۸۷۰ | ۴۳,۲۷۴ | ۲۷,۰۸۸ |
| اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول ادرار | # | ۸۰۱۱۲۱ | ۲۳,۱۲۴ | ۱۶,۱۸۶ | ۷۸,۹۵۶ | ۶۲,۷۷۰ | ۳۷,۰۵۶ | ۲۰,۸۷۰ | ۴۳,۲۷۴ | ۲۷,۰۸۸ |
| اندازه گیری کمّی فولیک اسید سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۲۵ | ۲۵,۸۴۲ | ۱۸,۰۸۸ | ۸۴,۴۹۶ | ۶۶,۴۰۸ | ۴۱,۷۳۶ | ۲۳,۶۴۸ | ۴۸,۸۱۴ | ۳۰,۷۲۶ |
| اندازه گیری کمّی سیانوکوبالامین (ویتامین B۱) گلبول قرمز/سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۳۰ | ۲۵,۸۴۲ | ۱۸,۰۸۸ | ۸۴,۴۹۶ | ۶۶,۴۰۸ | ۴۱,۷۳۶ | ۲۳,۶۴۸ | ۴۸,۸۱۴ | ۳۰,۷۲۶ |
| اندازه‌گیری کمّی رتینول (ویتامین A) سرم | # | ۸۰۱۱۳۵ | ۵,۰۲۵ | ۳,۵۱۷ | ۱۶,۳۸۴ | ۱۲,۸۶۷ | ۸,۱۲۰ | ۴,۶۰۳ | ۹,۴۹۸ | ۵,۹۸۱ |
| آزمایش حلالیت برای تشخیص کم‌خونی سلول داسی (Solubility Test) Dithionite Rapid Test | # | ۸۰۱۱۴۰ | ۳,۳۲۱ | ۲,۳۲۵ | ۱۰,۶۷۸ | ۸,۳۵۳ | ۵,۳۸۰ | ۳,۰۵۵ | ۶,۲۹۶ | ۳,۹۷۱ |
| اندازه گیری کمّی ترانسفرین (Transferrin) سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۴۵ | ۲۲,۰۶۶ | ۱۵,۴۴۵ | ۶۷,۳۰۹ | ۵۱,۸۶۴ | ۳۶,۰۵۸ | ۲۰,۶۱۳ | ۴۲,۲۶۹ | ۲۶,۸۲۴ |
| آزمایش اشباع ترانسفرین (Transferrin Saturation ) سرم | # | ۸۰۱۱۵۰ | ۸,۳۹۰ | ۵,۸۷۲ | ۲۷,۴۲۹ | ۲۱,۵۵۷ | ۱۳,۵۵۰ | ۷,۶۷۸ | ۱۵,۸۴۸ | ۹,۹۷۶ |
| اندازه گیری رسپتورهای ترانسفرین سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۵۵ | ۱۷,۴۱۶ | ۱۲,۱۹۰ | ۵۵,۸۷۶ | ۴۳,۶۸۶ | ۲۸,۲۲۰ | ۱۶,۰۳۰ | ۳۳,۰۲۷ | ۲۰,۸۳۷ |
| تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا | # | ۸۰۱۱۶۰ | ۷,۸۹۶ | ۵,۵۲۷ | ۲۵,۸۶۴ | ۲۰,۳۳۷ | ۱۲,۷۴۸ | ۷,۲۲۱ | ۱۴,۹۰۹ | ۹,۳۸۲ |
| اندازه گیری کمّی دیگوکسین(Digoxin ) سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۶۵ | ۲۳,۳۳۹ | ۱۶,۳۳۵ | ۶۹,۳۴۵ | ۵۳,۰۱۰ | ۳۸,۲۹۸ | ۲۱,۹۶۳ | ۴۴,۹۳۱ | ۲۸,۵۹۶ |
| اندازه گیری کمّی فریتین سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۷۰ | ۲۳,۰۲۴ | ۱۶,۱۱۵ | ۶۸,۴۲۴ | ۵۲,۳۰۹ | ۳۷,۷۸۰ | ۲۱,۶۶۵ | ۴۴,۳۲۳ | ۲۸,۲۰۸ |
| اندازه گیری کمّی تیروزین به روش HPLC سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۱۷۵ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه گیری کمّی تیروزین به روش HPLC ادرار | #* | ۸۰۱۱۷۶ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش HPLC سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۱۸۰ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش HPLC ادرار | #* | ۸۰۱۱۸۱ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش HPLC سرم/پلاسما (تایید تشخیص و پایش) | # | ۸۰۱۱۸۲ | ۴۹,۵۷۳ | ۳۴,۶۹۹ | ۱۶۲,۴۵۵ | ۱۲۷,۷۵۷ | ۸۰,۰۳۰ | ۴۵,۳۳۲ | ۹۳,۵۹۵ | ۵۸,۸۹۷ |
| اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش HPLC ادرار (تایید تشخیص و پایش) | # | ۸۰۱۱۸۳ | ۴۹,۵۷۳ | ۳۴,۶۹۹ | ۱۶۲,۴۵۵ | ۱۲۷,۷۵۷ | ۸۰,۰۳۰ | ۴۵,۳۳۲ | ۹۳,۵۹۵ | ۵۸,۸۹۷ |
| اندازه‌گیری کمّی هاپتوگلوبین خون/سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۱۸۵ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۵,۳۲۷ | ۷۱,۱۵۲ | ۵۵,۸۲۵ | ۳۵,۴۰۴ | ۲۰,۰۷۷ | ۴۱,۴۱۷ | ۲۶,۰۹۰ |
| اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۱۹۰ | ۴۳,۷۹۵ | - | ۱۴۲,۳۰۴ | ۱۴۲,۳۰۴ | ۷۰,۸۰۸ | ۷۰,۸۰۸ | ۸۲,۸۳۴ | ۸۲,۸۳۴ |
| اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در ادرار | #* | ۸۰۱۱۹۱ | ۴۳,۷۹۵ | - | ۱۴۲,۳۰۴ | ۱۴۲,۳۰۴ | ۷۰,۸۰۸ | ۷۰,۸۰۸ | ۸۲,۸۳۴ | ۸۲,۸۳۴ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجسس هموسیدرین در ادرار | #* | ۸۰۱۱۹۵ | ۴,۸۴۶ | - | ۱۵,۷۴۰ | ۱۵,۷۴۰ | ۷,۸۳۶ | ۷,۸۳۶ | ۹,۱۶۷ | ۹,۱۶۷ |
| اندازه‌گیری کمّی هر یک از آپولیپوپروتئین‌ها سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۰۰ | ۲۱,۸۹۷ | - | ۷۱,۱۵۲ | ۷۱,۱۵۲ | ۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۴۰۴ | ۴۱,۴۱۷ | ۴۱,۴۱۷ |
| اندازه گیری کمّی Lipoprotein a (Lpa) سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۰۵ | ۱۹,۵۶۴ | - | ۶۳,۶۰۴ | ۶۳,۶۰۴ | ۳۱,۶۲۸ | ۳۱,۶۲۸ | ۳۶,۹۹۹ | ۳۶,۹۹۹ |
| اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمّی فعالیت آنزیم تریپسین در مایع دوازدهه و مدفوع Stool Trypsin Activity | #* | ۸۰۱۲۱۰ | ۱۱,۵۳۲ | - | ۳۷,۴۶۳ | ۳۷,۴۶۳ | ۱۸,۶۴۶ | ۱۸,۶۴۶ | ۲۱,۸۱۳ | ۲۱,۸۱۳ |
| اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در خون/سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۲۰ | ۷,۵۳۸ | - | ۲۴,۵۷۶ | ۲۴,۵۷۶ | ۱۲,۱۸۰ | ۱۲,۱۸۰ | ۱۴,۲۴۷ | ۱۴,۲۴۷ |
| اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در ادرار یا مایعات بدن | #* | ۸۰۱۲۲۱ | ۷,۵۳۸ | - | ۲۴,۵۷۶ | ۲۴,۵۷۶ | ۱۲,۱۸۰ | ۱۲,۱۸۰ | ۱۴,۲۴۷ | ۱۴,۲۴۷ |
| اندازه گیری کمّی فنوباربیتال به روش HPLC در سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۲۵ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه گیری کمّی نورتریپتیلین به روش HPLC در سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۳۰ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه گیری کمّی Amphetamine یا Methamphetamineبه روش HPLC در سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۳۵ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی سایر ویتامین‌ها به روش HPLC در نمونه های بالینی | #* | ۸۰۱۲۴۰ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در خون/سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۴۵ | ۶,۶۸۶ | - | ۲۱,۷۲۳ | ۲۱,۷۲۳ | ۱۰,۸۱۰ | ۱۰,۸۱۰ | ۱۲,۶۴۶ | ۱۲,۶۴۶ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در ادرار | #* | ۸۰۱۲۴۶ | ۶,۶۸۶ | - | ۲۱,۷۲۳ | ۲۱,۷۲۳ | ۱۰,۸۱۰ | ۱۰,۸۱۰ | ۱۲,۶۴۶ | ۱۲,۶۴۶ |
| اندازه گیری کمّی تئوفیلین سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۵۰ | ۱۸,۸۹۱ | - | ۶۱,۳۹۵ | ۶۱,۳۹۵ | ۳۰,۵۴۲ | ۳۰,۵۴۲ | ۳۵,۷۲۹ | ۳۵,۷۲۹ |
| اندازه گیری کمّی Cystatin C سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۲۵۵ | ۳۳,۴۳۰ | - | ۱۰۸,۶۱۵ | ۱۰۸,۶۱۵ | ۵۴,۰۵۰ | ۵۴,۰۵۰ | ۶۳,۲۳۰ | ۶۳,۲۳۰ |
| آزمایش های غربالگری بیماری های متابولیک Test Metabolic Disorders Screening (by TM Method) برای ۲۵ بیماری | #* | ۸۰۱۲۶۰ | ۲۸,۵۸۳ | - | ۹۲,۸۷۵ | ۹۲,۸۷۵ | ۴۶,۲۱۴ | ۴۶,۲۱۴ | ۵۴,۰۶۳ | ۵۴,۰۶۳ |
| MDA | #* | ۸۰۱۲۶۵ | ۱۹,۰۷۰ | - | ۶۲,۰۳۹ | ۶۲,۰۳۹ | ۳۰,۸۲۶ | ۳۰,۸۲۶ | ۳۶,۰۶۰ | ۳۶,۰۶۰ |
| اندازه گیری کمّی کاتالاز (Catalase) در خون یا ادرار | #* | ۸۰۱۲۷۰ | ۲۳,۹۱۶ | - | ۷۷,۷۷۹ | ۷۷,۷۷۹ | ۳۸,۶۶۲ | ۳۸,۶۶۲ | ۴۵,۲۲۷ | ۴۵,۲۲۷ |
| اندازه گیری کمّی گلوتاتیون ردوکتاز (GSH) در خون | #* | ۸۰۱۲۸۰ | ۲۳,۹۱۶ | - | ۷۷,۷۷۹ | ۷۷,۷۷۹ | ۳۸,۶۶۲ | ۳۸,۶۶۲ | ۴۵,۲۲۷ | ۴۵,۲۲۷ |
| اندازه گیری کمّی T۳ سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۰۰ | ۱۰,۲۴۹ | ۷,۱۷۴ | ۳۰,۹۴۰ | ۲۳,۷۶۶ | ۱۶,۷۷۶ | ۹,۶۰۲ | ۱۹,۶۷۲ | ۱۲,۴۹۸ |
| اندازه گیری کمّی T۴ سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۰۵ | ۱۰,۲۴۹ | ۷,۱۷۴ | ۳۰,۹۴۰ | ۲۳,۷۶۶ | ۱۶,۷۷۶ | ۹,۶۰۲ | ۱۹,۶۷۲ | ۱۲,۴۹۸ |
| اندازه گیری کمّی (T۳ Uptake T۳RU) سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۱۰ | ۱۰,۲۴۹ | ۷,۱۷۴ | ۳۰,۹۴۰ | ۲۳,۷۶۶ | ۱۶,۷۷۶ | ۹,۶۰۲ | ۱۹,۶۷۲ | ۱۲,۴۹۸ |
| اندازه گیری کمّی (Thyroid Stimulating Hormone (TSH سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۱۵ | ۱۳,۲۶۲ | ۹,۲۸۳ | ۳۹,۸۷۳ | ۳۰,۵۹۱ | ۲۱,۷۲۲ | ۱۲,۴۴۰ | ۲۵,۴۷۵ | ۱۶,۱۹۳ |
| اندازه‌گیری کمّی FreeT۳ سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۲۰ | ۱۳,۲۶۲ | ۹,۲۸۳ | ۳۹,۸۷۳ | ۳۰,۵۹۱ | ۲۱,۷۲۲ | ۱۲,۴۴۰ | ۲۵,۴۷۵ | ۱۶,۱۹۳ |
| اندازه گیری کمّی FreeT۴ سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۲۵ | ۱۳,۲۶۲ | ۹,۲۸۳ | ۳۹,۸۷۳ | ۳۰,۵۹۱ | ۲۱,۷۲۲ | ۱۲,۴۴۰ | ۲۵,۴۷۵ | ۱۶,۱۹۳ |
| اندازه‌گیری کمّی (Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۳۰ | ۱۰,۹۵۲ | ۷,۶۶۶ | ۳۵,۱۶۴ | ۲۷,۴۹۸ | ۱۷,۷۴۴ | ۱۰,۰۷۸ | ۲۰,۷۶۶ | ۱۳,۱۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه‌گیری کمّی Thyroglobulin سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۳۵ | ۲۷,۴۷۶ | ۱۹,۲۳۱ | ۸۱,۶۸۵ | ۶۲,۴۵۴ | ۴۵,۰۸۲ | ۲۵,۸۵۱ | ۵۲,۸۸۹ | ۳۳,۶۵۸ |
| اندازه‌گیری کمّی (Follicle stimulating hormone (FSH سرم/ پلاسما یا ادرار | # | ۸۰۱۴۴۰ | ۱۳,۱۱۳ | ۹,۱۷۸ | ۴۱,۲۴۴ | ۳۲,۰۶۶ | ۲۱,۳۲۰ | ۱۲,۱۴۲ | ۲۴,۹۶۸ | ۱۵,۷۹۰ |
| اندازه‌گیری کمّی Luteinizing(LH) hormone خون | # | ۸۰۱۴۴۵ | ۱۳,۱۱۳ | ۹,۱۷۸ | ۴۱,۲۴۴ | ۳۲,۰۶۶ | ۲۱,۳۲۰ | ۱۲,۱۴۲ | ۲۴,۹۶۸ | ۱۵,۷۹۰ |
| اندازه‌گیری کمّی Luteinizing(LH) hormone ادرار | # | ۸۰۱۴۴۶ | ۱۳,۱۱۳ | ۹,۱۷۸ | ۴۱,۲۴۴ | ۳۲,۰۶۶ | ۲۱,۳۲۰ | ۱۲,۱۴۲ | ۲۴,۹۶۸ | ۱۵,۷۹۰ |
| اندازه‌گیری کمّی پرولاکتین Prolactin سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۵۰ | ۱۴,۲۸۰ | ۹,۹۹۵ | ۴۵,۰۱۸ | ۳۵,۰۲۳ | ۲۳,۲۰۸ | ۱۳,۲۱۳ | ۲۷,۱۷۷ | ۱۷,۱۸۲ |
| اندازه‌گیری کمّی تستوسترون Testosteroneسرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۵۵ | ۱۵,۵۸۳ | ۱۰,۹۰۷ | ۴۹,۰۶۹ | ۳۸,۱۶۲ | ۲۵,۳۳۰ | ۱۴,۴۲۳ | ۲۹,۶۶۳ | ۱۸,۷۵۶ |
| اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار | # | ۸۰۱۴۵۶ | ۱۸,۸۶۱ | ۱۳,۲۰۲ | ۵۹,۳۸۰ | ۴۶,۱۷۹ | ۳۰,۶۶۰ | ۱۷,۴۵۹ | ۳۵,۹۰۵ | ۲۲,۷۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی تستوسترون آزاد Free Testosterone سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۶۰ | ۱۴,۲۸۰ | ۹,۹۹۵ | ۴۵,۰۱۸ | ۳۵,۰۲۳ | ۲۳,۲۰۸ | ۱۳,۲۱۳ | ۲۷,۱۷۷ | ۱۷,۱۸۲ |
| اندازه گیری کمّی دی هیدرو تستوسترون | #* | ۸۰۱۴۶۱ | ۲۴,۸۷۸ | - | ۸۴,۲۰۵ | ۸۴,۲۰۵ | ۳۹,۹۳۰ | ۳۹,۹۳۰ | ۴۶,۶۴۵ | ۴۶,۶۴۵ |
| اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون سولفات DHEA-S سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۶۵ | ۱۶,۰۷۷ | ۱۱,۲۵۳ | ۵۰,۶۳۴ | ۳۹,۳۸۱ | ۲۶,۱۳۲ | ۱۴,۸۷۹ | ۳۰,۶۰۲ | ۱۹,۳۴۹ |
| اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون DHEA سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۷۰ | ۱۶,۰۷۷ | ۱۱,۲۵۳ | ۵۰,۶۳۴ | ۳۹,۳۸۱ | ۲۶,۱۳۲ | ۱۴,۸۷۹ | ۳۰,۶۰۲ | ۱۹,۳۴۹ |
| اندازه‌گیری کمّی پروژسترون Progesterone سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۷۵ | ۱۶,۰۷۷ | ۱۱,۲۵۳ | ۵۰,۶۳۴ | ۳۹,۳۸۱ | ۲۶,۱۳۲ | ۱۴,۸۷۹ | ۳۰,۶۰۲ | ۱۹,۳۴۹ |
| اندازه‌گیری کمّی۱۷-هیدروکسی پروژسترون ۱۷-OH-Progesteron خون، سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۸۰ | ۱۸,۸۶۱ | ۱۳,۲۰۲ | ۵۹,۳۸۰ | ۴۶,۱۷۹ | ۳۰,۶۶۰ | ۱۷,۴۵۹ | ۳۵,۹۰۵ | ۲۲,۷۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۸۵ | ۱۸,۸۶۱ | ۱۳,۲۰۲ | ۵۹,۳۸۰ | ۴۶,۱۷۹ | ۳۰,۶۶۰ | ۱۷,۴۵۹ | ۳۵,۹۰۵ | ۲۲,۷۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار | # | ۸۰۱۴۸۶ | ۱۸,۸۶۱ | ۱۳,۲۰۲ | ۵۹,۳۸۰ | ۴۶,۱۷۹ | ۳۰,۶۶۰ | ۱۷,۴۵۹ | ۳۵,۹۰۵ | ۲۲,۷۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی استریول (E۳) سرم/ پلاسما | # | ۸۰۱۴۹۰ | ۱۸,۸۶۱ | ۱۳,۲۰۲ | ۵۹,۳۸۰ | ۴۶,۱۷۹ | ۳۰,۶۶۰ | ۱۷,۴۵۹ | ۳۵,۹۰۵ | ۲۲,۷۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی اندروستندیون Androstenedione سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۴۹۵ | ۱۹,۱۱۳ | ۱۳,۳۷۸ | ۶۲,۴۰۶ | ۴۹,۰۲۸ | ۳۰,۸۷۶ | ۱۷,۴۹۸ | ۳۶,۱۱۴ | ۲۲,۷۳۶ |
| اندازه‌گیری کمّی هورمون پاراتیروتید PTH سرم /پلاسما | # | ۸۰۱۵۰۰ | ۲۰,۰۲۸ | ۱۴,۰۱۸ | ۶۳,۱۵۴ | ۴۹,۱۳۶ | ۳۲,۵۴۸ | ۱۸,۵۳۰ | ۳۸,۱۱۴ | ۲۴,۰۹۶ |
| اندازه‌گیری کمّی کلسی تونین Calcitonin سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۰۵ | ۲۰,۰۶۴ | ۱۴,۰۴۴ | ۶۴,۳۴۵ | ۵۰,۳۰۱ | ۳۲,۵۱۴ | ۱۸,۴۷۰ | ۳۸,۰۵۳ | ۲۴,۰۰۹ |
| اندازه‌گیری کمّی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D (۲۵-Hydroxy Vitamin D) سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۱۰ | ۱۷,۴۶۹ | ۱۲,۲۲۸ | ۶۰,۷۳۰ | ۴۸,۵۰۲ | ۲۷,۹۰۰ | ۱۵,۶۷۲ | ۳۲,۵۶۰ | ۲۰,۳۳۲ |
| اندازه‌گیری کمّی ۱و۲۵-هیدروکسی ویتامین D (۱,۲۵-Hydroxy Vitamin D) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۱۵ | ۱۷,۴۶۹ | ۱۲,۲۲۸ | ۶۰,۷۳۰ | ۴۸,۵۰۲ | ۲۷,۹۰۰ | ۱۵,۶۷۲ | ۳۲,۵۶۰ | ۲۰,۳۳۲ |
| اندازه‌گیری کمّی رنین (Renin)در پلاسما | # | ۸۰۱۵۲۰ | ۱۹,۳۵۵ | ۱۳,۵۴۷ | ۶۰,۹۴۵ | ۴۷,۳۹۸ | ۳۱,۴۶۲ | ۱۷,۹۱۵ | ۳۶,۸۴۴ | ۲۳,۲۹۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Angiotensin Converting Enzyme (ACE در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۲۵ | ۲۷,۰۰۹ | ۱۸,۹۰۵ | ۸۸,۲۷۰ | ۶۹,۳۶۵ | ۴۳,۶۲۴ | ۲۴,۷۱۹ | ۵۱,۰۲۳ | ۳۲,۱۱۸ |
| اندازه‌گیری کمّی Angiotensin II در پلاسما | # | ۸۰۱۵۳۰ | ۲۴,۶۹۹ | ۱۷,۲۸۸ | ۸۳,۵۶۱ | ۶۶,۲۷۳ | ۳۹,۶۴۶ | ۲۲,۳۵۸ | ۴۶,۳۱۴ | ۲۹,۰۲۶ |
| اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۳۵ | ۲۱,۷۸۵ | ۱۵,۲۴۹ | ۷۳,۷۱۴ | ۵۸,۴۶۵ | ۳۴,۹۶۸ | ۱۹,۷۱۹ | ۴۰,۸۴۹ | ۲۵,۶۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در ادرار | # | ۸۰۱۵۳۶ | ۲۱,۷۸۵ | ۱۵,۲۴۹ | ۷۳,۷۱۴ | ۵۸,۴۶۵ | ۳۴,۹۶۸ | ۱۹,۷۱۹ | ۴۰,۸۴۹ | ۲۵,۶۰۰ |
| اندازه‌گیری کمّی اریتروپوئتین (EPO ) در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۴۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی Adrenocorticotropic Hormone(ACTH) در پلاسما | # | ۸۰۱۵۴۵ | ۱۷,۹۱۰ | ۱۲,۵۳۶ | ۵۷,۴۴۱ | ۴۴,۹۰۵ | ۲۹,۰۲۲ | ۱۶,۴۸۶ | ۳۳,۹۶۶ | ۲۱,۴۳۰ |
| اندازه‌گیری کمّی Cortisol در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۵۰ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۰,۴۷۱ | ۴۶,۴۰۳ | ۳۵,۹۳۲ | ۲۴,۳۷۸ | ۱۳,۹۰۷ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۸,۰۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی Cortisol در ادرار | # | ۸۰۱۵۵۱ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۰,۴۷۱ | ۴۶,۴۰۳ | ۳۵,۹۳۲ | ۲۴,۳۷۸ | ۱۳,۹۰۷ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۸,۰۹۱ |
| اندازه‌گیری کمّی هورمون رشد انسانی Human Growth(HGH) Hormone در سرم/پلاسما سطح پایه | # | ۸۰۱۵۵۵ | ۱۶,۲۶۲ | ۱۱,۳۸۲ | ۵۰,۴۵۴ | ۳۹,۰۷۲ | ۲۶,۵۰۰ | ۱۵,۱۱۸ | ۳۱,۰۴۸ | ۱۹,۶۶۶ |
| اندازه‌گیری کمّی HGH در سرم/پلاسما، بعد از تحریک یا مهار (L-Dopa ، ورزش یا سایر محرک ها)، به ازای هر بار، | # | ۸۰۱۵۶۰ | ۱۵,۲۴۸ | ۱۰,۶۷۳ | ۵۰,۶۲۰ | ۳۹,۹۴۷ | ۲۴,۵۶۰ | ۱۳,۸۸۷ | ۲۸,۷۱۰ | ۱۸,۰۳۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Insulin در سرم | # | ۸۰۱۵۶۵ | ۱۶,۰۷۷ | ۱۱,۲۵۳ | ۵۰,۶۳۴ | ۳۹,۳۸۱ | ۲۶,۱۳۲ | ۱۴,۸۷۹ | ۳۰,۶۰۲ | ۱۹,۳۴۹ |
| اندازه‌گیری کمّی C-Peptide در سرم | # | ۸۰۱۵۷۰ | ۱۷,۴۱۶ | ۱۲,۱۹۰ | ۵۵,۸۷۶ | ۴۳,۶۸۶ | ۲۸,۲۲۰ | ۱۶,۰۳۰ | ۳۳,۰۲۷ | ۲۰,۸۳۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Glucagon در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۷۵ | ۱۶,۶۰۰ | ۱۱,۶۲۰ | ۵۴,۲۱۴ | ۴۲,۵۹۵ | ۲۶,۸۱۶ | ۱۵,۱۹۷ | ۳۱,۳۶۵ | ۱۹,۷۴۶ |
| اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم | # | ۸۰۱۵۸۰ | ۱۹,۱۸۳ | ۱۳,۴۲۶ | ۵۹,۴۷۷ | ۴۶,۰۵۱ | ۳۱,۲۶۲ | ۱۷,۸۳۶ | ۳۶,۶۲۸ | ۲۳,۲۰۲ |
| اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم بعد از تحریک سکرتین | # | ۸۰۱۵۸۵ | ۱۸,۷۹۸ | ۱۳,۱۵۸ | ۶۱,۴۸۵ | ۴۸,۳۲۷ | ۳۰,۳۵۸ | ۱۷,۲۰۰ | ۳۵,۵۰۶ | ۲۲,۳۴۸ |
| اندازه‌گیری کمّی Beta HCG در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۵۹۰ | ۱۶,۰۷۷ | ۱۱,۲۵۳ | ۵۰,۶۳۴ | ۳۹,۳۸۱ | ۲۶,۱۳۲ | ۱۴,۸۷۹ | ۳۰,۶۰۲ | ۱۹,۳۴۹ |
| اندازه‌گیری کمّی Beta-HCG در سرم/پلاسما با تیتراژ حداقل با سه رقت | # | ۸۰۱۵۹۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی وازوپرسین یا ADH در سرم/پلاسما | # | ۸۰۱۶۰۰ | ۱۹,۷۳۰ | ۱۳,۸۱۰ | ۶۵,۸۹۶ | ۵۲,۰۸۶ | ۳۱,۷۴۴ | ۱۷,۹۳۴ | ۳۷,۱۰۰ | ۲۳,۲۹۰ |
| اندازه‌گیری کمّی میکروآلبومین در ادرار به روش الایزا یا ایمونوتوربیدیمتری | # | ۸۰۱۶۰۵ | ۲۶,۲۳۷ | ۱۸,۳۶۵ | ۸۶,۹۷۵ | ۶۸,۶۱۱ | ۴۲,۲۷۰ | ۲۳,۹۰۶ | ۴۹,۴۱۵ | ۳۱,۰۵۱ |
| اندازه‌گیری کمّی هورمون های دیگری که به روشهای RIA و الایزا اندازه‌گیری می‌شوند | #* | ۸۰۱۶۱۰ | ۲۲,۸۱۶ | - | ۷۷,۲۱۱ | ۷۷,۲۱۱ | ۳۶,۶۲۲ | ۳۶,۶۲۲ | ۴۲,۷۸۱ | ۴۲,۷۸۱ |
| اندازه‌گیری کمّی Insulin IGF-۱ ((Like Growth Factor ۱ | #* | ۸۰۱۶۱۵ | ۲۳,۹۱۶ | - | ۷۷,۷۷۹ | ۷۷,۷۷۹ | ۳۸,۶۶۲ | ۳۸,۶۶۲ | ۴۵,۲۲۷ | ۴۵,۲۲۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Free Beta-HCG در سرم/پلاسما | #* | ۸۰۱۶۲۰ | ۲۹,۳۳۹ | - | ۹۰,۵۰۷ | ۹۰,۵۰۷ | ۴۷,۸۵۴ | ۴۷,۸۵۴ | ۵۶,۰۷۷ | ۵۶,۰۷۷ |
| آنتی بادی ها یا هورمون هایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه گیری می‌شوند | #* | ۸۰۱۶۲۵ | ۲۹,۳۳۹ | - | ۹۰,۵۰۷ | ۹۰,۵۰۷ | ۴۷,۸۵۴ | ۴۷,۸۵۴ | ۵۶,۰۷۷ | ۵۶,۰۷۷ |
| تومورمارکرهایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه‌گیری می‌شوند | #* | ۸۰۱۸۰۰ | ۲۹,۳۳۹ | - | ۹۰,۵۰۷ | ۹۰,۵۰۷ | ۴۷,۸۵۴ | ۴۷,۸۵۴ | ۵۶,۰۷۷ | ۵۶,۰۷۷ |
| اندازه‌گیری کمّی CEA(Carcinoembryonic) Antigen در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۱۸۰۵ | ۲۴,۶۴۸ | ۱۷,۲۵۲ | ۷۲,۵۷۲ | ۵۵,۳۲۰ | ۴۰,۵۰۴ | ۲۳,۲۵۲ | ۴۷,۵۳۲ | ۳۰,۲۸۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه‌گیری کمّی CEA(Carcinoembryonic) Antigen در مایعات بدن | # | ۸۰۱۸۰۶ | ۲۴,۶۴۸ | ۱۷,۲۵۲ | ۷۲,۵۷۲ | ۵۵,۳۲۰ | ۴۰,۵۰۴ | ۲۳,۲۵۲ | ۴۷,۵۳۲ | ۳۰,۲۸۰ |
| اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۱۸۱۰ | ۲۰,۰۴۸ | ۱۴,۰۳۲ | ۶۰,۶۸۲ | ۴۶,۶۵۰ | ۳۲,۸۰۰ | ۱۸,۷۶۸ | ۳۸,۴۵۹ | ۲۴,۴۲۷ |
| اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در مایع آمنیون | # | ۸۰۱۸۱۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی PSA در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۱۸۲۰ | ۲۸,۰۴۹ | ۱۹,۶۳۲ | ۸۴,۸۰۸ | ۶۵,۱۷۶ | ۴۵,۹۰۰ | ۲۶,۲۶۸ | ۵۳,۸۲۱ | ۳۴,۱۸۹ |
| اندازه‌گیری کمّی Free PSAدر سرم/ پلاسما | # | ۸۰۱۸۲۵ | ۲۳,۱۳۴ | ۱۶,۱۹۲ | ۷۱,۹۹۷ | ۵۵,۸۰۵ | ۳۷,۶۷۸ | ۲۱,۴۸۶ | ۴۴,۱۴۰ | ۲۷,۹۴۸ |
| اندازه‌گیری کمّی(Hormon(SHBG Binding Globolin Sex در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۱۸۳۰ | ۲۰,۴۱۶ | ۱۴,۲۹۰ | ۶۶,۴۵۷ | ۵۲,۱۶۷ | ۳۲,۹۹۸ | ۱۸,۷۰۸ | ۳۸,۶۰۰ | ۲۴,۳۱۰ |
| اندازه‌گیری کمّی CA ۹-۱۹ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن | # | ۸۰۱۸۳۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی CA ۳-۱۵ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن | # | ۸۰۱۸۴۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی CA ۱۲۵ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن | # | ۸۰۱۸۴۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| تومورمارکرهای درج نشده دیگر | #* | ۸۰۱۸۵۰ | ۲۹,۳۳۹ | - | ۹۰,۵۰۷ | ۹۰,۵۰۷ | ۴۷,۸۵۴ | ۴۷,۸۵۴ | ۵۶,۰۷۷ | ۵۶,۰۷۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Cyfra ۱-۲۱ در سرم | #* | ۸۰۱۸۵۵ | ۲۹,۳۳۹ | - | ۹۰,۵۰۷ | ۹۰,۵۰۷ | ۴۷,۸۵۴ | ۴۷,۸۵۴ | ۵۶,۰۷۷ | ۵۶,۰۷۷ |
| آنتی بادی Anti NSE(Neuron- Specific Enolase) | #* | ۸۰۱۸۵۶ | ۱۶,۶۰۷ | - | ۵۳,۳۹۰ | ۵۳,۳۹۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۳۱,۴۸۰ | ۳۱,۴۸۰ |
| آزمایش Chromogranin A به روش الایزا | #* | ۸۰۱۸۵۷ | ۴۰,۳۰۸ | - | ۱۴۰,۷۸۰ | ۱۴۰,۷۸۰ | ۶۴,۳۲۰ | ۶۴,۳۲۰ | ۷۵,۰۵۰ | ۷۵,۰۵۰ |
| آزمایش CBC (هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیس‌های سلولی) و شمارش افتراقی گلبولهای سفید | # | ۸۰۲۰۰۰ | ۵,۴۴۰ | ۳,۸۰۷ | ۱۶,۳۹۱ | ۱۲,۵۸۴ | ۸,۹۰۶ | ۵,۰۹۹ | ۱۰,۴۴۴ | ۶,۶۳۷ |
| آزمایش شمارش گلبولهای سفید به تنهایی | # | ۸۰۲۰۰۵ | ۳,۰۵۶ | ۲,۱۳۹ | ۹,۳۰۰ | ۷,۱۶۱ | ۴,۹۹۶ | ۲,۸۵۷ | ۵,۸۵۷ | ۳,۷۱۸ |
| اندازه‌گیری هموگلوبین | # | ۸۰۲۰۱۰ | ۱,۳۰۳ | ۹۱۲ | ۴,۰۵۱ | ۳,۱۳۹ | ۲,۱۲۲ | ۱,۲۱۰ | ۲,۴۸۶ | ۱,۵۷۴ |
| اندازه‌گیری هماتوکریت | # | ۸۰۲۰۱۵ | ۱,۳۰۳ | ۹۱۲ | ۴,۰۵۱ | ۳,۱۳۹ | ۲,۱۲۲ | ۱,۲۱۰ | ۲,۴۸۶ | ۱,۵۷۴ |
| شمارش رتیکولوسیت‌ها | # | ۸۰۲۰۲۰ | ۳,۲۷۸ | ۲,۲۹۵ | ۱۰,۳۱۱ | ۸,۰۱۶ | ۵,۳۳۰ | ۳,۰۳۵ | ۶,۲۴۲ | ۳,۹۴۷ |
| شمارش پلاکت‌ها | # | ۸۰۲۰۲۵ | ۲,۰۱۹ | ۱,۴۱۳ | ۶,۶۲۷ | ۵,۲۱۴ | ۳,۲۵۸ | ۱,۸۴۵ | ۳,۸۱۰ | ۲,۳۹۷ |
| اندازه گیری سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز | # | ۸۰۲۰۳۰ | ۱,۷۹۷ | ۱,۲۵۸ | ۵,۶۱۶ | ۴,۳۵۹ | ۲,۹۲۴ | ۱,۶۶۷ | ۳,۴۲۵ | ۲,۱۶۸ |
| آزمایش تجسس سلول LE | # | ۸۰۲۰۳۵ | ۵,۴۸۳ | ۳,۸۳۷ | ۱۶,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۱ | ۸,۹۵۶ | ۵,۱۱۹ | ۱۰,۴۹۸ | ۶,۶۶۱ |
| آزمایش شمارش افتراقی ائوزینوفیل در ترشحات بینی و سایر مایعات بدن | # | ۸۰۲۰۴۵ | ۲,۷۳۵ | ۱,۹۱۴ | ۹,۲۰۳ | ۷,۲۸۹ | ۴,۳۹۴ | ۲,۴۸۰ | ۵,۱۳۴ | ۳,۲۲۰ |
| آزمایش شمارش مطلق ائوزینوفیل در ادرار | # | ۸۰۲۰۵۰ | ۲,۷۳۵ | ۱,۹۱۴ | ۹,۲۰۳ | ۷,۲۸۹ | ۴,۳۹۴ | ۲,۴۸۰ | ۵,۱۳۴ | ۳,۲۲۰ |
| آزمایش شکنندگی گلبول‌های قرمز (Osmotic Fragility Test) | # | ۸۰۲۰۵۵ | ۲,۸۲۸ | ۱,۹۷۹ | ۹,۱۱۳ | ۷,۱۳۴ | ۴,۵۷۸ | ۲,۵۹۹ | ۵,۳۵۷ | ۳,۳۷۸ |
| آزمایش داسی شدن گلبول قرمز بوسیله متابیسولفیت سدیم (Sickle cell Prep) | # | ۸۰۲۰۶۰ | ۳,۴۵۷ | ۲,۴۲۰ | ۱۰,۹۵۵ | ۸,۵۳۵ | ۵,۶۱۴ | ۳,۱۹۴ | ۶,۵۷۳ | ۴,۱۵۳ |
| اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین پلاسما | # | ۸۰۲۰۶۵ | ۲,۹۱۴ | ۲,۰۴۰ | ۹,۸۴۷ | ۷,۸۰۸ | ۴,۶۷۸ | ۲,۶۳۹ | ۵,۴۶۵ | ۳,۴۲۶ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش تجسس میکروسکوپی گسترش خون از نظر انگل‌هایی نظیرمالاریا، بورلیا، تریپانوزوم و سایر موارد مشابه | # | ۸۰۲۰۷۰ | ۳,۲۷۸ | ۲,۲۹۵ | ۱۰,۳۱۱ | ۸,۰۱۶ | ۵,۳۳۰ | ۳,۰۳۵ | ۶,۲۴۲ | ۳,۹۴۷ |
| آزمایش تجسس اجسام هاینز در خون محیطی | # | ۸۰۲۰۷۵ | ۱,۵۲۵ | ۱,۰۶۷ | ۵,۰۶۲ | ۳,۹۹۵ | ۲,۴۵۶ | ۱,۳۸۹ | ۲,۸۷۱ | ۱,۸۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی Red Cell Mass | # | ۸۰۲۰۸۰ | ۱۳,۷۶۶ | ۹,۶۳۶ | ۴۵,۹۲۵ | ۳۶,۲۸۹ | ۲۲,۱۵۴ | ۱۲,۵۱۸ | ۲۵,۸۹۳ | ۱۶,۲۵۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Total Blood Volume | # | ۸۰۲۰۸۵ | ۱۳,۷۶۶ | ۹,۶۳۶ | ۴۵,۹۲۵ | ۳۶,۲۸۹ | ۲۲,۱۵۴ | ۱۲,۵۱۸ | ۲۵,۸۹۳ | ۱۶,۲۵۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Total Plasma Volume | # | ۸۰۲۰۹۰ | ۱۳,۷۶۶ | ۹,۶۳۶ | ۴۵,۹۲۵ | ۳۶,۲۸۹ | ۲۲,۱۵۴ | ۱۲,۵۱۸ | ۲۵,۸۹۳ | ۱۶,۲۵۷ |
| سایر آزمایش های خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند | #* | ۸۰۲۰۹۵ | ۳,۲۷۸ | - | ۱۰,۳۱۱ | ۱۰,۳۱۱ | ۵,۳۳۰ | ۵,۳۳۰ | ۶,۲۴۲ | ۶,۲۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون (BT) | # | ۸۰۲۲۰۰ | ۱,۷۹۷ | ۱,۲۵۸ | ۵,۶۱۶ | ۴,۳۵۹ | ۲,۹۲۴ | ۱,۶۶۷ | ۳,۴۲۵ | ۲,۱۶۸ |
| اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون با روش IVY | # | ۸۰۲۲۰۵ | ۲,۶۴۹ | ۱,۸۵۴ | ۸,۴۶۹ | ۶,۶۱۵ | ۴,۲۹۴ | ۲,۴۴۰ | ۵,۰۲۶ | ۳,۱۷۲ |
| اندازه‌گیری کمّی زمان انعقاد خون (CT) | # | ۸۰۲۲۱۰ | ۲,۴۷۰ | ۱,۷۲۹ | ۷,۸۲۵ | ۶,۰۹۷ | ۴,۰۱۰ | ۲,۲۸۲ | ۴,۶۹۵ | ۲,۹۶۷ |
| اندازه‌گیری کمّی زمان پروتومبین (PT ) با تعیین میزان INR | # | ۸۰۲۲۱۵ | ۵,۹۲۷ | ۴,۱۴۸ | ۱۸,۷۸۰ | ۱۴,۶۳۲ | ۹,۶۲۴ | ۵,۴۷۶ | ۱۱,۲۶۸ | ۷,۱۲۰ |
| اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT یا aPTT) | # | ۸۰۲۲۲۰ | ۵,۷۹۱ | ۴,۰۵۳ | ۱۸,۵۰۳ | ۱۴,۴۵۰ | ۹,۳۹۰ | ۵,۳۳۷ | ۱۰,۹۹۱ | ۶,۹۳۸ |
| بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری | #* | ۸۰۲۲۲۱ | ۱۳۹,۱۸۹ | - | ۴۹۸,۶۵۰ | ۴۹۸,۶۵۰ | ۲۲۱,۰۲۰ | ۲۲۱,۰۲۰ | ۲۵۷,۶۴۰ | ۲۵۷,۶۴۰ |
| بررسی مسیر خارجی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری | #* | ۸۰۲۲۲۲ | ۱۴۴,۵۵۹ | - | ۵۱۷,۹۷۰ | ۵۱۷,۹۷۰ | ۲۲۹,۵۴۰ | ۲۲۹,۵۴۰ | ۲۶۷,۵۷۰ | ۲۶۷,۵۷۰ |
| بررسی اثر فیبرینوژن بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری | #* | ۸۰۲۲۲۳ | ۱۷۴,۹۸۹ | - | ۶۲۷,۴۵۰ | ۶۲۷,۴۵۰ | ۲۷۷,۸۲۰ | ۲۷۷,۸۲۰ | ۳۲۳,۸۴۰ | ۳۲۳,۸۴۰ |
| بررسی اثر هپارین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری | #* | ۸۰۲۲۲۴ | ۱۷۴,۹۸۹ | - | ۶۲۷,۴۵۰ | ۶۲۷,۴۵۰ | ۲۷۷,۸۲۰ | ۲۷۷,۸۲۰ | ۳۲۳,۸۴۰ | ۳۲۳,۸۴۰ |
| اندازه‌گیری کمّی فیبرینوژن | # | ۸۰۲۲۲۵ | ۶,۹۵۸ | ۴,۸۷۰ | ۲۲,۲۷۷ | ۱۷,۴۰۷ | ۱۱,۲۷۸ | ۶,۴۰۸ | ۱۳,۲۰۰ | ۸,۳۳۰ |
| بررسی اثر آپروتینین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری | #* | ۸۰۲۲۲۶ | ۱۷۴,۹۸۹ | - | ۶۲۷,۴۵۰ | ۶۲۷,۴۵۰ | ۲۷۷,۸۲۰ | ۲۷۷,۸۲۰ | ۳۲۳,۸۴۰ | ۳۲۳,۸۴۰ |
| آزمایش حل شدن فیبرین | # | ۸۰۲۲۳۰ | ۱,۸۸۳ | ۱,۳۱۸ | ۶,۳۵۰ | ۵,۰۳۲ | ۳,۰۲۴ | ۱,۷۰۶ | ۳,۵۳۳ | ۲,۲۱۵ |
| آزمایش مصرف پروترومبین | # | ۸۰۲۲۳۵ | ۳,۴۰۸ | ۲,۳۸۵ | ۱۱,۴۱۲ | ۹,۰۲۷ | ۵,۴۸۰ | ۳,۰۹۵ | ۶,۴۰۴ | ۴,۰۱۹ |
| اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبین (TT) | # | ۸۰۲۲۴۰ | ۵,۴۲۶ | ۳,۷۹۸ | ۱۸,۰۳۹ | ۱۴,۲۴۱ | ۸,۷۳۸ | ۴,۹۴۰ | ۱۰,۲۱۴ | ۶,۴۱۶ |
| اندازه‌گیری کمّی زمان رپتیلاز | # | ۸۰۲۲۴۵ | ۳,۴۰۸ | ۲,۳۸۵ | ۱۱,۴۱۲ | ۹,۰۲۷ | ۵,۴۸۰ | ۳,۰۹۵ | ۶,۴۰۴ | ۴,۰۱۹ |
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی II | # | ۸۰۲۲۴۶ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی V | # | ۸۰۲۲۴۷ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VII | # | ۸۰۲۲۴۸ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VIII | # | ۸۰۲۲۴۹ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی IX | # | ۸۰۲۲۵۰ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی X | # | ۸۰۲۲۵۱ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XI | # | ۸۰۲۲۵۲ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XII | # | ۸۰۲۲۵۳ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی مواد حاصل از تخریب فیبرین (FDP) (کد ۸۰۲۳۳۰ همزمان قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد) | # | ۸۰۲۲۵۵ | ۱۷,۷۱۸ | ۱۲,۴۰۲ | ۵۸,۴۴۵ | ۴۶,۰۴۴ | ۲۸,۵۷۰ | ۱۶,۱۶۹ | ۳۳,۴۰۵ | ۲۱,۰۰۴ |
| آزمایش لیز شدن یوگلوبولین (ELT) | # | ۸۰۲۲۶۰ | ۶,۴۵۷ | ۴,۵۲۰ | ۲۱,۵۳۶ | ۱۷,۰۱۶ | ۱۰,۳۹۲ | ۵,۸۷۲ | ۱۲,۱۴۶ | ۷,۶۲۶ |
| اندازه‌گیری کمّی فاکتور فون ویلبراند | # | ۸۰۲۲۶۵ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی فاکتور XIII | # | ۸۰۲۲۷۰ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی فاکتورIII پلاکتی | # | ۸۰۲۲۷۵ | ۴۰,۸۰۵ | ۲۸,۵۶۲ | ۱۳۶,۲۱۰ | ۱۰۷,۶۴۸ | ۶۵,۶۶۰ | ۳۷,۰۹۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۴۸,۱۷۸ |
| اندازه‌گیری کمّی پروتئین C | # | ۸۰۲۲۸۰ | ۷۴,۰۸۵ | ۵۱,۸۵۵ | ۲۳۴,۷۵۰ | ۱۸۲,۸۹۵ | ۱۲۰,۳۰۰ | ۶۸,۴۴۵ | ۱۴۰,۸۵۰ | ۸۸,۹۹۵ |
| اندازه‌گیری کمّی پروتئین S | # | ۸۰۲۲۸۵ | ۷۴,۰۸۵ | ۵۱,۸۵۵ | ۲۳۴,۷۵۰ | ۱۸۲,۸۹۵ | ۱۲۰,۳۰۰ | ۶۸,۴۴۵ | ۱۴۰,۸۵۰ | ۸۸,۹۹۵ |
| اندازه‌گیری کمّی آنتی ترومبینIII یا سایر مهارکننده‌های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و فون‌ویلبراند فاکتور | # | ۸۰۲۲۹۰ | ۴۰,۸۰۲ | ۲۸,۵۵۹ | ۱۳۰,۸۹۹ | ۱۰۲,۳۴۰ | ۶۶,۱۱۴ | ۳۷,۵۵۵ | ۷۷,۳۷۶ | ۴۸,۸۱۷ |
| آزمایش تجمع پلاکت‌ها به ازای هر معرف (Platelet aggregation) | # | ۸۰۲۲۹۵ | ۶۴,۹۳۷ | ۴۵,۴۵۵ | ۲۲۷,۲۷۰ | ۱۸۱,۸۱۵ | ۱۰۳,۵۸۰ | ۵۸,۱۲۵ | ۱۲۰,۸۵۰ | ۷۵,۳۹۵ |
| آزمایش چسبندگی پلاکت (Platelet adhesion) | # | ۸۰۲۳۰۰ | ۴,۲۶۰ | ۲,۹۸۲ | ۱۴,۲۶۵ | ۱۱,۲۸۴ | ۶,۸۵۰ | ۳,۸۶۹ | ۸,۰۰۵ | ۵,۰۲۴ |
| آزمایش رکلسیفیکاسیون پلاسما (PRT) | # | ۸۰۲۳۰۵ | ۲,۴۲۰ | ۱,۶۹۴ | ۸,۲۸۲ | ۶,۵۸۸ | ۳,۸۷۶ | ۲,۱۸۲ | ۴,۵۲۶ | ۲,۸۳۲ |
| آزمایش جمع شدن لخته (Clot Retraction) | # | ۸۰۲۳۱۵ | ۱,۵۲۵ | ۱,۰۶۷ | ۵,۰۶۲ | ۳,۹۹۵ | ۲,۴۵۶ | ۱,۳۸۹ | ۲,۸۷۱ | ۱,۸۰۴ |
| آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری | # | ۸۰۲۳۲۰ | ۴۷,۱۵۳ | ۳۳,۰۰۵ | ۱۵۴,۱۷۳ | ۱۲۱,۱۶۸ | ۷۶,۱۵۴ | ۴۳,۱۴۹ | ۸۹,۰۶۹ | ۵۶,۰۶۴ |
| آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روش IF | # | ۸۰۲۳۲۵ | ۱۴,۰۸۸ | ۹,۸۶۱ | ۴۶,۰۲۲ | ۳۶,۱۶۱ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۲,۸۹۵ | ۲۶,۶۱۶ | ۱۶,۷۵۵ |
| اندازه‌گیری کمّی D-Dimer | # | ۸۰۲۳۳۰ | ۳۵,۳۵۹ | ۲۴,۷۵۰ | ۱۲۰,۶۴۳ | ۹۵,۸۹۳ | ۵۶,۶۷۰ | ۳۱,۹۲۰ | ۶۶,۱۸۱ | ۴۱,۴۳۱ |
| اندازه‌گیری Post(PVO-ELT) Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time | # | ۸۰۲۳۳۵ | ۱۰,۲۲۹ | ۷,۱۶۰ | ۳۳,۴۱۲ | ۲۶,۲۵۲ | ۱۶,۵۲۴ | ۹,۳۶۴ | ۱۹,۳۲۷ | ۱۲,۱۶۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Plasminogen Activator Inhibitor) | # | ۸۰۲۳۴۰ | ۵,۴۲۶ | ۳,۷۹۸ | ۱۸,۰۳۹ | ۱۴,۲۴۱ | ۸,۷۳۸ | ۴,۹۴۰ | ۱۰,۲۱۴ | ۶,۴۱۶ |
| اندازه‌گیری TPA (Tissue Plasminogen Activator) | # | ۸۰۲۳۴۵ | ۲۵,۱۸۶ | ۱۷,۶۲۹ | ۸۵,۹۵۰ | ۶۸,۳۲۱ | ۴۰,۳۶۴ | ۲۲,۷۳۵ | ۴۷,۱۳۸ | ۲۹,۵۰۹ |
| آزمایش APC-R (Activated Protein C Resistance) | # | ۸۰۲۳۵۰ | ۱۹,۲۹۲ | ۱۳,۵۰۴ | ۶۳,۰۵۰ | ۴۹,۵۴۷ | ۳۱,۱۶۰ | ۱۷,۶۵۷ | ۳۶,۴۴۵ | ۲۲,۹۴۲ |
| آزمایش Functional Clotting Protein | #* | ۸۰۲۳۵۵ | ۲۷,۵۹۶ | - | ۸۹,۷۴۵ | ۸۹,۷۴۵ | ۴۴,۶۱۰ | ۴۴,۶۱۰ | ۵۲,۱۸۵ | ۵۲,۱۸۵ |
| اندازه‌گیری کمّی Plasmin Inhibitor | #* | ۸۰۲۳۶۰ | ۱۷,۵۴۵ | - | ۵۶,۹۷۷ | ۵۶,۹۷۷ | ۲۸,۳۷۰ | ۲۸,۳۷۰ | ۳۳,۱۸۹ | ۳۳,۱۸۹ |
| اندازه‌گیری کمّی Heparin | #* | ۸۰۲۳۶۵ | ۳۰,۶۰۲ | - | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ | ۴۹,۴۷۲ | ۴۹,۴۷۲ | ۵۷,۸۷۳ | ۵۷,۸۷۳ |
| اندازه‌گیری کمّی فاکتورهای انعقادی II,X,VII (هپاتوکمپلکس) | #* | ۸۰۲۳۷۰ | ۳۰,۶۰۲ | - | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ | ۴۹,۴۷۲ | ۴۹,۴۷۲ | ۵۷,۸۷۳ | ۵۷,۸۷۳ |
| سایر آزمایش‌های مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اند | #* | ۸۰۲۳۷۵ | ۵,۷۹۱ | - | ۱۸,۵۰۳ | ۱۸,۵۰۳ | ۹,۳۹۰ | ۹,۳۹۰ | ۱۰,۹۹۱ | ۱۰,۹۹۱ |
| آزمایش تعیین گروه خون ABO,Rh,Du | # | ۸۰۲۵۰۰ | ۶,۴۲۷ | ۴,۴۹۹ | ۱۹,۵۲۱ | ۱۵,۰۲۲ | ۱۰,۵۱۰ | ۶,۰۱۱ | ۱۲,۳۲۲ | ۷,۸۲۳ |
| آزمایش تعیین ژنوتیپ Rh(E ,e,C,c)؛ هر کدام | # | ۸۰۲۵۰۵ | ۲,۵۵۶ | ۱,۷۸۹ | ۸,۵۵۹ | ۶,۷۷۰ | ۴,۱۱۰ | ۲,۳۲۱ | ۴,۸۰۳ | ۳,۰۱۴ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش پانل سل (تشخیص آنتی‌بادی‌های غیر طبیعی در سرم) | #* | ۸۰۲۵۱۰ | ۳۴,۹۳۸ | - | ۱۲۱,۴۶۰ | ۱۲۱,۴۶۰ | ۵۵,۸۰۰ | ۵۵,۸۰۰ | ۶۵,۱۲۰ | ۶۵,۱۲۰ |
| آزمایش کراس ماچ استاندارد | # | ۸۰۲۵۱۵ | ۹,۵۲۰ | ۶,۶۶۳ | ۳۰,۰۱۲ | ۲۳,۳۴۹ | ۱۵,۴۷۲ | ۸,۸۰۹ | ۱۸,۱۱۸ | ۱۱,۴۵۵ |
| آزمایش کراسماچ به روش فلوسایتومتری | # | ۸۰۲۵۲۰ | ۳۴,۶۶۳ | ۲۴,۲۶۳ | ۱۱۵,۵۹۵ | ۹۱,۳۳۲ | ۵۵,۷۸۶ | ۳۱,۵۲۳ | ۶۵,۲۰۲ | ۴۰,۹۳۹ |
| آزمایش کومبس مستقیم | # | ۸۰۲۵۲۵ | ۲,۹۶۳ | ۲,۰۷۴ | ۹,۳۹۰ | ۷,۳۱۶ | ۴,۸۱۲ | ۲,۷۳۸ | ۵,۶۳۴ | ۳,۵۶۰ |
| آزمایش کومبس غیرمستقیم | # | ۸۰۲۵۳۰ | ۶,۰۲۰ | ۴,۲۱۳ | ۱۸,۶۹۰ | ۱۴,۴۷۷ | ۹,۸۰۸ | ۵,۵۹۵ | ۱۱,۴۹۱ | ۷,۲۷۸ |
| آزمایش غربالگری آنتی‌بادی ( Antibody S creening) | # | ۸۰۲۵۳۵ | ۱۴,۷۸۴ | ۱۰,۳۴۹ | ۵۱,۰۷۰ | ۴۰,۷۲۲ | ۲۳,۶۴۰ | ۱۳,۲۹۲ | ۲۷,۵۹۵ | ۱۷,۲۴۷ |
| آزمایش تعیین آنتی‌ژن‌های سایر گروه‌های خونی دیگر (مانند kell) | # | ۸۰۲۵۴۰ | ۴,۵۳۱ | ۳,۱۷۲ | ۱۴,۸۱۹ | ۱۱,۶۴۷ | ۷,۳۱۸ | ۴,۱۴۶ | ۸,۵۵۹ | ۵,۳۸۷ |
| آزمایش رد ابوت (Paternity Test) | #* | ۸۰۲۵۴۵ | ۱۳۰,۵۳۳ | - | ۴۳۵,۵۰۵ | ۴۳۵,۵۰۵ | ۲۱۰,۰۶۲ | ۲۱۰,۰۶۲ | ۲۴۵,۵۱۴ | ۲۴۵,۵۱۴ |
| FFP شامل آماده سازی (گرم کردن) هر واحد | # | ۸۰۲۵۵۰ | ۲,۰۱۹ | ۱,۴۱۳ | ۶,۶۲۷ | ۵,۲۱۴ | ۳,۲۵۸ | ۱,۸۴۵ | ۳,۸۱۰ | ۲,۳۹۷ |
| پلاسما فرزیس درمانی برای هر ۵۰۰ سی سی | # | ۸۰۲۵۵۵ | ۷۰,۸۹۳ | ۴۹,۶۲۳ | ۲۳۶,۶۱۹ | ۱۸۶,۹۹۶ | ۱۱۴,۰۷۸ | ۶۴,۴۵۵ | ۱۳۳,۳۲۹ | ۸۳,۷۰۶ |
| آزمایش کراس مچ WBC جهت پیوند | # | ۸۰۲۵۶۰ | ۲۲,۱۶۳ | ۱۵,۵۱۳ | ۷۲,۵۳۰ | ۵۷,۰۱۷ | ۳۵,۷۸۸ | ۲۰,۲۷۵ | ۴۱,۸۵۶ | ۲۶,۳۴۳ |
| آزمایش Reactive Ab Panel جهت پیوند | # | ۸۰۲۵۶۵ | ۳۷,۴۱۷ | ۲۶,۱۹۰ | ۱۲۲,۳۲۶ | ۹۶,۱۳۶ | ۶۰,۴۳۲ | ۳۴,۲۴۲ | ۷۰,۶۸۱ | ۴۴,۴۹۱ |
| آزمایش HLA A,B, C Typing تنها یک آنتی ژن(مانند B۵ یا B۲۷ ) | # | ۸۰۲۵۷۰ | ۳۸,۷۶۳ | ۲۷,۱۳۲ | ۱۲۶,۷۴۴ | ۹۹,۶۱۲ | ۶۲,۶۰۴ | ۳۵,۴۷۲ | ۷۳,۲۲۱ | ۴۶,۰۸۹ |
| آزمایشA,B,C HLA Typing چند آنتی ژن | # | ۸۰۲۵۷۵ | ۵۹,۹۹۸ | ۴۱,۹۹۶ | ۲۰۰,۱۷۴ | ۱۵۸,۱۷۸ | ۹۶,۵۵۲ | ۵۴,۵۵۶ | ۱۱۲,۸۴۷ | ۷۰,۸۵۱ |
| آزمایش HLA Typing کلاس I | # | ۸۰۲۵۸۰ | ۸۸,۱۲۷ | ۶۱,۶۸۶ | ۲۹۷,۹۸۶ | ۲۳۶,۳۰۰ | ۱۴۱,۴۷۶ | ۷۹,۷۹۰ | ۱۶۵,۲۷۴ | ۱۰۳,۵۸۸ |
| آزمایش HLA Typing کلاس II | # | ۸۰۲۵۸۵ | ۱۲۹,۰۶۵ | ۹۰,۳۴۲ | ۴۴۰,۶۰۸ | ۳۵۰,۲۶۶ | ۲۰۶,۸۳۲ | ۱۱۶,۴۹۰ | ۲۴۱,۵۴۰ | ۱۵۱,۱۹۸ |
| آزمایش بررسی CD مارکرهای سطحی به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری | # | ۸۰۲۵۹۰ | ۵۸,۳۴۰ | ۴۰,۸۳۵ | ۱۸۸,۷۰۰ | ۱۴۷,۸۶۵ | ۹۴,۴۰۰ | ۵۳,۵۶۵ | ۱۱۰,۴۵۰ | ۶۹,۶۱۵ |
| آزمایش بررسی CD مارکرهای سیتوپلاسمیک به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری | # | ۸۰۲۵۹۱ | ۱۲۰,۹۹۰ | ۸۴,۶۹۰ | ۴۱۴,۱۰۰ | ۳۲۹,۴۱۰ | ۱۹۳,۸۰۰ | ۱۰۹,۱۱۰ | ۲۲۶,۳۰۰ | ۱۴۱,۶۱۰ |
| آزمایش DQ/DR HLA Typing تنها یک آنتی ژن | # | ۸۰۲۵۹۵ | ۶۱,۰۲۹ | ۴۲,۷۱۸ | ۲۰۳,۶۷۱ | ۱۶۰,۹۵۳ | ۹۸,۲۰۶ | ۵۵,۴۸۸ | ۱۱۴,۷۷۹ | ۷۲,۰۶۱ |
| آزمایش DQ/DR Typing HLA چند آنتی ژن | # | ۸۰۲۶۰۰ | ۸۳,۲۷۱ | ۵۸,۲۸۶ | ۲۷۷,۷۵۹ | ۲۱۹,۴۷۳ | ۱۳۴,۰۱۰ | ۷۵,۷۲۴ | ۱۵۶,۶۲۸ | ۹۸,۳۴۲ |
| آزمایش MLC HLA Typing | # | ۸۰۲۶۰۵ | ۵۸,۵۴۹ | ۴۰,۹۸۲ | ۱۹۱,۳۵۹ | ۱۵۰,۳۷۸ | ۹۴,۵۶۶ | ۵۳,۵۸۵ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۶۹,۶۲۴ |
| آزمایش HLA Typing PLC | # | ۸۰۲۶۱۰ | ۲۳,۲۷۳ | ۱۶,۲۹۰ | ۷۷,۵۸۵ | ۶۱,۲۹۵ | ۳۷,۴۵۸ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۳,۷۸۱ | ۲۷,۴۹۱ |
| تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی | # | ۸۰۲۶۱۵ | ۴۰۳,۵۲۵ | ۲۸۲,۴۵۳ | ۱,۳۴۶,۴۵۷ | ۱,۰۶۴,۰۰۴ | ۶۴۹,۳۶۶ | ۳۶۶,۹۱۳ | ۷۵۸,۹۵۶ | ۴۷۶,۵۰۳ |
| آزمایش تعیین سکرتور، غیرسکرتور و نیمه سکرتور با نمونه بزاق | # | ۸۰۲۶۲۰ | ۲۶,۶۸۱ | ۱۸,۶۷۶ | ۸۸,۹۹۷ | ۷۰,۳۲۲ | ۴۲,۹۳۸ | ۲۴,۲۶۳ | ۵۰,۱۸۵ | ۳۱,۵۱۰ |
| آزمایش تیتراژ ImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B هر کدام | # | ۸۰۲۶۲۵ | ۷,۷۶۰ | ۵,۴۳۲ | ۲۵,۵۸۷ | ۲۰,۱۵۵ | ۱۲,۵۱۴ | ۷,۰۸۲ | ۱۴,۶۳۲ | ۹,۲۰۰ |
| آزمایش بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران | # | ۸۰۲۶۳۰ | ۷,۹۸۲ | ۵,۵۸۷ | ۲۶,۵۹۸ | ۲۱,۰۱۱ | ۱۲,۸۴۸ | ۷,۲۶۱ | ۱۵,۰۱۷ | ۹,۴۳۰ |
| فصد خون | # | ۸۰۲۶۳۵ | ۳۶,۳۶۳ | ۲۵,۴۵۲ | ۱۱۵,۹۹۰ | ۹۰,۵۳۸ | ۵۸,۹۸۰ | ۳۳,۵۲۸ | ۶۹,۰۴۰ | ۴۳,۵۸۸ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی CIC در سرم/پلاسما (Circulating Immune C omplex) | # | ۸۰۲۶۴۰ | ۷,۷۱۷ | ۵,۴۰۱ | ۲۵,۲۲۰ | ۱۹,۸۱۹ | ۱۲,۴۶۴ | ۷,۰۶۳ | ۱۴,۵۷۸ | ۹,۱۷۷ |
| آزمایش بررسی اتوهمولیز | # | ۸۰۲۶۴۵ | ۴,۱۲۴ | ۲,۸۸۶ | ۱۳,۹۸۸ | ۱۱,۱۰۲ | ۶,۶۱۶ | ۳,۷۳۰ | ۷,۷۲۸ | ۴,۸۴۲ |
| شستشوی خون هر واحد | #* | ۸۰۲۶۵۰ | ۳۲,۹۳۶ | - | ۱۰۷,۰۵۰ | ۱۰۷,۰۵۰ | ۵۳,۲۴۸ | ۵۳,۲۴۸ | ۶۲,۲۹۱ | ۶۲,۲۹۱ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گلبول قرمز متراکم | # | ۸۰۲۶۵۲ | ۵۸,۳۴۰ | ۴۰,۸۳۵ | ۱۸۸,۷۰۰ | ۱۴۷,۸۶۵ | ۹۴,۴۰۰ | ۵۳,۵۶۵ | ۱۱۰,۴۵۰ | ۶۹,۶۱۵ |
| پلاکت رندم | # | ۸۰۲۶۵۴ | ۴۰,۴۴۰ | ۲۸,۳۰۵ | ۱۲۴,۳۰۰ | ۹۵,۹۹۵ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۷,۶۹۵ | ۷۷,۳۵۰ | ۴۹,۰۴۵ |
| پلاسما FFP | # | ۸۰۲۶۵۶ | ۳۶,۳۶۳ | ۲۵,۴۵۲ | ۱۱۵,۹۹۰ | ۹۰,۵۳۸ | ۵۸,۹۸۰ | ۳۳,۵۲۸ | ۶۹,۰۴۰ | ۴۳,۵۸۸ |
| کرایوی خون | # | ۸۰۲۶۵۸ | ۳۶,۳۶۳ | ۲۵,۴۵۲ | ۱۱۵,۹۹۰ | ۹۰,۵۳۸ | ۵۸,۹۸۰ | ۳۳,۵۲۸ | ۶۹,۰۴۰ | ۴۳,۵۸۸ |
| گلبول قرمز با حذف لکوسیت | # | ۸۰۲۶۶۰ | ۹۸,۷۸۰ | ۶۹,۱۴۰ | ۳۱۳,۰۰۰ | ۲۴۳,۸۶۰ | ۱۶۰,۴۰۰ | ۹۱,۲۶۰ | ۱۸۷,۸۰۰ | ۱۱۸,۶۶۰ |
| پولد پلاکت با حذف لکوسیت | # | ۸۰۲۶۶۲ | ۲۱۵,۴۶۰ | ۱۵۰,۸۱۰ | ۶۹۰,۴۰۰ | ۵۳۹,۵۹۰ | ۳۴۹,۲۰۰ | ۱۹۸,۳۹۰ | ۴۰۸,۷۰۰ | ۲۵۷,۸۹۰ |
| اشعه دادن فرآورده های خونی | # | ۸۰۲۶۶۴ | ۳۳,۶۴۵ | ۲۳,۵۵۰ | ۱۱۰,۴۵۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۵۴,۳۰۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۳۹,۹۵۰ |
| پلاسما فرزیس درمانی | # | ۸۰۲۶۶۶ | ۱۳۴,۵۸۰ | ۹۴,۲۰۰ | ۴۴۱,۸۰۰ | ۳۴۷,۶۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰ |
| پلاکت فرزیس | # | ۸۰۲۶۶۸ | ۱۳۴,۵۸۰ | ۹۴,۲۰۰ | ۴۴۱,۸۰۰ | ۳۴۷,۶۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰ |
| لوکوفرزیس درمانی | # | ۸۰۲۶۷۰ | ۱۳۴,۵۸۰ | ۹۴,۲۰۰ | ۴۴۱,۸۰۰ | ۳۴۷,۶۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰ |
| فرآورده CMV-Negative | # | ۸۰۲۶۷۴ | ۱۳۴,۵۸۰ | ۹۴,۲۰۰ | ۴۴۱,۸۰۰ | ۳۴۷,۶۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰ |
| گلبول قرمز شسته شده | # | ۸۰۲۶۷۶ | ۸۰,۸۸۰ | ۵۶,۶۱۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۱۹۱,۹۹۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۷۵,۳۹۰ | ۱۵۴,۷۰۰ | ۹۸,۰۹۰ |
| اریتروفرزیس | # | ۸۰۲۶۷۸ | ۱۳۴,۵۸۰ | ۹۴,۲۰۰ | ۴۴۱,۸۰۰ | ۳۴۷,۶۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰ |
| سایر آزمایش های مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند | #* | ۸۰۲۶۷۹ | ۴,۱۲۴ | - | ۱۳,۹۸۸ | ۱۳,۹۸۸ | ۶,۶۱۶ | ۶,۶۱۶ | ۷,۷۲۸ | ۷,۷۲۸ |
| اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی CRP در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۲۸۰۰ | ۳,۰۹۹ | ۲,۱۶۹ | ۹,۶۶۷ | ۷,۴۹۸ | ۵,۰۴۶ | ۲,۸۷۷ | ۵,۹۱۱ | ۳,۷۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی CRP در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۲۸۰۵ | ۱۳,۹۷۲ | ۹,۷۷۹ | ۴۳,۲۷۳ | ۳۳,۴۹۴ | ۲۲,۷۷۴ | ۱۲,۹۹۵ | ۲۶,۶۸۴ | ۱۶,۹۰۵ |
| اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی RFدر سرم/ پلاسما | # | ۸۰۲۸۱۰ | ۳,۰۹۹ | ۲,۱۶۹ | ۹,۶۶۷ | ۷,۴۹۸ | ۵,۰۴۶ | ۲,۸۷۷ | ۵,۹۱۱ | ۳,۷۴۲ |
| اندازه‌گیری کمّی RF در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۲۸۱۵ | ۱۰,۰۵۷ | ۷,۰۳۹ | ۳۱,۹۴۴ | ۲۴,۹۰۵ | ۱۶,۳۲۴ | ۹,۲۸۵ | ۱۹,۱۱۱ | ۱۲,۰۷۲ |
| آزمایش تعیین RF-IgG | #* | ۸۰۲۸۱۶ | ۱۱,۶۶۸ | - | ۳۷,۷۴۰ | ۳۷,۷۴۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۲۲,۰۹۰ |
| آزمایش تعیین RF-IgM | #* | ۸۰۲۸۱۷ | ۱۱,۶۶۸ | - | ۳۷,۷۴۰ | ۳۷,۷۴۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۲۲,۰۹۰ |
| آزمایش تعیین RF-IgA | #* | ۸۰۲۸۱۸ | ۱۱,۶۶۸ | - | ۳۷,۷۴۰ | ۳۷,۷۴۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۲۲,۰۹۰ |
| آزمایش کیفی/نیمه کمّی منو تست در سرم/ پلاسما | # | ۸۰۲۸۲۰ | ۲,۶۴۹ | ۱,۸۵۴ | ۸,۴۶۹ | ۶,۶۱۵ | ۴,۲۹۴ | ۲,۴۴۰ | ۵,۰۲۶ | ۳,۱۷۲ |
| اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی VDRL یا RPR برای غربالگری سیفلیس | # | ۸۰۲۸۲۵ | ۳,۸۶۵ | ۲,۷۰۵ | ۱۱,۷۸۶ | ۹,۰۸۱ | ۶,۳۱۶ | ۳,۶۱۱ | ۷,۴۰۴ | ۴,۶۹۹ |
| آزمایش تیتراسیون رایت | # | ۸۰۲۸۳۰ | ۵,۴۸۳ | ۳,۸۳۷ | ۱۶,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۱ | ۸,۹۵۶ | ۵,۱۱۹ | ۱۰,۴۹۸ | ۶,۶۶۱ |
| آزمایش تیتراسیون کومبس رایت | # | ۸۰۲۸۳۵ | ۸,۲۲۴ | ۵,۷۵۶ | ۲۵,۱۳۷ | ۱۹,۳۸۱ | ۱۳,۴۳۴ | ۷,۶۷۸ | ۱۵,۷۴۷ | ۹,۹۹۱ |
| آنتی بادی بروسلا به روش Immunocapture | # | ۸۰۲۸۳۶ | ۹,۸۷۸ | ۶,۹۱۴ | ۳۱,۳۰۰ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۶,۰۴۰ | ۹,۱۲۶ | ۱۸,۷۸۰ | ۱۱,۸۶۶ |
| آزمایش تیتراسیون ۲ME | # | ۸۰۲۸۴۰ | ۵,۵۶۹ | ۳,۸۹۸ | ۱۷,۴۹۲ | ۱۳,۵۹۴ | ۹,۰۵۶ | ۵,۱۵۸ | ۱۰,۶۰۶ | ۶,۷۰۸ |
| آزمایش تیتراسیون ویدال | # | ۸۰۲۸۴۵ | ۹,۲۰۵ | ۶,۴۴۳ | ۲۹,۰۹۱ | ۲۲,۶۴۸ | ۱۴,۹۵۴ | ۸,۵۱۱ | ۱۷,۵۱۰ | ۱۱,۰۶۷ |
| آزمایش تیتراسیون ASO | # | ۸۰۲۸۵۰ | ۵,۸۴۱ | ۴,۰۸۸ | ۱۸,۰۴۶ | ۱۳,۹۵۸ | ۹,۵۲۴ | ۵,۴۳۶ | ۱۱,۱۶۰ | ۷,۰۷۲ |
| آزمایش آنتی‌بادی هتروفیل(آزمایش پل بونل) | # | ۸۰۲۸۵۵ | ۷,۰۴۴ | ۴,۹۳۰ | ۲۳,۰۱۱ | ۱۸,۰۸۱ | ۱۱,۳۷۸ | ۶,۴۴۸ | ۱۳,۳۰۸ | ۸,۳۷۸ |
| آزمایش پوستی توبرکولوز با استفاده از PPD | # | ۸۰۲۸۶۰ | ۲,۲۹۱ | ۱,۶۰۳ | ۷,۱۸۱ | ۵,۵۷۸ | ۳,۷۲۶ | ۲,۱۲۳ | ۴,۳۶۴ | ۲,۷۶۱ |
| آزمایش پوستی کازونی | # | ۸۰۲۸۶۵ | ۲,۰۱۹ | ۱,۴۱۳ | ۶,۶۲۷ | ۵,۲۱۴ | ۳,۲۵۸ | ۱,۸۴۵ | ۳,۸۱۰ | ۲,۳۹۷ |
| آزمایش تشخیص حاملگی (Pregnancy Test) از طریق ادرار | # | ۸۰۲۸۷۰ | ۴,۰۴۴ | ۲,۸۳۱ | ۱۲,۴۳۰ | ۹,۶۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۳,۷۷۰ | ۷,۷۳۵ | ۴,۹۰۵ |
| اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA (Antibody Anti Nuclear) به روش ایمونوفلورسانس | # | ۸۰۲۸۸۰ | ۲۴,۰۱۶ | ۱۶,۸۱۰ | ۷۶,۸۶۵ | ۶۰,۰۵۶ | ۳۸,۹۳۰ | ۲۲,۱۲۱ | ۴۵,۵۶۵ | ۲۸,۷۵۶ |
| اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA به روش آلایزا | # | ۸۰۲۸۸۱ | ۲۴,۰۱۶ | ۱۶,۸۱۰ | ۷۶,۸۶۵ | ۶۰,۰۵۶ | ۳۸,۹۳۰ | ۲۲,۱۲۱ | ۴۵,۵۶۵ | ۲۸,۷۵۶ |
| اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی لیستریا به روش ایمونوفلورسانس | # | ۸۰۲۸۸۵ | ۲۴,۰۱۶ | ۱۶,۸۱۰ | ۷۶,۸۶۵ | ۶۰,۰۵۶ | ۳۸,۹۳۰ | ۲۲,۱۲۱ | ۴۵,۵۶۵ | ۲۸,۷۵۶ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی مایکوپلاسما به روش ایمونوفلورسانس | # | ۸۰۲۸۹۰ | ۲۴,۰۱۶ | ۱۶,۸۱۰ | ۷۶,۸۶۵ | ۶۰,۰۵۶ | ۳۸,۹۳۰ | ۲۲,۱۲۱ | ۴۵,۵۶۵ | ۲۸,۷۵۶ |
| اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی Anti Neutrophilic(ANCA) Cytoplasmic Antibody | # | ۸۰۲۸۹۵ | ۱۶,۷۵۰ | ۱۱,۷۲۴ | ۵۲,۸۴۳ | ۴۱,۱۱۹ | ۲۷,۲۱۸ | ۱۵,۴۹۴ | ۳۱,۸۷۲ | ۲۰,۱۴۸ |
| آزمایش اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی Nitro Blue(NBT) Tetrazolium | # | ۸۰۲۹۰۰ | ۱۷,۵۵۸ | ۱۲,۲۹۰ | ۵۵,۳۲۹ | ۴۳,۰۳۹ | ۲۸,۵۳۸ | ۱۶,۲۴۸ | ۳۳,۴۱۹ | ۲۱,۱۲۹ |
| آزمایش Killing | # | ۸۰۲۹۰۵ | ۵۱,۷۷۴ | ۳۶,۲۴۰ | ۱۷۵,۰۳۷ | ۱۳۸,۷۹۷ | ۸۳,۱۱۸ | ۴۶,۸۷۸ | ۹۷,۱۰۰ | ۶۰,۸۶۰ |
| آزمایش Chemotaxia | # | ۸۰۲۹۱۰ | ۵۱,۷۷۴ | ۳۶,۲۴۰ | ۱۷۵,۰۳۷ | ۱۳۸,۷۹۷ | ۸۳,۱۱۸ | ۴۶,۸۷۸ | ۹۷,۱۰۰ | ۶۰,۸۶۰ |
| آزمایش Opsonin | # | ۸۰۲۹۱۵ | ۲۰,۴۵۹ | ۱۴,۳۲۰ | ۶۶,۸۲۴ | ۵۲,۵۰۴ | ۳۳,۰۴۸ | ۱۸,۷۲۸ | ۳۸,۶۵۴ | ۲۴,۳۳۴ |
| آزمایش فاگوسیتوز | # | ۸۰۲۹۲۰ | ۱۷,۲۷۳ | ۱۲,۰۹۱ | ۵۶,۴۲۳ | ۴۴,۳۳۳ | ۲۷,۹۰۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۲,۶۳۵ | ۲۰,۵۴۵ |
| اندازه‌گیری کمّی بتا-۲- میکروگلوبولین (Beta-۲-Microglobulin) سرم یا ادرار | # | ۸۰۲۹۲۵ | ۳۱,۵۴۰ | ۲۲,۰۷۷ | ۱۰۳,۰۸۹ | ۸۱,۰۱۲ | ۵۰,۹۴۲ | ۲۸,۸۶۵ | ۵۹,۵۸۲ | ۳۷,۵۰۵ |
| آزمایش همولیز سوکروز (Sucrose Hemolysis Test) | # | ۸۰۲۹۳۰ | ۵,۶۹۸ | ۳,۹۸۸ | ۱۸,۵۹۳ | ۱۴,۶۰۵ | ۹,۲۰۶ | ۵,۲۱۸ | ۱۰,۷۶۸ | ۶,۷۸۰ |
| آزمایش Ham(Ham's Test) | # | ۸۰۲۹۳۵ | ۵,۲۹۰ | ۳,۷۰۳ | ۱۷,۷۶۲ | ۱۴,۰۵۹ | ۸,۵۰۴ | ۴,۸۰۱ | ۹,۹۳۷ | ۶,۲۳۴ |
| آزمایش تیتراسیون آگلوتینین‌های سرد در سرم | # | ۸۰۲۹۴۰ | ۷,۲۲۳ | ۵,۰۵۶ | ۲۳,۶۵۵ | ۱۸,۵۹۹ | ۱۱,۶۶۲ | ۶,۶۰۶ | ۱۳,۶۳۹ | ۸,۵۸۳ |
| آزمایش همولایزین سرد (Cold Hemolysin) سرم | # | ۸۰۲۹۴۵ | ۷,۲۲۳ | ۵,۰۵۶ | ۲۳,۶۵۵ | ۱۸,۵۹۹ | ۱۱,۶۶۲ | ۶,۶۰۶ | ۱۳,۶۳۹ | ۸,۵۸۳ |
| آزمایش تجسس Alpha Heavy Chain | # | ۸۰۲۹۵۰ | ۱۷,۴۵۲ | ۱۲,۲۱۶ | ۵۷,۰۶۷ | ۴۴,۸۵۱ | ۲۸,۱۸۶ | ۱۵,۹۷۰ | ۳۲,۹۶۶ | ۲۰,۷۵۰ |
| اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی DNA Anti– | # | ۸۰۲۹۵۵ | ۱۵,۹۲۸ | ۱۱,۱۴۹ | ۵۲,۰۰۵ | ۴۰,۸۵۷ | ۲۵,۷۳۰ | ۱۴,۵۸۲ | ۳۰,۰۹۵ | ۱۸,۹۴۷ |
| آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتومتری | # | ۸۰۲۹۷۵ | ۷۰,۱۲۴ | ۴۹,۰۸۴ | ۲۲۹,۱۸۹ | ۱۸۰,۱۰۵ | ۱۱۳,۲۶۲ | ۶۴,۱۷۸ | ۱۳۲,۴۷۲ | ۸۳,۳۸۸ |
| آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell با سایر روش‌ها | # | ۸۰۲۹۸۰ | ۴۵,۸۰۷ | ۳۲,۰۶۳ | ۱۴۹,۷۵۵ | ۱۱۷,۶۹۲ | ۷۳,۹۸۲ | ۴۱,۹۱۹ | ۸۶,۵۲۹ | ۵۴,۴۶۶ |
| آزمایش ترانسفورماسیون لنفوسیتی(LTT) | # | ۸۰۲۹۸۵ | ۶۱,۷۲۵ | ۴۳,۲۰۵ | ۲۰۸,۷۱۹ | ۱۶۵,۵۱۴ | ۹۹,۰۹۰ | ۵۵,۸۸۵ | ۱۱۵,۷۵۸ | ۷۲,۵۵۳ |
| آزمایش فنوتیپ T۴ و T۸ | # | ۸۰۲۹۹۰ | ۷۸,۵۱۴ | ۵۴,۹۵۶ | ۲۵۶,۶۱۸ | ۲۰۱,۶۶۲ | ۱۲۶,۸۱۲ | ۷۱,۸۵۶ | ۱۴۸,۳۲۰ | ۹۳,۳۶۴ |
| آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell کامل T۴ | # | ۸۰۲۹۹۵ | ۱۲۵,۲۸۶ | ۸۷,۶۹۵ | ۴۱۸,۱۱۰ | ۳۳۰,۴۱۵ | ۲۰۱,۶۰۸ | ۱۱۳,۹۱۳ | ۲۳۵,۶۳۱ | ۱۴۷,۹۳۶ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgG) | # | ۸۰۳۰۰۰ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgM) | # | ۸۰۳۰۰۵ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی CMV(IgG) | # | ۸۰۳۰۱۰ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی CMV(IgG) | # | ۸۰۳۰۱۵ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی HSV(IgG) | # | ۸۰۳۰۲۰ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی HSV(IgM) | # | ۸۰۳۰۲۵ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody (FTA-ABS (IgG Absorption) | # | ۸۰۳۰۳۰ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody (FTA-ABS (IgM Absorption) | # | ۸۰۳۰۳۵ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgG) | # | ۸۰۳۰۴۰ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgM) | # | ۸۰۳۰۴۵ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgG) | # | ۸۰۳۰۵۰ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgA) | # | ۸۰۳۰۵۵ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgM) | # | ۸۰۳۰۶۰ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgG ) | # | ۸۰۳۰۶۵ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgM) | # | ۸۰۳۰۷۰ | ۲۰,۸۱۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۶۸,۱۱۲ | ۵۳,۵۴۱ | ۳۳,۶۱۶ | ۱۹,۰۴۵ | ۳۹,۳۱۶ | ۲۴,۷۴۵ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgG ) | # | ۸۰۳۰۷۵ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgA) | # | ۸۰۳۰۸۰ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgM) | # | ۸۰۳۰۸۵ | ۲۱,۹۰۴ | ۱۵,۳۳۲ | ۷۰,۳۲۸ | ۵۴,۹۹۶ | ۳۵,۴۸۸ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۱,۵۳۲ | ۲۶,۲۰۰ |
| آزمایش تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمنوبلاتینگ | # | ۸۰۳۰۹۰ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgG) | # | ۸۰۳۰۹۵ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgM) | # | ۸۰۳۰۹۶ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgG ) | # | ۸۰۳۱۰۰ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgM) | # | ۸۰۳۱۰۱ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgG) | # | ۸۰۳۱۰۵ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgM) | # | ۸۰۳۱۰۶ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgG ) | # | ۸۰۳۱۱۰ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgM) | # | ۸۰۳۱۱۱ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgG ) | # | ۸۰۳۱۱۵ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgM) | # | ۸۰۳۱۱۶ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی EBV(IgG) | # | ۸۰۳۱۲۰ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی EBV(IgM) | # | ۸۰۳۱۲۱ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgG) | # | ۸۰۳۱۳۰ | ۱۹,۲۹۲ | ۱۳,۵۰۴ | ۶۳,۰۵۰ | ۴۹,۵۴۷ | ۳۱,۱۶۰ | ۱۷,۶۵۷ | ۳۶,۴۴۵ | ۲۲,۹۴۲ |
| آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgM) | # | ۸۰۳۱۳۱ | ۱۹,۲۹۲ | ۱۳,۵۰۴ | ۶۳,۰۵۰ | ۴۹,۵۴۷ | ۳۱,۱۶۰ | ۱۷,۶۵۷ | ۳۶,۴۴۵ | ۲۲,۹۴۲ |
| آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgG) | # | ۸۰۳۱۳۵ | ۱۵,۴۳۴ | ۱۰,۸۰۳ | ۵۰,۴۴۰ | ۳۹,۶۳۷ | ۲۴,۹۲۸ | ۱۴,۱۲۵ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۸,۳۵۳ |
| آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgM) | # | ۸۰۳۱۳۶ | ۱۵,۴۳۴ | ۱۰,۸۰۳ | ۵۰,۴۴۰ | ۳۹,۶۳۷ | ۲۴,۹۲۸ | ۱۴,۱۲۵ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۸,۳۵۳ |
| آزمایش تعیین آنتی میتوکندریال آنتی‌بادی (AMA) | # | ۸۰۳۱۴۰ | ۱۲,۷۴۲ | ۸,۹۱۹ | ۴۱,۶۰۴ | ۳۲,۶۸۵ | ۲۰,۵۸۴ | ۱۱,۶۶۵ | ۲۴,۰۷۶ | ۱۵,۱۵۷ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد ماهیچه‌های صاف (ASM) | # | ۸۰۳۱۴۵ | ۲۰,۶۱۸ | ۱۴,۴۳۲ | ۶۹,۹۴۰ | ۵۵,۵۰۸ | ۳۳,۰۸۰ | ۱۸,۶۴۸ | ۳۸,۶۴۰ | ۲۴,۲۰۸ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد اسپرم | # | ۸۰۳۱۵۰ | ۲۲,۳۸۵ | ۱۵,۶۶۸ | ۷۳,۵۴۱ | ۵۷,۸۷۳ | ۳۶,۱۲۲ | ۲۰,۴۵۴ | ۴۲,۲۴۱ | ۲۶,۵۷۳ |
| آزمایش تعیین آنتی‌بادی تیروگلوبولین | # | ۸۰۳۱۵۵ | ۲۲,۵۸۴ | ۱۵,۸۰۷ | ۷۱,۷۱۳ | ۵۵,۹۰۶ | ۳۶,۶۵۸ | ۲۰,۸۵۱ | ۴۲,۹۱۷ | ۲۷,۱۱۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgG) | # | ۸۰۳۱۶۰ | ۱۸,۳۴۱ | ۱۲,۸۳۸ | ۶۱,۱۱۱ | ۴۸,۲۷۳ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۶,۶۸۴ | ۳۴,۵۰۶ | ۲۱,۶۶۸ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgM) | # | ۸۰۳۱۶۱ | ۱۸,۳۴۱ | ۱۲,۸۳۸ | ۶۱,۱۱۱ | ۴۸,۲۷۳ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۶,۶۸۴ | ۳۴,۵۰۶ | ۲۱,۶۶۸ |
| آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم برای تشخیص لیشمانیوز احشایی(کالاآزار) | # | ۸۰۳۱۶۲ | ۱۳,۷۰۷ | ۹,۵۹۴ | ۴۱,۸۹۵ | ۳۲,۳۰۲ | ۲۲,۳۹۰ | ۱۲,۷۹۷ | ۲۶,۲۴۵ | ۱۶,۶۵۲ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgG) | # | ۸۰۳۱۶۵ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgM) | # | ۸۰۳۱۶۶ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgG) | # | ۸۰۳۱۷۰ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgM) | # | ۸۰۳۱۷۲ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۶۴,۵۱۱ | ۵۱,۱۷۷ | ۳۰,۵۷۴ | ۱۷,۲۴۰ | ۳۵,۷۱۵ | ۲۲,۳۸۱ |
| آزمایش تعیین زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا | # | ۸۰۳۱۷۵ | ۳۴,۹۳۸ | ۲۴,۴۵۶ | ۱۲۱,۴۶۰ | ۹۷,۰۰۴ | ۵۵,۸۰۰ | ۳۱,۳۴۴ | ۶۵,۱۲۰ | ۴۰,۶۶۴ |
| آزمایش لوپوس آنتی کوآگولانت | # | ۸۰۳۱۸۰ | ۱۷,۶۶۱ | ۱۲,۳۶۲ | ۵۹,۷۲۶ | ۴۷,۳۶۴ | ۲۸,۳۵۲ | ۱۵,۹۹۰ | ۳۳,۱۲۱ | ۲۰,۷۵۹ |
| آزمایش آنتی ژن P۲۴ و آنتی بادی HIV | # | ۸۰۳۱۸۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش آنتی بادی HIV | # | ۸۰۳۱۸۶ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش آنتی ژن HIV- P۲۴ | # | ۸۰۳۱۹۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش آنتی بادی Anti-HBc (IgM) | # | ۸۰۳۱۹۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش آنتی بادی Anti-HAV Total | # | ۸۰۳۲۰۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش HBsAg | # | ۸۰۳۲۰۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش HBeAg | # | ۸۰۳۲۱۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش آنتی بادی Anti-Hbe | # | ۸۰۳۲۱۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش سنجش آنتی بادی Anti-HBs | # | ۸۰۳۲۲۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش آنتی بادی Total Anti-HBc | # | ۸۰۳۲۲۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| تست تاییدی HIV یا HCV به روش تأییدی استاندارد | # | ۸۰۳۲۳۵ | ۴۲,۱۸۱ | ۲۹,۵۲۵ | ۱۴۲,۶۴۳ | ۱۱۳,۱۱۸ | ۶۷,۷۱۴ | ۳۸,۱۸۹ | ۷۹,۱۰۴ | ۴۹,۵۷۹ |
| آزمایش HTLV-I | # | ۸۰۳۲۴۰ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۹,۳۲۸ | ۹۳,۴۰۸ | ۷۴,۰۸۰ | ۴۴,۳۲۴ | ۲۴,۹۹۶ | ۵۱,۷۷۹ | ۳۲,۴۵۱ |
| آزمایش HTLV-II | # | ۸۰۳۲۴۵ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۹,۳۲۸ | ۹۳,۴۰۸ | ۷۴,۰۸۰ | ۴۴,۳۲۴ | ۲۴,۹۹۶ | ۵۱,۷۷۹ | ۳۲,۴۵۱ |
| آنتی بادیAnti-HEV | # | ۸۰۳۲۵۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آنتی بادیAnti- HDV | # | ۸۰۳۲۵۱ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آنتی بادی Anti-HCV | # | ۸۰۳۲۵۵ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش سنجش IgE | # | ۸۰۳۲۶۰ | ۲۹,۳۳۹ | ۲۰,۵۳۵ | ۹۰,۵۰۷ | ۶۹,۹۷۲ | ۴۷,۸۵۴ | ۲۷,۳۱۹ | ۵۶,۰۷۷ | ۳۵,۵۴۲ |
| آزمایش CH ۵۰ | # | ۸۰۳۲۶۵ | ۱۵,۴۳۴ | ۱۰,۸۰۳ | ۵۰,۴۴۰ | ۳۹,۶۳۷ | ۲۴,۹۲۸ | ۱۴,۱۲۵ | ۲۹,۱۵۶ | ۱۸,۳۵۳ |
| آزمایش CH ۵۰ به روش همولیزین (RBC حساس‌شده گوسفند) | # | ۸۰۳۲۷۰ | ۱۴,۷۶۱ | ۱۰,۳۳۲ | ۴۸,۲۳۱ | ۳۷,۸۹۹ | ۲۳,۸۴۲ | ۱۳,۵۱۰ | ۲۷,۸۸۶ | ۱۷,۵۵۴ |
| آزمایش سنجش IgD به روش RID | # | ۸۰۳۲۷۵ | ۱۷,۲۷۳ | ۱۲,۰۹۱ | ۵۶,۴۲۳ | ۴۴,۳۳۳ | ۲۷,۹۰۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۲,۶۳۵ | ۲۰,۵۴۵ |
| آزمایش سنجشIgG به روش RID | # | ۸۰۳۲۷۶ | ۱۷,۲۷۳ | ۱۲,۰۹۱ | ۵۶,۴۲۳ | ۴۴,۳۳۳ | ۲۷,۹۰۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۲,۶۳۵ | ۲۰,۵۴۵ |
| آزمایش سنجش IgA به روش RID | # | ۸۰۳۲۷۷ | ۱۷,۲۷۳ | ۱۲,۰۹۱ | ۵۶,۴۲۳ | ۴۴,۳۳۳ | ۲۷,۹۰۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۲,۶۳۵ | ۲۰,۵۴۵ |
| آزمایش سنجش IgM به روش RID | # | ۸۰۳۲۷۸ | ۱۷,۲۷۳ | ۱۲,۰۹۱ | ۵۶,۴۲۳ | ۴۴,۳۳۳ | ۲۷,۹۰۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۲,۶۳۵ | ۲۰,۵۴۵ |
| آزمایش سنجش IgD به روش الایزا | # | ۸۰۳۲۸۰ | ۲۹,۵۲۱ | ۲۰,۶۶۴ | ۹۶,۴۶۲ | ۷۵,۷۹۸ | ۴۷,۶۸۴ | ۲۷,۰۲۰ | ۵۵,۷۷۲ | ۳۵,۱۰۸ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش سنجشIgG به روش الایزا؛ هر کدام | # | ۸۰۳۲۸۱ | ۲۹,۵۲۱ | ۲۰,۶۶۴ | ۹۶,۴۶۲ | ۷۵,۷۹۸ | ۴۷,۶۸۴ | ۲۷,۰۲۰ | ۵۵,۷۷۲ | ۳۵,۱۰۸ |
| آزمایش سنجشIgA به روش الایزا | # | ۸۰۳۲۸۲ | ۲۹,۵۲۱ | ۲۰,۶۶۴ | ۹۶,۴۶۲ | ۷۵,۷۹۸ | ۴۷,۶۸۴ | ۲۷,۰۲۰ | ۵۵,۷۷۲ | ۳۵,۱۰۸ |
| آزمایش سنجش IgM به روش الایزا | # | ۸۰۳۲۸۳ | ۲۹,۵۲۱ | ۲۰,۶۶۴ | ۹۶,۴۶۲ | ۷۵,۷۹۸ | ۴۷,۶۸۴ | ۲۷,۰۲۰ | ۵۵,۷۷۲ | ۳۵,۱۰۸ |
| اندازه‌گیری کمّی C۳– ترانسفرین به روش RID و EIA | # | ۸۰۳۲۸۴ | ۲۱,۳۳۱ | ۱۴,۹۳۰ | ۶۷,۲۰۵ | ۵۲,۲۷۵ | ۳۴,۶۷۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۲۵,۶۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی C۴– ترانسفرین به روش RID و EIA | # | ۸۰۳۲۸۵ | ۲۱,۳۳۱ | ۱۴,۹۳۰ | ۶۷,۲۰۵ | ۵۲,۲۷۵ | ۳۴,۶۷۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۲۵,۶۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی C۶– ترانسفرین به روش RID و EIA | # | ۸۰۳۲۸۶ | ۲۱,۳۳۱ | ۱۴,۹۳۰ | ۶۷,۲۰۵ | ۵۲,۲۷۵ | ۳۴,۶۷۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۲۵,۶۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی C۷– ترانسفرین به روش RID و EIA | # | ۸۰۳۲۸۷ | ۲۱,۳۳۱ | ۱۴,۹۳۰ | ۶۷,۲۰۵ | ۵۲,۲۷۵ | ۳۴,۶۷۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۲۵,۶۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی C۸– ترانسفرین به روش RID و EIA | # | ۸۰۳۲۸۸ | ۲۱,۳۳۱ | ۱۴,۹۳۰ | ۶۷,۲۰۵ | ۵۲,۲۷۵ | ۳۴,۶۷۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۲۵,۶۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی C۹– ترانسفرین به روش RID و EIA | # | ۸۰۳۲۸۹ | ۲۱,۳۳۱ | ۱۴,۹۳۰ | ۶۷,۲۰۵ | ۵۲,۲۷۵ | ۳۴,۶۷۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۲۵,۶۷۰ |
| اندازه‌گیری کمّی Clq | # | ۸۰۳۲۹۰ | ۱۸,۳۴۱ | ۱۲,۸۳۸ | ۶۱,۱۱۱ | ۴۸,۲۷۳ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۶,۶۸۴ | ۳۴,۵۰۶ | ۲۱,۶۶۸ |
| اندازه گیری کمّی آلفا-۱-آنتی تریپسین | # | ۸۰۳۲۹۵ | ۱۶,۶۰۰ | ۱۱,۶۲۰ | ۵۴,۲۱۴ | ۴۲,۵۹۵ | ۲۶,۸۱۶ | ۱۵,۱۹۷ | ۳۱,۳۶۵ | ۱۹,۷۴۶ |
| اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین مانند IgG۱ | # | ۸۰۳۳۰۰ | ۳۰,۱۹۴ | ۲۱,۱۳۵ | ۹۸,۶۷۱ | ۷۷,۵۳۶ | ۴۸,۷۷۰ | ۲۷,۶۳۵ | ۵۷,۰۴۲ | ۳۵,۹۰۷ |
| اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG۲ | # | ۸۰۳۳۰۱ | ۳۰,۱۹۴ | ۲۱,۱۳۵ | ۹۸,۶۷۱ | ۷۷,۵۳۶ | ۴۸,۷۷۰ | ۲۷,۶۳۵ | ۵۷,۰۴۲ | ۳۵,۹۰۷ |
| اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG۳ | # | ۸۰۳۳۰۲ | ۳۰,۱۹۴ | ۲۱,۱۳۵ | ۹۸,۶۷۱ | ۷۷,۵۳۶ | ۴۸,۷۷۰ | ۲۷,۶۳۵ | ۵۷,۰۴۲ | ۳۵,۹۰۷ |
| اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG۴ | # | ۸۰۳۳۰۳ | ۳۰,۱۹۴ | ۲۱,۱۳۵ | ۹۸,۶۷۱ | ۷۷,۵۳۶ | ۴۸,۷۷۰ | ۲۷,۶۳۵ | ۵۷,۰۴۲ | ۳۵,۹۰۷ |
| ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای هر آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن | # | ۸۰۳۳۰۵ | ۱۵,۶۴۹ | ۱۰,۹۵۴ | ۵۲,۲۷۵ | ۴۱,۳۲۱ | ۲۵,۱۷۸ | ۱۴,۲۲۴ | ۲۹,۴۲۶ | ۱۸,۴۷۲ |
| آزمایشMIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت) | # | ۸۰۳۳۱۰ | ۲۸,۱۷۶ | ۱۹,۷۲۲ | ۹۲,۰۴۴ | ۷۲,۳۲۲ | ۴۵,۵۱۲ | ۲۵,۷۹۰ | ۵۳,۲۳۲ | ۳۳,۵۱۰ |
| آزمایش کیفی کرایوگلوبولین | # | ۸۰۳۳۱۵ | ۱,۵۲۵ | ۱,۰۶۷ | ۵,۰۶۲ | ۳,۹۹۵ | ۲,۴۵۶ | ۱,۳۸۹ | ۲,۸۷۱ | ۱,۸۰۴ |
| اندازه‌گیری کمّی کرایوفیبرینوژن | # | ۸۰۳۳۲۰ | ۵,۶۹۸ | ۳,۹۸۸ | ۱۸,۵۹۳ | ۱۴,۶۰۵ | ۹,۲۰۶ | ۵,۲۱۸ | ۱۰,۷۶۸ | ۶,۷۸۰ |
| اندازه‌گیری کمّی High Sensitive CRP | #* | ۸۰۳۳۲۵ | ۲۱,۸۹۷ | - | ۷۱,۱۵۲ | ۷۱,۱۵۲ | ۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۴۰۴ | ۴۱,۴۱۷ | ۴۱,۴۱۷ |
| اندازه‌گیری کمّی C۱ Inhibitor | #* | ۸۰۳۳۳۰ | ۲۳,۹۱۶ | - | ۷۷,۷۷۹ | ۷۷,۷۷۹ | ۳۸,۶۶۲ | ۳۸,۶۶۲ | ۴۵,۲۲۷ | ۴۵,۲۲۷ |
| آزمایش C۱ inhibitor functional | #* | ۸۰۳۳۳۱ | ۳۸,۴۵۵ | - | ۱۲۴,۹۹۹ | ۱۲۴,۹۹۹ | ۶۲,۱۷۰ | ۶۲,۱۷۰ | ۷۲,۷۲۸ | ۷۲,۷۲۸ |
| اندازه‌گیری کمّی Anti-MPO | # | ۸۰۳۳۳۵ | ۲۰,۷۳۱ | ۱۴,۵۱۰ | ۶۷,۳۷۸ | ۵۲,۸۶۸ | ۳۳,۵۱۶ | ۱۹,۰۰۶ | ۳۹,۲۰۸ | ۲۴,۶۹۸ |
| اندازه‌گیری کمّی (PAPP-A) Pregnancy Associated Plasma protein –A | #* | ۸۰۳۳۴۰ | ۲۶,۲۵۰ | - | ۸۵,۳۲۷ | ۸۵,۳۲۷ | ۴۲,۴۳۸ | ۴۲,۴۳۸ | ۴۹,۶۴۵ | ۴۹,۶۴۵ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Smith | #* | ۸۰۳۳۴۵ | ۲۰,۵۵۲ | - | ۶۶,۷۳۴ | ۶۶,۷۳۴ | ۳۳,۲۳۲ | ۳۳,۲۳۲ | ۳۸,۸۷۷ | ۳۸,۸۷۷ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Liver-Kidney-Microsomal (LKM Ab) | #* | ۸۰۳۳۵۰ | ۲۸,۵۸۳ | - | ۹۲,۸۷۵ | ۹۲,۸۷۵ | ۴۶,۲۱۴ | ۴۶,۲۱۴ | ۵۴,۰۶۳ | ۵۴,۰۶۳ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Parietal | #* | ۸۰۳۳۵۵ | ۱۳,۱۹۳ | - | ۴۲,۸۰۲ | ۴۲,۸۰۲ | ۲۱,۳۳۶ | ۲۱,۳۳۶ | ۲۴,۹۶۱ | ۲۴,۹۶۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی (GBM Ab) Anti-G lomerular Basement Membrane | #* | ۸۰۳۳۶۰ | ۱۳,۱۹۳ | - | ۴۲,۸۰۲ | ۴۲,۸۰۲ | ۲۱,۳۳۶ | ۲۱,۳۳۶ | ۲۴,۹۶۱ | ۲۴,۹۶۱ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش تعیین آنتی پمفیگوس (Pemphigus Ab) | #* | ۸۰۳۳۶۵ | ۲۱,۸۹۷ | - | ۷۱,۱۵۲ | ۷۱,۱۵۲ | ۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۴۰۴ | ۴۱,۴۱۷ | ۴۱,۴۱۷ |
| آنتی بادی Desmoglein Ab I&III به روش الایزا | #* | ۸۰۳۳۶۶ | ۲۵,۱۲۶ | - | ۸۱,۹۲۰ | ۸۱,۹۲۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۴۷,۴۹۰ | ۴۷,۴۹۰ |
| آنتی بادی Desmoglein Ab I به روش الایزا | #* | ۸۰۳۳۶۷ | ۲۹,۶۰۱ | - | ۹۸,۰۲۰ | ۹۸,۰۲۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۵۵,۷۶۵ | ۵۵,۷۶۵ |
| آنتی بادی Desmoglein Ab III به روش الایزا | #* | ۸۰۳۳۶۸ | ۲۹,۶۰۱ | - | ۹۸,۰۲۰ | ۹۸,۰۲۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۵۵,۷۶۵ | ۵۵,۷۶۵ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial(IgA) | #* | ۸۰۳۳۷۰ | ۲۲,۷۴۹ | - | ۷۴,۰۰۵ | ۷۴,۰۰۵ | ۳۶,۷۷۴ | ۳۶,۷۷۴ | ۴۳,۰۱۸ | ۴۳,۰۱۸ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial(IgG) | #* | ۸۰۳۳۷۱ | ۲۲,۷۴۹ | - | ۷۴,۰۰۵ | ۷۴,۰۰۵ | ۳۶,۷۷۴ | ۳۶,۷۷۴ | ۴۳,۰۱۸ | ۴۳,۰۱۸ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial(IgM) | #* | ۸۰۳۳۷۲ | ۲۲,۷۴۹ | - | ۷۴,۰۰۵ | ۷۴,۰۰۵ | ۳۶,۷۷۴ | ۳۶,۷۷۴ | ۴۳,۰۱۸ | ۴۳,۰۱۸ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin(IgA) | #* | ۸۰۳۳۷۵ | ۲۲,۷۴۹ | - | ۷۴,۰۰۵ | ۷۴,۰۰۵ | ۳۶,۷۷۴ | ۳۶,۷۷۴ | ۴۳,۰۱۸ | ۴۳,۰۱۸ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin(IgG) | #* | ۸۰۳۳۷۶ | ۲۲,۷۴۹ | - | ۷۴,۰۰۵ | ۷۴,۰۰۵ | ۳۶,۷۷۴ | ۳۶,۷۷۴ | ۴۳,۰۱۸ | ۴۳,۰۱۸ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin(IgM) | #* | ۸۰۳۳۷۷ | ۲۲,۷۴۹ | - | ۷۴,۰۰۵ | ۷۴,۰۰۵ | ۳۶,۷۷۴ | ۳۶,۷۷۴ | ۴۳,۰۱۸ | ۴۳,۰۱۸ |
| آزمایش (DNPH) Dinitrophenylhydrazine | #* | ۸۰۳۳۸۰ | ۴,۸۴۶ | - | ۱۵,۷۴۰ | ۱۵,۷۴۰ | ۷,۸۳۶ | ۷,۸۳۶ | ۹,۱۶۷ | ۹,۱۶۷ |
| آزمایش آلرژن تنفسی با ۲۰ نوع آلرژن | #* | ۸۰۳۳۸۵ | ۱۵۳,۵۹۷ | - | ۴۹۸,۹۸۵ | ۴۹۸,۹۸۵ | ۲۴۸,۳۴۶ | ۲۴۸,۳۴۶ | ۲۹۰,۵۲۷ | ۲۹۰,۵۲۷ |
| آزمایش ۱ و ۳ بتاگلوکان (Beta-۱,۳-D-Glucan) | #* | ۸۰۳۳۹۲ | ۲۸۷,۰۶۰ | - | ۹۴۸,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۰۰ | ۴۶۲,۸۰۰ | ۴۶۲,۸۰۰ | ۵۴۱,۱۰۰ | ۵۴۱,۱۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SCL-۷۰ | #* | ۸۰۳۳۹۵ | ۲۸,۴۰۴ | - | ۹۲,۲۳۱ | ۹۲,۲۳۱ | ۴۵,۹۳۰ | ۴۵,۹۳۰ | ۵۳,۷۳۲ | ۵۳,۷۳۲ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA RO | #* | ۸۰۳۴۰۰ | ۲۸,۴۰۴ | - | ۹۲,۲۳۱ | ۹۲,۲۳۱ | ۴۵,۹۳۰ | ۴۵,۹۳۰ | ۵۳,۷۳۲ | ۵۳,۷۳۲ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA LA | #* | ۸۰۳۴۰۵ | ۲۸,۴۰۴ | - | ۹۲,۲۳۱ | ۹۲,۲۳۱ | ۴۵,۹۳۰ | ۴۵,۹۳۰ | ۵۳,۷۳۲ | ۵۳,۷۳۲ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-anti-Smith و Sm/RNP | #* | ۸۰۳۴۱۰ | ۲۸,۴۰۴ | - | ۹۲,۲۳۱ | ۹۲,۲۳۱ | ۴۵,۹۳۰ | ۴۵,۹۳۰ | ۵۳,۷۳۲ | ۵۳,۷۳۲ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Jo۱ | #* | ۸۰۳۴۱۵ | ۲۸,۴۰۴ | - | ۹۲,۲۳۱ | ۹۲,۲۳۱ | ۴۵,۹۳۰ | ۴۵,۹۳۰ | ۵۳,۷۳۲ | ۵۳,۷۳۲ |
| آزمایش Antibodies to Extractable Nuclear Antigens (ENA profile) | #* | ۸۰۳۴۲۰ | ۲۸,۴۰۴ | - | ۹۲,۲۳۱ | ۹۲,۲۳۱ | ۴۵,۹۳۰ | ۴۵,۹۳۰ | ۵۳,۷۳۲ | ۵۳,۷۳۲ |
| اندازه‌گیری کمّی آنتی بادی (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (CCP | #* | ۸۰۳۴۲۵ | ۴۳,۷۹۵ | - | ۱۴۲,۳۰۴ | ۱۴۲,۳۰۴ | ۷۰,۸۰۸ | ۷۰,۸۰۸ | ۸۲,۸۳۴ | ۸۲,۸۳۴ |
| آنتی بادی (anti Anti-MCV mutated citrullinated vimentin) | #* | ۸۰۳۴۲۶ | ۲۹,۳۳۹ | - | ۹۰,۵۰۷ | ۹۰,۵۰۷ | ۴۷,۸۵۴ | ۴۷,۸۵۴ | ۵۶,۰۷۷ | ۵۶,۰۷۷ |
| آنتی بادی(IgA)۲-Anti Beta-۱ Glycoprotein | #* | ۸۰۳۴۳۰ | ۲۱,۸۹۷ | - | ۷۱,۱۵۲ | ۷۱,۱۵۲ | ۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۴۰۴ | ۴۱,۴۱۷ | ۴۱,۴۱۷ |
| آنتی بادی(IgG)۲-Anti Beta-۱ Glycoprotein | #* | ۸۰۳۴۳۱ | ۲۱,۸۹۷ | - | ۷۱,۱۵۲ | ۷۱,۱۵۲ | ۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۴۰۴ | ۴۱,۴۱۷ | ۴۱,۴۱۷ |
| آنتی بادی(IgM)۲-Anti Beta-۱ Glycoprotein | #* | ۸۰۳۴۳۲ | ۲۱,۸۹۷ | - | ۷۱,۱۵۲ | ۷۱,۱۵۲ | ۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۴۰۴ | ۴۱,۴۱۷ | ۴۱,۴۱۷ |
| آنتی بادی Anti-Centromere | #* | ۸۰۳۴۳۵ | ۲۱,۸۹۷ | - | ۷۱,۱۵۲ | ۷۱,۱۵۲ | ۳۵,۴۰۴ | ۳۵,۴۰۴ | ۴۱,۴۱۷ | ۴۱,۴۱۷ |
| اندازه گیری کمّی Osteocalcin | #* | ۸۰۳۴۴۰ | ۴۳,۷۹۵ | - | ۱۴۲,۳۰۴ | ۱۴۲,۳۰۴ | ۷۰,۸۰۸ | ۷۰,۸۰۸ | ۸۲,۸۳۴ | ۸۲,۸۳۴ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies) | #* | ۸۰۳۴۴۵ | ۱۳,۱۹۳ | - | ۴۲,۸۰۲ | ۴۲,۸۰۲ | ۲۱,۳۳۶ | ۲۱,۳۳۶ | ۲۴,۹۶۱ | ۲۴,۹۶۱ |
| اندازه‌گیری کمّی CTX (Carboxy Terminal Telopeptide) | #* | ۸۰۳۴۵۰ | ۴۳,۷۹۵ | - | ۱۴۲,۳۰۴ | ۱۴۲,۳۰۴ | ۷۰,۸۰۸ | ۷۰,۸۰۸ | ۸۲,۸۳۴ | ۸۲,۸۳۴ |
| آنتی بادی Anti-Proteinase ۳ یا c-ANCA (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies | # | ۸۰۳۴۵۵ | ۲۰,۷۳۱ | ۱۴,۵۱۰ | ۶۷,۳۷۸ | ۵۲,۸۶۸ | ۳۳,۵۱۶ | ۱۹,۰۰۶ | ۳۹,۲۰۸ | ۲۴,۶۹۸ |
| اندازه‌گیری کمّی Anti Interferon B | #* | ۸۰۳۴۶۰ | ۱۰۹,۸۰۲ | - | ۳۵۶,۶۸۱ | ۳۵۶,۶۸۱ | ۱۷۷,۵۳۸ | ۱۷۷,۵۳۸ | ۲۰۷,۶۹۳ | ۲۰۷,۶۹۳ |
| HCV Genotyping | # | ۸۰۳۴۷۰ | ۳۸۳,۳۵۵ | ۲۶۸,۳۳۵ | ۱,۲۸۳,۸۵۰ | ۱,۰۱۵,۵۱۵ | ۶۱۶,۵۰۰ | ۳۴۸,۱۶۵ | ۷۲۰,۴۵۰ | ۴۵۲,۱۱۵ |
| HPV Genotyping ۱۶, ۱۸ | #* | ۸۰۳۴۷۵ | ۲۶۳,۵۷۸ | - | ۸۵۶,۳۱۰ | ۸۵۶,۳۱۰ | ۴۲۶,۱۶۸ | ۴۲۶,۱۶۸ | ۴۹۸,۵۵۱ | ۴۹۸,۵۵۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria(IgG) به روش الایزا | #* | ۸۰۳۴۹۱ | ۲۱,۹۷۷ | - | ۷۲,۷۱۰ | ۷۲,۷۱۰ | ۳۵,۴۲۰ | ۳۵,۴۲۰ | ۴۱,۴۱۰ | ۴۱,۴۱۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria(IgM) به روش الایزا | #* | ۸۰۳۴۹۲ | ۲۱,۹۷۷ | - | ۷۲,۷۱۰ | ۷۲,۷۱۰ | ۳۵,۴۲۰ | ۳۵,۴۲۰ | ۴۱,۴۱۰ | ۴۱,۴۱۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti (IgG-Leptospira) به روش الایزا | #* | ۸۰۳۴۹۳ | ۳۵,۰۰۴ | - | ۱۱۳,۲۲۰ | ۱۱۳,۲۲۰ | ۵۶,۶۴۰ | ۵۶,۶۴۰ | ۶۶,۲۷۰ | ۶۶,۲۷۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی Anti (IgM-Leptospira) به روش الایزا | #* | ۸۰۳۴۹۴ | ۳۵,۰۰۴ | - | ۱۱۳,۲۲۰ | ۱۱۳,۲۲۰ | ۵۶,۶۴۰ | ۵۶,۶۴۰ | ۶۶,۲۷۰ | ۶۶,۲۷۰ |
| آنتی بادی Anti-Brucella (IgA) | #* | ۸۰۳۴۹۵ | ۲۱,۴۰۴ | - | ۶۹,۵۸۷ | ۶۹,۵۸۷ | ۳۴,۶۰۲ | ۳۴,۶۰۲ | ۴۰,۴۷۸ | ۴۰,۴۷۸ |
| آنتی بادی Anti-Brucella (IgG) | #* | ۸۰۳۴۹۶ | ۲۱,۴۰۴ | - | ۶۹,۵۸۷ | ۶۹,۵۸۷ | ۳۴,۶۰۲ | ۳۴,۶۰۲ | ۴۰,۴۷۸ | ۴۰,۴۷۸ |
| آنتی بادی Anti-Brucella (IgM) | #* | ۸۰۳۴۹۷ | ۲۱,۴۰۴ | - | ۶۹,۵۸۷ | ۶۹,۵۸۷ | ۳۴,۶۰۲ | ۳۴,۶۰۲ | ۴۰,۴۷۸ | ۴۰,۴۷۸ |
| Anti-HAV (IgM) | #* | ۸۰۳۵۰۰ | ۳۸,۰۹۷ | - | ۱۲۳,۷۱۱ | ۱۲۳,۷۱۱ | ۶۱,۶۰۲ | ۶۱,۶۰۲ | ۷۲,۰۶۶ | ۷۲,۰۶۶ |
| اندازه‌گیری کمّی Anti- dsDNA | # | ۸۰۳۵۰۵ | ۲۱,۰۴۶ | ۱۴,۷۳۱ | ۶۸,۲۹۹ | ۵۳,۵۶۸ | ۳۴,۰۳۴ | ۱۹,۳۰۳ | ۳۹,۸۱۶ | ۲۵,۰۸۵ |
| اندازه‌گیری کمّی (Anti Mullerian Ab (Each Class | #* | ۸۰۳۵۱۰ | ۱۳۳,۷۱۸ | - | ۴۳۴,۴۶۰ | ۴۳۴,۴۶۰ | ۲۱۶,۲۰۰ | ۲۱۶,۲۰۰ | ۲۵۲,۹۲۰ | ۲۵۲,۹۲۰ |
| آنتی بادی (Anti-Pneumonia Each Class) | #* | ۸۰۳۵۱۵ | ۳۸,۲۷۶ | - | ۱۲۴,۳۵۵ | ۱۲۴,۳۵۵ | ۶۱,۸۸۶ | ۶۱,۸۸۶ | ۷۲,۳۹۷ | ۷۲,۳۹۷ |
| آنتی بادی (Anti-Diphtheria Each Class) | #* | ۸۰۳۵۲۰ | ۲۲,۸۸۵ | - | ۷۴,۲۸۲ | ۷۴,۲۸۲ | ۳۷,۰۰۸ | ۳۷,۰۰۸ | ۴۳,۲۹۵ | ۴۳,۲۹۵ |
| آنتی بادی (Anti-GM۱, Anti-Ganglioside (Each Class | #* | ۸۰۳۵۲۵ | ۶۸,۶۹۹ | - | ۲۲۳,۲۱۳ | ۲۲۳,۲۱۳ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۱۱۱,۰۷۴ | ۱۲۹,۹۳۹ | ۱۲۹,۹۳۹ |
| آنتی بادی (Anti-Acetylcholine Receptor (Each Class | #* | ۸۰۳۵۳۰ | ۱۵۲,۷۸۸ | - | ۴۹۶,۴۹۹ | ۴۹۶,۴۹۹ | ۲۴۷,۰۲۶ | ۲۴۷,۰۲۶ | ۲۸۸,۹۸۰ | ۲۸۸,۹۸۰ |
| آنتی بادی (Anti MuSK (Muscle Specific Kinase) | #* | ۸۰۳۵۳۱ | ۸۵,۹۸۶ | - | ۳۰۰,۸۸۰ | ۳۰۰,۸۸۰ | ۱۳۷,۱۶۰ | ۱۳۷,۱۶۰ | ۱۶۰,۰۳۰ | ۱۶۰,۰۳۰ |
| آنتی بادی Acetyl coline receptor Ab | #* | ۸۰۳۵۳۲ | ۳۰,۹۲۷ | - | ۱۰۴,۹۱۰ | ۱۰۴,۹۱۰ | ۴۹,۶۲۰ | ۴۹,۶۲۰ | ۵۷,۹۶۰ | ۵۷,۹۶۰ |
| اندازه‌گیری کمّی Inhibin A | #* | ۸۰۳۵۳۵ | ۱۱۴,۶۴۸ | - | ۳۷۲,۴۲۱ | ۳۷۲,۴۲۱ | ۱۸۵,۳۷۴ | ۱۸۵,۳۷۴ | ۲۱۶,۸۶۰ | ۲۱۶,۸۶۰ |
| اندازه‌گیری کمّی Leptin | #* | ۸۰۳۵۴۰ | ۱۱۴,۶۴۸ | - | ۳۷۲,۴۲۱ | ۳۷۲,۴۲۱ | ۱۸۵,۳۷۴ | ۱۸۵,۳۷۴ | ۲۱۶,۸۶۰ | ۲۱۶,۸۶۰ |
| آنتی بادی Anti-Tetanus (Each Class | #* | ۸۰۳۵۴۵ | ۲۲,۸۸۵ | - | ۷۴,۲۸۲ | ۷۴,۲۸۲ | ۳۷,۰۰۸ | ۳۷,۰۰۸ | ۴۳,۲۹۵ | ۴۳,۲۹۵ |
| آنتی بادی Anti Lyme(IgG) | #* | ۸۰۳۵۵۰ | ۳۵,۹۴۲ | - | ۱۱۶,۸۰۷ | ۱۱۶,۸۰۷ | ۵۸,۱۱۰ | ۵۸,۱۱۰ | ۶۷,۹۷۹ | ۶۷,۹۷۹ |
| آنتی بادی Anti Lyme(IgM) | #* | ۸۰۳۵۵۱ | ۳۵,۹۴۲ | - | ۱۱۶,۸۰۷ | ۱۱۶,۸۰۷ | ۵۸,۱۱۰ | ۵۸,۱۱۰ | ۶۷,۹۷۹ | ۶۷,۹۷۹ |
| اندازه‌گیری کمّی NGAL (Neutrophil gelatinase associated lipocalin) | #* | ۸۰۳۵۵۵ | ۵۸,۸۸۸ | - | ۲۰۶,۵۶۵ | ۲۰۶,۵۶۵ | ۹۳,۸۹۰ | ۹۳,۸۹۰ | ۱۰۹,۵۳۵ | ۱۰۹,۵۳۵ |
| تجسس آنتی ژن H pylori در مدفوع | #* | ۸۰۳۵۶۰ | ۳۳,۴۳۰ | - | ۱۰۸,۶۱۵ | ۱۰۸,۶۱۵ | ۵۴,۰۵۰ | ۵۴,۰۵۰ | ۶۳,۲۳۰ | ۶۳,۲۳۰ |
| اندازه گیری کمّی Interleukins؛ هر کدام | #* | ۸۰۳۵۶۵ | ۱۹,۰۷۰ | - | ۶۲,۰۳۹ | ۶۲,۰۳۹ | ۳۰,۸۲۶ | ۳۰,۸۲۶ | ۳۶,۰۶۰ | ۳۶,۰۶۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P۱۶ | #* | ۸۰۳۵۷۰ | ۴۷,۷۸۹ | - | ۱۵۵,۱۹۱ | ۱۵۵,۱۹۱ | ۷۷,۲۷۴ | ۷۷,۲۷۴ | ۹۰,۴۰۰ | ۹۰,۴۰۰ |
| CISH (مانند داک و FDA با تکنیک قابل قبول) | #* | ۸۰۳۵۷۵ | ۴۷۷,۷۰۵ | - | ۱,۵۵۲,۰۹۰ | ۱,۵۵۲,۰۹۰ | ۷۷۲,۳۷۲ | ۷۷۲,۳۷۲ | ۹۰۳,۵۵۴ | ۹۰۳,۵۵۴ |
| HPV Genotyping حداقل ۶ ژنوتیپ | #* | ۸۰۳۵۸۰ | ۲۸۶,۶۴۲ | - | ۹۳۱,۲۳۶ | ۹۳۱,۲۳۶ | ۴۶۳,۴۶۰ | ۴۶۳,۴۶۰ | ۵۴۲,۱۷۷ | ۵۴۲,۱۷۷ |
| آزمایش (Mixed) MAR (IgG) (antiglobulin reaction test | #* | ۸۰۳۵۸۵ | ۳۵,۰۹۰ | - | ۱۱۳,۹۵۴ | ۱۱۳,۹۵۴ | ۵۶,۷۴۰ | ۵۶,۷۴۰ | ۶۶,۳۷۸ | ۶۶,۳۷۸ |
| آزمایش (Mixed) MAR (IgA) (antiglobulin reaction test | #* | ۸۰۳۵۹۰ | ۳۵,۰۹۰ | - | ۱۱۳,۹۵۴ | ۱۱۳,۹۵۴ | ۵۶,۷۴۰ | ۵۶,۷۴۰ | ۶۶,۳۷۸ | ۶۶,۳۷۸ |
| آزمایش (Mixed) MAR (IgM) (antiglobulin reaction test | #* | ۸۰۳۵۹۵ | ۳۵,۰۹۰ | - | ۱۱۳,۹۵۴ | ۱۱۳,۹۵۴ | ۵۶,۷۴۰ | ۵۶,۷۴۰ | ۶۶,۳۷۸ | ۶۶,۳۷۸ |
| آزمایش (Sperm Washing S wim Down Method) | #* | ۸۰۳۶۱۰ | ۵۹,۶۷۹ | - | ۱۹۳,۹۴۲ | ۱۹۳,۹۴۲ | ۹۶,۴۸۸ | ۹۶,۴۸۸ | ۱۱۲,۸۷۵ | ۱۱۲,۸۷۵ |
| آزمایش (Sperm Washing S wim Up Method) | #* | ۸۰۳۶۱۵ | ۴۷,۷۸۹ | - | ۱۵۵,۱۹۱ | ۱۵۵,۱۹۱ | ۷۷,۲۷۴ | ۷۷,۲۷۴ | ۹۰,۴۰۰ | ۹۰,۴۰۰ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی (Anti-Borrelia (IgG | #* | ۸۰۳۶۲۰ | ۴۹,۳۱۴ | - | ۱۶۰,۲۵۳ | ۱۶۰,۲۵۳ | ۷۹,۷۳۰ | ۷۹,۷۳۰ | ۹۳,۲۷۱ | ۹۳,۲۷۱ |
| آزمایش تعیین آنتی بادی (Anti-Borrelia (IgM | #* | ۸۰۳۶۲۱ | ۴۹,۳۱۴ | - | ۱۶۰,۲۵۳ | ۱۶۰,۲۵۳ | ۷۹,۷۳۰ | ۷۹,۷۳۰ | ۹۳,۲۷۱ | ۹۳,۲۷۱ |
| آنتی بادی (Transglutamiase IgA Anti-Tissue) | #* | ۸۰۳۶۲۵ | ۲۶,۰۷۱ | - | ۸۴,۶۸۳ | ۸۴,۶۸۳ | ۴۲,۱۵۴ | ۴۲,۱۵۴ | ۴۹,۳۱۴ | ۴۹,۳۱۴ |
| آنتی بادی (Transglutamiase IgG Anti-Tissue) | #* | ۸۰۳۶۲۶ | ۲۶,۰۷۱ | - | ۸۴,۶۸۳ | ۸۴,۶۸۳ | ۴۲,۱۵۴ | ۴۲,۱۵۴ | ۴۹,۳۱۴ | ۴۹,۳۱۴ |
| آنتی بادی (Anti-TPO (Anti-Thyroid peroxidase) | #* | ۸۰۳۶۳۰ | ۳۰,۹۱۷ | - | ۱۰۰,۴۲۳ | ۱۰۰,۴۲۳ | ۴۹,۹۹۰ | ۴۹,۹۹۰ | ۵۸,۴۸۱ | ۵۸,۴۸۱ |
| تجسس آنتی ژن C. difficile در مدفوع | #* | ۸۰۳۶۳۵ | ۷۴,۲۱۸ | - | ۲۴۱,۱۶۲ | ۲۴۱,۱۶۲ | ۱۱۹,۹۹۶ | ۱۱۹,۹۹۶ | ۱۴۰,۳۷۶ | ۱۴۰,۳۷۶ |
| اندازه گیری کمّیCalprotectin | #* | ۸۰۳۶۴۰ | ۱۲۳,۸۴۷ | - | ۴۰۲,۳۳۶ | ۴۰۲,۳۳۶ | ۲۰۰,۲۴۴ | ۲۰۰,۲۴۴ | ۲۳۴,۲۵۵ | ۲۳۴,۲۵۵ |
| تجسس Clostridum difficile toxin A&B | #* | ۸۰۳۶۴۵ | ۹۸,۹۴۳ | - | ۳۲۱,۴۲۷ | ۳۲۱,۴۲۷ | ۱۵۹,۹۷۸ | ۱۵۹,۹۷۸ | ۱۸۷,۱۵۰ | ۱۸۷,۱۵۰ |
| CMV Ag به روش IF | # | ۸۰۳۶۵۰ | ۶۹,۱۹۳ | ۴۸,۴۳۱ | ۲۲۴,۷۷۸ | ۱۷۶,۳۴۷ | ۱۱۱,۸۷۶ | ۶۳,۴۴۵ | ۱۳۰,۸۷۸ | ۸۲,۴۴۷ |
| اندازه‌گیری کمّی Human Epididymis Protein ۴, HE۴ | #* | ۸۰۳۶۵۵ | ۹۵,۸۶۴ | - | ۳۳۲,۱۸۰ | ۳۳۲,۱۸۰ | ۱۵۳,۲۰۰ | ۱۵۳,۲۰۰ | ۱۷۸,۸۱۰ | ۱۷۸,۸۱۰ |
| اندازه گیری کمّی NT-PRO-BNP (N-terminal of the prohormone brain natriuretic peptide) | #* | ۸۰۳۶۶۰ | ۱۷۳,۱۶۱ | - | ۵۶۲,۵۸۹ | ۵۶۲,۵۸۹ | ۲۷۹,۹۷۴ | ۲۷۹,۹۷۴ | ۳۲۷,۵۲۶ | ۳۲۷,۵۲۶ |
| تجسس (Nuclear matrix protein ۲۲ (NMP۲۲ | #* | ۸۰۳۶۶۵ | ۸۴,۲۲۵ | - | ۲۷۳,۵۶۳ | ۲۷۳,۵۶۳ | ۱۳۶,۱۸۶ | ۱۳۶,۱۸۶ | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۵۹,۳۱۸ |
| اندازه گیری Pro-calcitonin | #* | ۸۰۳۶۷۰ | ۱۱۱,۳۲۷ | - | ۳۶۱,۷۴۳ | ۳۶۱,۷۴۳ | ۱۷۹,۹۹۴ | ۱۷۹,۹۹۴ | ۲۱۰,۵۶۴ | ۲۱۰,۵۶۴ |
| آنتی بادی (Anti-Scl ۷۰ (Topoisomerase ۱ | #* | ۸۰۳۶۷۵ | ۴۳,۱۲۲ | - | ۱۴۰,۰۹۵ | ۱۴۰,۰۹۵ | ۶۹,۷۲۲ | ۶۹,۷۲۲ | ۸۱,۵۶۴ | ۸۱,۵۶۴ |
| آزمایش Xylocaine | #* | ۸۰۳۶۸۰ | ۹,۳۷۸ | - | ۳۰,۵۵۹ | ۳۰,۵۵۹ | ۱۵,۱۵۴ | ۱۵,۱۵۴ | ۱۷,۷۲۶ | ۱۷,۷۲۶ |
| اندازه‌گیری کمّی اینترفرون گاما | # | ۸۰۳۶۸۲ | ۳۰۴,۹۶۰ | ۲۱۳,۴۶۰ | ۱,۰۱۲,۴۰۰ | ۷۹۸,۹۴۰ | ۴۹۱,۲۰۰ | ۲۷۷,۷۴۰ | ۵۷۴,۲۰۰ | ۳۶۰,۷۴۰ |
| اندازه‌گیری کمّی گالاکتومانان | #* | ۸۰۳۶۸۴ | ۲۸۷,۰۶۰ | - | ۹۴۸,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۰۰ | ۴۶۲,۸۰۰ | ۴۶۲,۸۰۰ | ۵۴۱,۱۰۰ | ۵۴۱,۱۰۰ |
| تست آلرژن ۳۰ پانلی | #* | ۸۰۳۶۸۶ | ۲۷۳,۴۷۰ | - | ۹۲۰,۳۰۰ | ۹۲۰,۳۰۰ | ۴۳۹,۴۰۰ | ۴۳۹,۴۰۰ | ۵۱۳,۴۰۰ | ۵۱۳,۴۰۰ |
| آزمایش آدامز شامل آنتی ژن یا آنتی بادی | #* | ۸۰۳۶۹۶ | ۱۰۳,۰۹۰ | - | ۳۴۹,۷۰۰ | ۳۴۹,۷۰۰ | ۱۶۵,۴۰۰ | ۱۶۵,۴۰۰ | ۱۹۳,۲۰۰ | ۱۹۳,۲۰۰ |
| تجسس کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس | #* | ۸۰۳۶۹۸ | ۲۰۱,۸۷۰ | - | ۶۶۲,۷۰۰ | ۶۶۲,۷۰۰ | ۳۲۵,۸۰۰ | ۳۲۵,۸۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰ |
| آنتی بادی Anti Insulin | #* | ۸۰۳۶۹۹ | ۱۲,۵۶۳ | - | ۴۰,۹۶۰ | ۴۰,۹۶۰ | ۲۰,۳۰۰ | ۲۰,۳۰۰ | ۲۳,۷۴۵ | ۲۳,۷۴۵ |
| آنتی بادی فاکتور داخلی Anti Intrinsic factor | #* | ۸۰۳۷۰۰ | ۱۳,۴۵۸ | - | ۴۴,۱۸۰ | ۴۴,۱۸۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۲۵,۴۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آنتی بادی Anti GAD | #* | ۸۰۳۷۰۱ | ۳۰,۴۹۶ | - | ۱۰۱,۲۴۰ | ۱۰۱,۲۴۰ | ۴۹,۱۲۰ | ۴۹,۱۲۰ | ۵۷,۴۲۰ | ۵۷,۴۲۰ |
| آنتی بادی Anti TSH receptor | #* | ۸۰۳۷۰۲ | ۳۰,۴۹۶ | - | ۱۰۱,۲۴۰ | ۱۰۱,۲۴۰ | ۴۹,۱۲۰ | ۴۹,۱۲۰ | ۵۷,۴۲۰ | ۵۷,۴۲۰ |
| آنتی بادی Aquaporin ۴ | #* | ۸۰۳۷۰۳ | ۵۰,۱۸۶ | - | ۱۷۲,۰۸۰ | ۱۷۲,۰۸۰ | ۸۰,۳۶۰ | ۸۰,۳۶۰ | ۹۳,۸۳۰ | ۹۳,۸۳۰ |
| آنتی بادی Aspergillus(IgG) fumigatus Ab | #* | ۸۰۳۷۰۴ | ۱۵,۲۴۸ | - | ۵۰,۶۲۰ | ۵۰,۶۲۰ | ۲۴,۵۶۰ | ۲۴,۵۶۰ | ۲۸,۷۱۰ | ۲۸,۷۱۰ |
| آنتی بادی Aspergillus(IgM) fumigatus Ab | #* | ۸۰۳۷۰۵ | ۱۵,۲۴۸ | - | ۵۰,۶۲۰ | ۵۰,۶۲۰ | ۲۴,۵۶۰ | ۲۴,۵۶۰ | ۲۸,۷۱۰ | ۲۸,۷۱۰ |
| آنتی بادی Anti neuronal | #* | ۸۰۳۷۰۶ | ۱۴۱,۳۷۵ | - | ۴۵۵,۶۵۰ | ۴۵۵,۶۵۰ | ۲۲۸,۹۰۰ | ۲۲۸,۹۰۰ | ۲۶۷,۸۵۰ | ۲۶۷,۸۵۰ |
| آنتی بادی S-۱۰۰ | #* | ۸۰۳۷۰۷ | ۴۳,۰۲۶ | - | ۱۴۶,۳۲۰ | ۱۴۶,۳۲۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۸۰,۵۹۰ | ۸۰,۵۹۰ |
| آنتی بادی Islet cell Ab | #* | ۸۰۳۷۰۸ | ۴۳,۰۲۶ | - | ۱۴۶,۳۲۰ | ۱۴۶,۳۲۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۸۰,۵۹۰ | ۸۰,۵۹۰ |
| Gangliozide Ab panel | #* | ۸۰۳۷۰۹ | ۵۵,۵۵۶ | - | ۱۹۱,۴۰۰ | ۱۹۱,۴۰۰ | ۸۸,۸۸۰ | ۸۸,۸۸۰ | ۱۰۳,۷۶۰ | ۱۰۳,۷۶۰ |
| Myositis Ab panel | #* | ۸۰۳۷۱۰ | ۹۱,۳۵۶ | - | ۳۲۰,۲۰۰ | ۳۲۰,۲۰۰ | ۱۴۵,۶۸۰ | ۱۴۵,۶۸۰ | ۱۶۹,۹۶۰ | ۱۶۹,۹۶۰ |
| اندازه گیری کمّی TNF-A | #* | ۸۰۳۷۱۱ | ۳۸,۰۸۷ | - | ۱۳۰,۶۷۰ | ۱۳۰,۶۷۰ | ۶۰,۹۸۰ | ۶۰,۹۸۰ | ۷۱,۲۰۰ | ۷۱,۲۰۰ |
| اندازه گیری کمّی TGF-۱(Tumor growth factor) | #* | ۸۰۳۷۱۲ | ۳۷,۶۵۶ | - | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۶۰,۴۸۰ | ۶۰,۴۸۰ | ۷۰,۶۶۰ | ۷۰,۶۶۰ |
| آنتی بادی Anti histon | #* | ۸۰۳۷۱۳ | ۱۳,۴۵۸ | - | ۴۴,۱۸۰ | ۴۴,۱۸۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۲۵,۴۰۰ |
| آنتی بادی Anti-NMDA receptor | #* | ۸۰۳۷۱۴ | ۵۱,۱۱۴ | - | ۱۷۱,۱۸۰ | ۱۷۱,۱۸۰ | ۸۲,۲۰۰ | ۸۲,۲۰۰ | ۹۶,۰۶۰ | ۹۶,۰۶۰ |
| Antibodies against neuronal antigen(آنتی ژن ۱۲) | #* | ۸۰۳۷۱۵ | ۱۲۴,۵۷۰ | - | ۴۲۶,۹۸۰ | ۴۲۶,۹۸۰ | ۱۹۹,۴۸۰ | ۱۹۹,۴۸۰ | ۲۳۲,۹۲۰ | ۲۳۲,۹۲۰ |
| اندازه گیری کمّی MBL (Mannose-Binding Lectin) به روش ایمونواسی | #* | ۸۰۳۷۱۶ | ۵۵,۹۸۷ | - | ۱۹۵,۰۷۰ | ۱۹۵,۰۷۰ | ۸۹,۳۸۰ | ۸۹,۳۸۰ | ۱۰۴,۳۰۰ | ۱۰۴,۳۰۰ |
| آنتی بادی Anti C۱q | #* | ۸۰۳۷۱۷ | ۳۴,۰۷۶ | - | ۱۱۴,۱۲۰ | ۱۱۴,۱۲۰ | ۵۴,۸۰۰ | ۵۴,۸۰۰ | ۶۴,۰۴۰ | ۶۴,۰۴۰ |
| سایر آزمایش های سرولوژی و ایمونولوژی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند | #* | ۸۰۳۷۲۰ | ۱۵,۴۳۴ | - | ۵۰,۴۴۰ | ۵۰,۴۴۰ | ۲۴,۹۲۸ | ۲۴,۹۲۸ | ۲۹,۱۵۶ | ۲۹,۱۵۶ |
| آزمایش کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی | # | ۸۰۴۰۰۰ | ۶,۶۹۹ | ۴,۶۸۹ | ۲۰,۰۷۵ | ۱۵,۳۸۶ | ۱۰,۹۷۸ | ۶,۲۸۹ | ۱۲,۸۷۶ | ۸,۱۸۷ |
| آزمایش کشت مدفوع و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی | # | ۸۰۴۰۰۵ | ۱۴,۱۶۴ | ۹,۹۱۴ | ۴۲,۲۶۹ | ۳۲,۳۵۶ | ۲۳,۲۲۶ | ۱۳,۳۱۳ | ۲۷,۲۴۵ | ۱۷,۳۳۲ |
| آزمایش کشت خون و آنتی‌بیوگرام، هر نوبت | # | ۸۰۴۰۱۰ | ۱۷,۱۷۰ | ۱۲,۰۱۸ | ۵۲,۰۲۶ | ۴۰,۰۰۸ | ۲۸,۰۸۸ | ۱۶,۰۷۰ | ۳۲,۹۳۳ | ۲۰,۹۱۵ |
| آزمایش کشت گلو از نظر عوامل باکتریایی | # | ۸۰۴۰۱۵ | ۱۴,۲۵۰ | ۹,۹۷۴ | ۴۳,۰۰۳ | ۳۳,۰۲۹ | ۲۳,۳۲۶ | ۱۳,۳۵۲ | ۲۷,۳۵۳ | ۱۷,۳۷۹ |
| آزمایش کشت عامل سالک (لیشمانیا) | # | ۸۰۴۰۲۰ | ۱۵,۷۱۲ | ۱۰,۹۹۸ | ۵۰,۱۷۰ | ۳۹,۱۷۳ | ۲۵,۴۸۰ | ۱۴,۴۸۳ | ۲۹,۸۲۵ | ۱۸,۸۲۸ |
| آزمایش کشت بی‌هوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور) | # | ۸۰۴۰۳۰ | ۱۶,۸۰۶ | ۱۱,۷۶۳ | ۵۱,۵۶۲ | ۳۹,۷۹۹ | ۲۷,۴۳۶ | ۱۵,۶۷۳ | ۳۲,۱۵۶ | ۲۰,۳۹۳ |
| آزمایش کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر عوامل میکروبی | # | ۸۰۴۰۳۵ | ۷,۳۷۲ | ۵,۱۶۰ | ۲۲,۲۸۴ | ۱۷,۱۲۴ | ۱۲,۰۶۴ | ۶,۹۰۴ | ۱۴,۱۴۶ | ۸,۹۸۶ |
| آزمایش کشت ترشحات واژن از نظر عوامل میکروبی | # | ۸۰۴۰۴۰ | ۷,۳۷۲ | ۵,۱۶۰ | ۲۲,۲۸۴ | ۱۷,۱۲۴ | ۱۲,۰۶۴ | ۶,۹۰۴ | ۱۴,۱۴۶ | ۸,۹۸۶ |
| آزمایش تعیین گروه شیگلا | # | ۸۰۴۰۴۵ | ۸,۰۳۲ | ۵,۶۲۲ | ۲۶,۱۴۱ | ۲۰,۵۱۹ | ۱۲,۹۸۲ | ۷,۳۶۰ | ۱۵,۱۸۶ | ۹,۵۶۴ |
| آزمایش کیفی اوره‌آز روی بافت برای هلیکوباکتر پیلوری | # | ۸۰۴۰۵۰ | ۲,۲۹۱ | ۱,۶۰۳ | ۷,۱۸۱ | ۵,۵۷۸ | ۳,۷۲۶ | ۲,۱۲۳ | ۴,۳۶۴ | ۲,۷۶۱ |
| آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم و کشت هلیکوباکتر | # | ۸۰۴۰۶۰ | ۱۱,۳۶۰ | ۷,۹۵۱ | ۳۵,۹۹۵ | ۲۸,۰۴۴ | ۱۸,۴۴۶ | ۱۰,۴۹۵ | ۲۱,۵۹۷ | ۱۳,۶۴۶ |
| آزمایش کشت کلامیدیا | # | ۸۰۴۰۶۵ | ۱۱,۶۳۲ | ۸,۱۴۱ | ۳۶,۵۴۹ | ۲۸,۴۰۸ | ۱۸,۹۱۴ | ۱۰,۷۷۳ | ۲۲,۱۵۱ | ۱۴,۰۱۰ |
| آزمایش کشت مایکوپلاسما و یا اوراپلاسما | # | ۸۰۴۰۷۰ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۵,۳۲۷ | ۷۱,۱۵۲ | ۵۵,۸۲۵ | ۳۵,۴۰۴ | ۲۰,۰۷۷ | ۴۱,۴۱۷ | ۲۶,۰۹۰ |
| آزمایش تجسس میکروسکوپی BK (باسیل کخ) به روش اسید فست | # | ۸۰۴۰۷۵ | ۳۵,۱۶۹ | ۲۴,۶۱۵ | ۱۰۴,۰۶۶ | ۷۹,۴۵۱ | ۵۷,۷۴۸ | ۳۳,۱۳۳ | ۶۷,۷۵۸ | ۴۳,۱۴۳ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش کشت و آنتی‌بیوگرام میکروب سل (حداقل با استفاده از ۳ نوع آنتی بیوتیک) | # | ۸۰۴۰۸۰ | ۹۹,۲۰۳ | ۶۹,۴۳۲ | ۲۸۳,۱۵۶ | ۲۱۳,۷۲۴ | ۱۶۳,۷۹۲ | ۹۴,۳۶۰ | ۱۹۲,۳۸۶ | ۱۲۲,۹۵۴ |
| آزمایش آنتی بیوگرام میکروب سل | # | ۸۰۴۰۸۵ | ۸۲,۹۵۶ | ۵۸,۰۶۶ | ۲۷۶,۸۳۸ | ۲۱۸,۷۷۲ | ۱۳۳,۴۹۲ | ۷۵,۴۲۶ | ۱۵۶,۰۲۰ | ۹۷,۹۵۴ |
| آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم برای عوامل قارچی | # | ۸۰۴۰۹۰ | ۳,۸۶۵ | ۲,۷۰۵ | ۱۱,۷۸۶ | ۹,۰۸۱ | ۶,۳۱۶ | ۳,۶۱۱ | ۷,۴۰۴ | ۴,۶۹۹ |
| آزمایش کشت اختصاصی از نظر عوامل قارچی | # | ۸۰۴۰۹۵ | ۱۲,۴۴۷ | ۸,۷۱۲ | ۳۸,۲۱۱ | ۲۹,۴۹۹ | ۲۰,۳۱۸ | ۱۱,۶۰۶ | ۲۳,۸۱۳ | ۱۵,۱۰۱ |
| آزمایش مدفوع برای تجسس میکروسکوپی انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت | # | ۸۰۴۱۰۰ | ۳,۷۷۹ | ۲,۶۴۵ | ۱۱,۰۵۲ | ۸,۴۰۷ | ۶,۲۱۶ | ۳,۵۷۱ | ۷,۲۹۶ | ۴,۶۵۱ |
| آزمایش تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت | # | ۸۰۴۱۰۵ | ۲,۷۹۱ | ۱,۹۵۳ | ۷,۹۲۲ | ۵,۹۶۹ | ۴,۶۱۲ | ۲,۶۵۹ | ۵,۴۱۸ | ۳,۴۶۵ |
| آزمایش نوار چسب اسکاچ | # | ۸۰۴۱۱۰ | ۲,۶۴۹ | ۱,۸۵۴ | ۸,۴۶۹ | ۶,۶۱۵ | ۴,۲۹۴ | ۲,۴۴۰ | ۵,۰۲۶ | ۳,۱۷۲ |
| تجسس میکروسکوپی جهت تجسس حشره گال | # | ۸۰۴۱۱۵ | ۴,۵۳۸ | ۳,۱۷۶ | ۱۳,۹۹۵ | ۱۰,۸۱۹ | ۷,۴۰۲ | ۴,۲۲۶ | ۸,۶۷۴ | ۵,۴۹۸ |
| اندازه‌گیری کمّی چربی تام مدفوع (۲۴ تا ۴۸ ساعته) | # | ۸۰۴۱۲۰ | ۱۳,۶۰۱ | ۹,۵۲۰ | ۴۳,۶۳۳ | ۳۴,۱۱۳ | ۲۲,۰۳۸ | ۱۲,۵۱۸ | ۲۵,۷۹۲ | ۱۶,۲۷۲ |
| تشخیص عوامل ویروسی با استفاده از کشت سلولی | # | ۸۰۴۱۲۵ | ۱۷۵,۷۲۱ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۵۹۹,۳۵۱ | ۴۷۶,۳۵۱ | ۲۸۱,۶۴۶ | ۱۵۸,۶۴۶ | ۳۲۸,۹۱۹ | ۲۰۵,۹۱۹ |
| آزمایش افتراقی BK | #* | ۸۰۴۱۴۰ | ۲۶,۲۵۰ | - | ۸۵,۳۲۷ | ۸۵,۳۲۷ | ۴۲,۴۳۸ | ۴۲,۴۳۸ | ۴۹,۶۴۵ | ۴۹,۶۴۵ |
| کشت آمیب | #* | ۸۰۴۱۴۵ | ۶,۵۰۷ | - | ۲۱,۰۷۹ | ۲۱,۰۷۹ | ۱۰,۵۲۶ | ۱۰,۵۲۶ | ۱۲,۳۱۵ | ۱۲,۳۱۵ |
| کشت ترشح گلو از نظر دیفتری | #* | ۸۰۴۱۵۰ | ۱۰,۸۵۹ | - | ۳۵,۲۵۴ | ۳۵,۲۵۴ | ۱۷,۵۶۰ | ۱۷,۵۶۰ | ۲۰,۵۴۳ | ۲۰,۵۴۳ |
| کشت لیستریا | #* | ۸۰۴۱۵۵ | ۸,۳۴۷ | - | ۲۷,۰۶۲ | ۲۷,۰۶۲ | ۱۳,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | ۱۵,۷۹۴ | ۱۵,۷۹۴ |
| کشت بروسلا روی محیط کاستانیدا | #* | ۸۰۴۱۶۰ | ۱۰,۸۵۹ | - | ۳۵,۲۵۴ | ۳۵,۲۵۴ | ۱۷,۵۶۰ | ۱۷,۵۶۰ | ۲۰,۵۴۳ | ۲۰,۵۴۳ |
| آزمایش اوره تنفسی (UBT (Urea Breath Test با استفاده از کربن۱۳ یا ۱۴ | # | ۸۰۴۱۶۵ | ۱۱۰,۳۸۲ | ۷۷,۲۶۲ | ۳۵۸,۹۸۰ | ۲۸۱,۷۱۸ | ۱۷۸,۴۴۰ | ۱۰۱,۱۷۸ | ۲۰۸,۷۴۰ | ۱۳۱,۴۷۸ |
| آزمایش E- Test برای هر آنتی بیوتیک | #* | ۸۰۴۱۷۰ | ۴۳,۷۹۵ | - | ۱۴۲,۳۰۴ | ۱۴۲,۳۰۴ | ۷۰,۸۰۸ | ۷۰,۸۰۸ | ۸۲,۸۳۴ | ۸۲,۸۳۴ |
| تشخیص عوامل بیماری‌زا با تکنیک فلورسنت | #* | ۸۰۴۱۷۵ | ۲۴,۹۰۴ | - | ۸۰,۹۰۹ | ۸۰,۹۰۹ | ۴۰,۲۶۶ | ۴۰,۲۶۶ | ۴۷,۱۰۵ | ۴۷,۱۰۵ |
| تجسس میکروسکوپی مستقیم برای جسم لیشمن (Leishman Body) | # | ۸۰۴۱۸۰ | ۶,۸۶۵ | ۴,۸۰۵ | ۲۲,۳۶۷ | ۱۷,۵۶۲ | ۱۱,۰۹۴ | ۶,۲۸۹ | ۱۲,۹۷۷ | ۸,۱۷۲ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون (روش غیر دستگاهی) | #* | ۸۰۴۱۸۱ | ۱۸,۳۹۷ | - | ۵۹,۸۳۰ | ۵۹,۸۳۰ | ۲۹,۷۴۰ | ۲۹,۷۴۰ | ۳۴,۷۹۰ | ۳۴,۷۹۰ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون(روش دستگاهی) | #* | ۸۰۴۱۸۲ | ۵۱,۱۸۰ | - | ۱۶۲,۹۴۰ | ۱۶۲,۹۴۰ | ۸۳,۰۴۰ | ۸۳,۰۴۰ | ۹۷,۲۱۰ | ۹۷,۲۱۰ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت زخم(حداقل چهار محیط) | #* | ۸۰۴۱۸۳ | ۱۳,۲۴۳ | - | ۴۲,۳۴۵ | ۴۲,۳۴۵ | ۲۱,۴۷۰ | ۲۱,۴۷۰ | ۲۵,۱۳۰ | ۲۵,۱۳۰ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه ادرار | #* | ۸۰۴۱۸۴ | ۸,۳۰۴ | - | ۲۶,۶۹۵ | ۲۶,۶۹۵ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۵,۷۴۰ | ۱۵,۷۴۰ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه مدفوع | #* | ۸۰۴۱۸۵ | ۱۱,۶۶۸ | - | ۳۷,۷۴۰ | ۳۷,۷۴۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۲۲,۰۹۰ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه تنفسی | #* | ۸۰۴۱۸۶ | ۱۱,۶۶۸ | - | ۳۷,۷۴۰ | ۳۷,۷۴۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۲۲,۰۹۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی مایعات استریل بدن | #* | ۸۰۴۱۸۷ | ۱۶,۶۰۷ | - | ۵۳,۳۹۰ | ۵۳,۳۹۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۳۱,۴۸۰ | ۳۱,۴۸۰ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی سایر نمونه های بالینی | #* | ۸۰۴۱۸۸ | ۱۱,۶۶۸ | - | ۳۷,۷۴۰ | ۳۷,۷۴۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۱۸,۸۸۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۲۲,۰۹۰ |
| نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم بی هوازی در نمونه های بالینی | #* | ۸۰۴۱۸۹ | ۳۸,۱۵۳ | - | ۱۲۲,۴۳۰ | ۱۲۲,۴۳۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۷۲,۳۵۰ | ۷۲,۳۵۰ |
| تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(روش Traditional) | #* | ۸۰۴۱۹۰ | ۲۶,۴۸۵ | - | ۸۴,۶۹۰ | ۸۴,۶۹۰ | ۴۲,۹۴۰ | ۴۲,۹۴۰ | ۵۰,۲۶۰ | ۵۰,۲۶۰ |
| تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(به روشهایی نظیر Microwell strip) | #* | ۸۰۴۱۹۱ | ۳۸,۱۵۳ | - | ۱۲۲,۴۳۰ | ۱۲۲,۴۳۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۷۲,۳۵۰ | ۷۲,۳۵۰ |
| تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی پرنیاز(بروسلا، هموفیلوس، نایسریا و سایر) | #* | ۸۰۴۱۹۲ | ۳۸,۱۵۳ | - | ۱۲۲,۴۳۰ | ۱۲۲,۴۳۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۷۲,۳۵۰ | ۷۲,۳۵۰ |
| تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم مثبت | #* | ۸۰۴۱۹۳ | ۱۹,۷۵۶ | - | ۶۲,۶۰۰ | ۶۲,۶۰۰ | ۳۲,۰۸۰ | ۳۲,۰۸۰ | ۳۷,۵۶۰ | ۳۷,۵۶۰ |
| رنگ آمیزی گرم برای هرنمونه و یا کلنی ایزوله شده | #* | ۸۰۴۱۹۴ | ۵,۸۳۴ | - | ۱۸,۸۷۰ | ۱۸,۸۷۰ | ۹,۴۴۰ | ۹,۴۴۰ | ۱۱,۰۴۵ | ۱۱,۰۴۵ |
| تعیین مقاومت میکروبی(هردیسک) | #* | ۸۰۴۱۹۵ | ۱,۹۷۶ | - | ۶,۲۶۰ | ۶,۲۶۰ | ۳,۲۰۸ | ۳,۲۰۸ | ۳,۷۵۶ | ۳,۷۵۶ |
| تشخیص فنوتیپیک ESBL | #* | ۸۰۴۱۹۶ | ۱۳,۴۵۸ | - | ۴۴,۱۸۰ | ۴۴,۱۸۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۲۵,۴۰۰ |
| تشخیص فنوتیپیک کارباپنماز | #* | ۸۰۴۱۹۷ | ۱۸,۳۹۷ | - | ۵۹,۸۳۰ | ۵۹,۸۳۰ | ۲۹,۷۴۰ | ۲۹,۷۴۰ | ۳۴,۷۹۰ | ۳۴,۷۹۰ |
| تشخیص فنوتیپیک Amp C | #* | ۸۰۴۱۹۸ | ۱۶,۶۰۷ | - | ۵۳,۳۹۰ | ۵۳,۳۹۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۳۱,۴۸۰ | ۳۱,۴۸۰ |
| تشخیص مولکولی MRSA | #* | ۸۰۴۲۰۱ | ۷۶,۲۴۰ | - | ۲۵۳,۱۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۱۴۳,۵۵۰ |
| تشخیص مولکولی VRE | #* | ۸۰۴۲۰۲ | ۷۶,۲۴۰ | - | ۲۵۳,۱۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۱۴۳,۵۵۰ |
| تشخیص مولکولی کارباپنماز | #* | ۸۰۴۲۰۳ | ۷۶,۲۴۰ | - | ۲۵۳,۱۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۱۴۳,۵۵۰ |
| تشخیص مولکولی ESBL | #* | ۸۰۴۲۰۴ | ۷۶,۲۴۰ | - | ۲۵۳,۱۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۱۴۳,۵۵۰ |
| تشخیص مولکولی Amp C | #* | ۸۰۴۲۰۶ | ۷۶,۲۴۰ | - | ۲۵۳,۱۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۱۴۳,۵۵۰ |
| آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی | # | ۸۰۴۴۰۰ | ۸,۵۵۲ | ۵,۹۸۶ | ۲۴,۴۱۰ | ۱۸,۴۲۵ | ۱۴,۱۲۰ | ۸,۱۳۵ | ۱۶,۵۸۵ | ۱۰,۶۰۰ |
| آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی بطور کامل دستگاه خودکار | # | ۸۰۴۴۰۵ | ۱۸,۸۲۸ | ۱۳,۱۷۹ | ۶۳,۵۰۰ | ۵۰,۳۲۱ | ۳۰,۲۴۰ | ۱۷,۰۶۱ | ۳۵,۳۳۰ | ۲۲,۱۵۱ |
| اندازه‌گیری فروکتوز مایع منی | # | ۸۰۴۴۱۰ | ۲,۸۷۱ | ۲,۰۰۹ | ۹,۴۸۰ | ۷,۴۷۱ | ۴,۶۲۸ | ۲,۶۱۹ | ۵,۴۱۱ | ۳,۴۰۲ |
| آزمایش بعد از مقاربت (PCT) | # | ۸۰۴۴۱۵ | ۶,۲۹۱ | ۴,۴۰۴ | ۱۹,۲۴۴ | ۱۴,۸۴۱ | ۱۰,۲۷۶ | ۵,۸۷۳ | ۱۲,۰۴۵ | ۷,۶۴۲ |
| آزمایش روتین مایعات بدن: شامل گلوکز، پروتئین و تجسس میکروسکوپی و شمارش سلولها در مایع مغزی نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت، مایع پلور و سایر مایعات بدن | # | ۸۰۴۴۲۰ | ۸,۱۴۴ | ۵,۷۰۰ | ۲۳,۵۷۹ | ۱۷,۸۷۹ | ۱۳,۴۱۸ | ۷,۷۱۸ | ۱۵,۷۵۴ | ۱۰,۰۵۴ |
| آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم ترشحات و رنگ آمیزی (مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و غیره) | # | ۸۰۴۴۲۵ | ۳,۵۹۳ | ۲,۵۱۵ | ۱۱,۲۳۲ | ۸,۷۱۷ | ۵,۸۴۸ | ۳,۳۳۳ | ۶,۸۵۰ | ۴,۳۳۵ |
| آزمایش Hypo Osmotic Swelling (HOS) | #* | ۸۰۴۴۳۰ | ۴۸,۱۴۱ | - | ۱۵۷,۳۰۳ | ۱۵۷,۳۰۳ | ۷۷,۷۵۸ | ۷۷,۷۵۸ | ۹۰,۹۴۷ | ۹۰,۹۴۷ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایش تشخیص پارگی کیسه آب جنین | #* | ۸۰۴۴۳۵ | ۱۰۶,۸۲۰ | - | ۳۷۲,۶۵۵ | ۳۷۲,۶۵۵ | ۱۷۰,۴۹۰ | ۱۷۰,۴۹۰ | ۱۹۸,۹۴۰ | ۱۹۸,۹۴۰ |
| استخراج DNA | # | ۸۰۵۰۰۰ | ۸۵,۱۹۰ | ۵۹,۶۳۰ | ۲۸۵,۳۰۰ | ۲۲۵,۶۷۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | ۷۷,۳۷۰ | ۱۶۰,۱۰۰ | ۱۰۰,۴۷۰ |
| استخراج RNA | # | ۸۰۵۰۰۵ | ۱۲۰,۹۹۰ | ۸۴,۶۹۰ | ۴۱۴,۱۰۰ | ۳۲۹,۴۱۰ | ۱۹۳,۸۰۰ | ۱۰۹,۱۱۰ | ۲۲۶,۳۰۰ | ۱۴۱,۶۱۰ |
| شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLP یا بررسی حذف از طریق PCR یا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا VNTR) یا تعیین جهش با روش PCR | # | ۸۰۵۰۱۰ | ۸۵,۱۹۰ | ۵۹,۶۳۰ | ۲۸۵,۳۰۰ | ۲۲۵,۶۷۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | ۷۷,۳۷۰ | ۱۶۰,۱۰۰ | ۱۰۰,۴۷۰ |
| بررسی متیلاسیون به روش PCR | # | ۸۰۵۰۱۵ | ۳۳,۶۴۵ | ۲۳,۵۵۰ | ۱۱۰,۴۵۰ | ۸۶,۹۰۰ | ۵۴,۳۰۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۳۹,۹۵۰ |
| دات بلات یا اسلات بلات | # | ۸۰۵۰۲۵ | ۱۷۰,۳۸۰ | ۱۱۹,۲۶۰ | ۵۷۰,۶۰۰ | ۴۵۱,۳۴۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۱۵۴,۷۴۰ | ۳۲۰,۲۰۰ | ۲۰۰,۹۴۰ |
| بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از PCR و ساترن بلات یا MLPA | # | ۸۰۵۰۳۰ | ۴۲۱,۶۴۰ | ۲۹۵,۱۳۰ | ۱,۳۸۹,۸۰۰ | ۱,۰۹۴,۶۷۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۷۰ | ۷۹۵,۱۰۰ | ۴۹۹,۹۷۰ |
| بررسی تکرارهای نوکلئوتیدی سه گانه | # | ۸۰۵۰۴۰ | ۲۸۷,۰۶۰ | ۲۰۰,۹۳۰ | ۹۴۸,۰۰۰ | ۷۴۷,۰۷۰ | ۴۶۲,۸۰۰ | ۲۶۱,۸۷۰ | ۵۴۱,۱۰۰ | ۳۴۰,۱۷۰ |
| بررسی تکرارهای ژنومی | # | ۸۰۵۰۴۵ | ۲۴۱,۰۶۱ | ۱۶۸,۷۳۱ | ۷۸۷,۸۰۳ | ۶۱۹,۰۷۲ | ۳۸۹,۳۵۸ | ۲۲۰,۶۲۷ | ۴۵۵,۳۹۷ | ۲۸۶,۶۶۶ |
| تعیین جهش با روش PCR | # | ۸۰۵۰۵۵ | ۵۸,۵۴۹ | ۴۰,۹۸۲ | ۱۹۱,۳۵۹ | ۱۵۰,۳۷۸ | ۹۴,۵۶۶ | ۵۳,۵۸۵ | ۱۱۰,۶۰۵ | ۶۹,۶۲۴ |
| انجام PCR برای ژنتیک پزشکی | # | ۸۰۵۰۵۷ | ۵۸,۳۴۰ | ۴۰,۸۳۵ | ۱۸۸,۷۰۰ | ۱۴۷,۸۶۵ | ۹۴,۴۰۰ | ۵۳,۵۶۵ | ۱۱۰,۴۵۰ | ۶۹,۶۱۵ |
| تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد) | # | ۸۰۵۰۷۰ | ۱۱۸,۸۳۵ | ۸۳,۱۸۰ | ۳۹۵,۷۵۰ | ۳۱۲,۵۷۰ | ۱۹۱,۳۰۰ | ۱۰۸,۱۲۰ | ۲۲۳,۶۰۰ | ۱۴۰,۴۲۰ |
| استفاده از PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا | # | ۸۰۵۰۷۹ | ۵۴۲,۶۳۰ | ۳۷۹,۸۲۰ | ۱,۸۰۳,۹۰۰ | ۱,۴۲۴,۰۸۰ | ۸۷۳,۸۰۰ | ۴۹۳,۹۸۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۰ | ۶۴۱,۵۸۰ |
| استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا | # | ۸۰۵۰۸۰ | ۵۹۲,۰۲۰ | ۴۱۴,۳۹۰ | ۱,۹۶۰,۴۰۰ | ۱,۵۴۶,۰۱۰ | ۹۵۴,۰۰۰ | ۵۳۹,۶۱۰ | ۱,۱۱۵,۳۰۰ | ۷۰۰,۹۱۰ |
| استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار HIV | # | ۸۰۵۰۸۱ | ۵۹۲,۰۲۰ | ۴۱۴,۳۹۰ | ۱,۹۶۰,۴۰۰ | ۱,۵۴۶,۰۱۰ | ۹۵۴,۰۰۰ | ۵۳۹,۶۱۰ | ۱,۱۱۵,۳۰۰ | ۷۰۰,۹۱۰ |
| استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت C | # | ۸۰۵۰۸۲ | ۵۹۲,۰۲۰ | ۴۱۴,۳۹۰ | ۱,۹۶۰,۴۰۰ | ۱,۵۴۶,۰۱۰ | ۹۵۴,۰۰۰ | ۵۳۹,۶۱۰ | ۱,۱۱۵,۳۰۰ | ۷۰۰,۹۱۰ |
| استفاده از PCR کمی برای تعیین بار C MV | # | ۸۰۵۰۸۳ | ۵۴۲,۶۳۰ | ۳۷۹,۸۲۰ | ۱,۸۰۳,۹۰۰ | ۱,۴۲۴,۰۸۰ | ۸۷۳,۸۰۰ | ۴۹۳,۹۸۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۰ | ۶۴۱,۵۸۰ |
| استفاده از PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت B | # | ۸۰۵۰۸۴ | ۵۴۲,۶۳۰ | ۳۷۹,۸۲۰ | ۱,۸۰۳,۹۰۰ | ۱,۴۲۴,۰۸۰ | ۸۷۳,۸۰۰ | ۴۹۳,۹۸۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۰ | ۶۴۱,۵۸۰ |
| RT/PCR کمی برای ژنتیک پزشکی | # | ۸۰۵۰۸۶ | ۵۹۲,۰۲۰ | ۴۱۴,۳۹۰ | ۱,۹۶۰,۴۰۰ | ۱,۵۴۶,۰۱۰ | ۹۵۴,۰۰۰ | ۵۳۹,۶۱۰ | ۱,۱۱۵,۳۰۰ | ۷۰۰,۹۱۰ |
| PCR کیفی برای CMV | # | ۸۰۵۰۹۰ | ۷۶,۲۴۰ | ۵۳,۳۶۵ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۹۹,۷۳۵ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۶۹,۴۳۵ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۹۰,۱۸۵ |
| PCR کیفی برای MTB | # | ۸۰۵۰۹۲ | ۷۶,۲۴۰ | ۵۳,۳۶۵ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۹۹,۷۳۵ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۶۹,۴۳۵ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۹۰,۱۸۵ |
| PCR کیفی برای HBV | # | ۸۰۵۰۹۴ | ۷۶,۲۴۰ | ۵۳,۳۶۵ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۹۹,۷۳۵ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۶۹,۴۳۵ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۹۰,۱۸۵ |
| PCR کیفی برای HSV | # | ۸۰۵۰۹۶ | ۷۶,۲۴۰ | ۵۳,۳۶۵ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۹۹,۷۳۵ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۶۹,۴۳۵ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۹۰,۱۸۵ |
| PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا | # | ۸۰۵۰۹۷ | ۷۶,۲۴۰ | ۵۳,۳۶۵ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۹۹,۷۳۵ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۶۹,۴۳۵ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۹۰,۱۸۵ |
| PCR/RT کیفی برای ویروسهای JC/BK | # | ۸۰۵۰۹۸ | ۷۶,۲۴۰ | ۵۳,۳۶۵ | ۲۵۳,۱۰۰ | ۱۹۹,۷۳۵ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۶۹,۴۳۵ | ۱۴۳,۵۵۰ | ۹۰,۱۸۵ |
| PCR/RT کیفی برای HIV | # | ۸۰۵۱۰۰ | ۱۸۳,۹۷۰ | ۱۲۸,۷۷۰ | ۵۹۸,۳۰۰ | ۴۶۹,۵۳۰ | ۲۹۷,۴۰۰ | ۱۶۸,۶۳۰ | ۳۴۷,۹۰۰ | ۲۱۹,۱۳۰ |
| RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C | # | ۸۰۵۱۰۲ | ۱۸۳,۹۷۰ | ۱۲۸,۷۷۰ | ۵۹۸,۳۰۰ | ۴۶۹,۵۳۰ | ۲۹۷,۴۰۰ | ۱۶۸,۶۳۰ | ۳۴۷,۹۰۰ | ۲۱۹,۱۳۰ |
| RT/PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا | # | ۸۰۵۱۰۴ | ۱۸۳,۹۷۰ | ۱۲۸,۷۷۰ | ۵۹۸,۳۰۰ | ۴۶۹,۵۳۰ | ۲۹۷,۴۰۰ | ۱۶۸,۶۳۰ | ۳۴۷,۹۰۰ | ۲۱۹,۱۳۰ |
| HLAABDR به روش PCR با ۹۶ پرایمر | # | ۸۰۵۱۰۵ | ۸۷۷,۲۵۵ | ۶۱۴,۰۳۵ | ۲,۸۴۸,۸۵۰ | ۲,۲۳۴,۸۱۵ | ۱,۴۱۸,۵۰۰ | ۸۰۴,۴۶۵ | ۱,۶۵۹,۴۵۰ | ۱,۰۴۵,۴۱۵ |
| HLA ABC به روش PCR با ۹۶ پرایمر | #* | ۸۰۵۱۰۶ | ۸۷۷,۲۵۵ | - | ۲,۸۴۸,۸۵۰ | ۲,۸۴۸,۸۵۰ | ۱,۴۱۸,۵۰۰ | ۱,۴۱۸,۵۰۰ | ۱,۶۵۹,۴۵۰ | ۱,۶۵۹,۴۵۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل های DQBI,DQAL,HLA هر یک به تنهایی | # | ۸۰۵۱۰۷ | ۵۹,۶۶۶ | ۴۱,۷۶۴ | ۱۹۵,۵۹۰ | ۱۵۳,۸۲۷ | ۹۶,۳۲۰ | ۵۴,۵۵۷ | ۱۱۲,۶۴۵ | ۷۰,۸۸۲ |
| تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل‌های DRB۳,DRB۲,DRB۱,HLA هر یک به تنهایی | # | ۸۰۵۱۰۸ | ۵۹,۶۶۶ | ۴۱,۷۶۴ | ۱۹۵,۵۹۰ | ۱۵۳,۸۲۷ | ۹۶,۳۲۰ | ۵۴,۵۵۷ | ۱۱۲,۶۴۵ | ۷۰,۸۸۲ |
| جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه‌ها | #* | ۸۰۶۰۰۰ | ۴۵,۶۲۴ | - | ۱۴۳,۸۰۰ | ۱۴۳,۸۰۰ | ۷۴,۱۵۲ | ۷۴,۱۵۲ | ۸۶,۸۳۴ | ۸۶,۸۳۴ |
| آزمایش تشخیصی از لکه‌های خون | #* | ۸۰۶۰۰۵ | ۲۹,۸۶۳ | - | ۹۴,۰۸۷ | ۹۴,۰۸۷ | ۴۸,۵۳۸ | ۴۸,۵۳۸ | ۵۶,۸۴۰ | ۵۶,۸۴۰ |
| آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء | #* | ۸۰۶۰۱۰ | ۱۹۵,۲۵۳ | - | ۶۱۵,۱۵۶ | ۶۱۵,۱۵۶ | ۳۱۷,۳۶۰ | ۳۱۷,۳۶۰ | ۳۷۱,۶۴۲ | ۳۷۱,۶۴۲ |
| آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت | #* | ۸۰۶۰۱۵ | ۱۵۵,۵۵۵ | - | ۴۹۰,۱۳۶ | ۴۹۰,۱۳۶ | ۲۵۲,۸۳۲ | ۲۵۲,۸۳۲ | ۲۹۶,۰۷۶ | ۲۹۶,۰۷۶ |
| آزمایش مواد غذایی برای هر آزمایش | #* | ۸۰۶۰۲۰ | ۳۹,۰۶۸ | - | ۱۲۳,۱۷۸ | ۱۲۳,۱۷۸ | ۶۳,۴۹۲ | ۶۳,۴۹۲ | ۷۴,۳۵۰ | ۷۴,۳۵۰ |
| تعیین گروه خون لکه‌ها و مو و تجسس اسپرم | #* | ۸۰۶۰۲۵ | ۱۹,۳۵۵ | - | ۶۰,۹۴۵ | ۶۰,۹۴۵ | ۳۱,۴۶۲ | ۳۱,۴۶۲ | ۳۶,۸۴۴ | ۳۶,۸۴۴ |
| تشخیص CO در نمونه خون جسد | #* | ۸۰۶۰۳۰ | ۱۹,۳۵۵ | - | ۶۰,۹۴۵ | ۶۰,۹۴۵ | ۳۱,۴۶۲ | ۳۱,۴۶۲ | ۳۶,۸۴۴ | ۳۶,۸۴۴ |
| تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد | #* | ۸۰۶۰۳۵ | ۶۴,۸۰۰ | - | ۲۰۴,۱۰۱ | ۲۰۴,۱۰۱ | ۱۰۵,۳۳۰ | ۱۰۵,۳۳۰ | ۱۲۳,۳۴۷ | ۱۲۳,۳۴۷ |
| تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد | #* | ۸۰۶۰۴۰ | ۶۴,۸۰۰ | - | ۲۰۴,۱۰۱ | ۲۰۴,۱۰۱ | ۱۰۵,۳۳۰ | ۱۰۵,۳۳۰ | ۱۲۳,۳۴۷ | ۱۲۳,۳۴۷ |
| تعیین گروه ABH | #* | ۸۰۶۰۴۵ | ۱۰,۵۰۸ | - | ۳۳,۱۴۲ | ۳۳,۱۴۲ | ۱۷,۰۷۶ | ۱۷,۰۷۶ | ۱۹,۹۹۶ | ۱۹,۹۹۶ |
| بررسی خویشاوندی از طریق بررسی ۱۶ منطقه STR مولکول DNA به ازای هر فرد | #* | ۸۰۶۰۵۰ | ۲۶۸,۷۸۲ | - | ۸۷۳,۳۳۸ | ۸۷۳,۳۳۸ | ۴۳۴,۵۷۲ | ۴۳۴,۵۷۲ | ۵۰۸,۳۸۰ | ۵۰۸,۳۸۰ |
| بررسی خویشاوندی از طریق بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر | #* | ۸۰۶۰۵۵ | ۲۹۵,۸۴۰ | - | ۹۶۱,۱۵۱ | ۹۶۱,۱۵۱ | ۴۷۸,۳۳۰ | ۴۷۸,۳۳۰ | ۵۵۹,۵۷۲ | ۵۵۹,۵۷۲ |
| بررسی خویشاوندی از طریق بررسی YSTR به ازای هر نفر | #* | ۸۰۶۰۶۰ | ۳۴۹,۳۲۸ | - | ۱,۱۳۴,۹۳۵ | ۱,۱۳۴,۹۳۵ | ۵۶۴,۸۱۰ | ۵۶۴,۸۱۰ | ۶۶۰,۷۴۰ | ۶۶۰,۷۴۰ |
| تطبیق نمونه‌ها از طریق DNA Typing به ازای هر نمونه | #* | ۸۰۶۰۶۵ | ۲۶۸,۷۸۲ | - | ۸۷۳,۳۳۸ | ۸۷۳,۳۳۸ | ۴۳۴,۵۷۲ | ۴۳۴,۵۷۲ | ۵۰۸,۳۸۰ | ۵۰۸,۳۸۰ |
| تطبیق نمونه‌ها از طریق Y-STR به ازای هر نمونه | #* | ۸۰۶۰۷۰ | ۳۴۹,۳۲۸ | - | ۱,۱۳۴,۹۳۵ | ۱,۱۳۴,۹۳۵ | ۵۶۴,۸۱۰ | ۵۶۴,۸۱۰ | ۶۶۰,۷۴۰ | ۶۶۰,۷۴۰ |
| تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه | #* | ۸۰۶۰۷۵ | ۱۶۱,۳۱۴ | - | ۵۲۴,۲۰۵ | ۵۲۴,۲۰۵ | ۲۶۰,۸۱۰ | ۲۶۰,۸۱۰ | ۳۰۵,۱۰۵ | ۳۰۵,۱۰۵ |
| تعیین گروه خون لکه و مو | #* | ۸۰۶۰۸۰ | ۲۱,۴۰۴ | - | ۶۹,۵۸۷ | ۶۹,۵۸۷ | ۳۴,۶۰۲ | ۳۴,۶۰۲ | ۴۰,۴۷۸ | ۴۰,۴۷۸ |
| تجسس اسپرم در البسه و سواب‌ها | #* | ۸۰۶۰۸۵ | ۲۱,۴۰۴ | - | ۶۹,۵۸۷ | ۶۹,۵۸۷ | ۳۴,۶۰۲ | ۳۴,۶۰۲ | ۴۰,۴۷۸ | ۴۰,۴۷۸ |
| تعیین گروه خونی اسپرم | #* | ۸۰۶۰۹۰ | ۱۸,۸۹۱ | - | ۶۱,۳۹۵ | ۶۱,۳۹۵ | ۳۰,۵۴۲ | ۳۰,۵۴۲ | ۳۵,۷۲۹ | ۳۵,۷۲۹ |
| آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا | #* | ۸۰۶۰۹۵ | ۱۸,۸۹۱ | - | ۶۱,۳۹۵ | ۶۱,۳۹۵ | ۳۰,۵۴۲ | ۳۰,۵۴۲ | ۳۵,۷۲۹ | ۳۵,۷۲۹ |
| دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل (PADA+FreeBeta) | #* | ۸۰۶۲۰۰ | ۸۳,۰۵۸ | - | ۲۶۹,۷۸۹ | ۲۶۹,۷۸۹ | ۱۳۴,۲۹۸ | ۱۳۴,۲۹۸ | ۱۵۷,۱۰۹ | ۱۵۷,۱۰۹ |
| تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون aFP+Beta) (titer+unconjocated Estriol | #* | ۸۰۶۲۰۵ | ۱۰۶,۷۹۵ | - | ۳۴۶,۹۲۴ | ۳۴۶,۹۲۴ | ۱۷۲,۶۷۶ | ۱۷۲,۶۷۶ | ۲۰۲,۰۰۵ | ۲۰۲,۰۰۵ |
| کوادروپل مارکر برای غربالگری سندروم داون شامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjucated Estriol | #* | ۸۰۶۲۱۰ | ۲۳۴,۰۰۷ | - | ۷۶۰,۳۰۵ | ۷۶۰,۳۰۵ | ۳۷۸,۳۵۰ | ۳۷۸,۳۵۰ | ۴۴۲,۶۱۰ | ۴۴۲,۶۱۰ |
| بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | # | ۸۰۶۵۰۵ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| آلفا تالاسمی/ مرحله اول تعیین وضعیت جنین | # | ۸۰۶۵۰۷ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع ۱و۲ / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | # | ۸۰۶۵۱۵ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| آنمی داسی شکل (Sickle Cell Anemia ) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین | # | ۸۰۶۵۲۵ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| بیماری‌های ناشی از تکرارها(X) شکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین | # | ۸۰۶۵۳۵ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / مرحله دوم تعیین جنسیت | # | ۸۰۶۵۴۵ | ۲۸۳,۴۱۰ | ۱۹۸,۳۶۰ | ۸۲۸,۹۰۰ | ۶۳۰,۵۴۰ | ۴۶۶,۲۰۰ | ۲۶۷,۸۴۰ | ۵۴۷,۲۰۰ | ۳۴۸,۸۴۰ |
| بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / تعیین وضعیت نهایی جنین | # | ۸۰۶۵۵۰ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت | # | ۸۰۶۵۶۰ | ۲۸۳,۴۱۰ | ۱۹۸,۳۶۰ | ۸۲۸,۹۰۰ | ۶۳۰,۵۴۰ | ۴۶۶,۲۰۰ | ۲۶۷,۸۴۰ | ۵۴۷,۲۰۰ | ۳۴۸,۸۴۰ |
| بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی جنین | # | ۸۰۶۵۶۵ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| PKU مرحله دوم | # | ۸۰۶۵۷۵ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها | #* | ۸۰۶۵۸۰ | ۸۷۶,۷۵۰ | - | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ |
| پذیرش نمونه‌های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن | # | ۸۰۷۰۰۰ | ۳,۷۵۹ | ۲,۶۳۱ | ۱۳,۵۲۴ | ۱۰,۸۹۳ | ۵,۹۶۴ | ۳,۳۳۳ | ۶,۹۵۱ | ۴,۳۲۰ |
| سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه‌های حاصل از گردن رحم یا واژن | # | ۸۰۷۰۰۵ | ۳۳,۵۶۲ | ۲۳,۴۸۹ | ۹۲,۱۳۵ | ۶۸,۶۴۶ | ۵۵,۷۳۰ | ۳۲,۲۴۱ | ۶۵,۵۳۰ | ۴۲,۰۴۱ |
| سیتوپاتولوژی، پزشکی قانونی (مانند اسپرم) | # | ۸۰۷۰۱۰ | ۱۷,۳۲۰ | ۱۲,۱۲۲ | ۵۰,۶۵۵ | ۳۸,۵۳۳ | ۲۸,۴۹۰ | ۱۶,۳۶۸ | ۳۳,۴۴۰ | ۲۱,۳۱۸ |
| تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار (Barr Bodies) | # | ۸۰۷۰۱۵ | ۱۷,۹۴۹ | ۱۲,۵۶۳ | ۵۲,۴۹۷ | ۳۹,۹۳۴ | ۲۹,۵۲۶ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۴,۶۵۶ | ۲۲,۰۹۳ |
| تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی، Drumsticks در PMN | # | ۸۰۷۰۲۰ | ۱۶,۳۷۵ | ۱۱,۴۶۱ | ۴۷,۸۹۲ | ۳۶,۴۳۱ | ۲۶,۹۳۶ | ۱۵,۴۷۵ | ۳۱,۶۱۶ | ۲۰,۱۵۵ |
| سیتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم یا واژینال، تا ۳ اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی (نظیرIndex Estrogenic وKaryopynotic Maturation Index ) | # | ۸۰۷۰۲۶ | ۲۴,۷۶۱ | ۱۷,۳۳۰ | ۷۰,۰۱۰ | ۵۲,۶۸۰ | ۴۰,۹۴۰ | ۲۳,۶۱۰ | ۴۸,۱۰۰ | ۳۰,۷۷۰ |
| Pap Liquid Based Smear | #* | ۸۰۷۰۲۷ | ۴۹,۳۹۰ | - | ۱۵۶,۵۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰ | ۸۰,۲۰۰ | ۸۰,۲۰۰ | ۹۳,۹۰۰ | ۹۳,۹۰۰ |
| سیتوپاتولوژی نمونه ادرار | # | ۸۰۷۰۳۵ | ۳۳,۵۶۲ | ۲۳,۴۸۹ | ۹۲,۱۳۵ | ۶۸,۶۴۶ | ۵۵,۷۳۰ | ۳۲,۲۴۱ | ۶۵,۵۳۰ | ۴۲,۰۴۱ |
| بررسی میکروسکوپی و گزارش (FNA) | # | ۸۰۷۰۴۵ | ۹۸,۳۸۰ | ۶۸,۸۵۱ | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۷۹,۱۲۹ | ۱۶۵,۲۸۰ | ۹۶,۴۲۹ | ۱۹۴,۷۷۰ | ۱۲۵,۹۱۹ |
| بررسی میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان و گزارش آن | # | ۸۰۷۰۵۰ | ۸۱,۲۱۰ | ۵۶,۸۳۵ | ۲۰۷,۴۰۰ | ۱۵۰,۵۶۵ | ۱۳۶,۲۰۰ | ۷۹,۳۶۵ | ۱۶۰,۴۵۰ | ۱۰۳,۶۱۵ |
| بررسی میکروسکوپی نمونه های بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان (با یا بدون سل بلاک) و گزارش آن | # | ۸۰۷۰۵۵ | ۱۰۳,۷۵۰ | ۷۲,۶۱۰ | ۲۶۷,۳۰۰ | ۱۹۴,۶۹۰ | ۱۷۳,۸۰۰ | ۱۰۱,۱۹۰ | ۲۰۴,۷۰۰ | ۱۳۲,۰۹۰ |
| عمل دی کلسیفیکاسیون | # | ۸۰۷۰۹۰ | ۲,۷۴۸ | ۱,۹۲۳ | ۷,۵۵۵ | ۵,۶۳۲ | ۴,۵۶۲ | ۲,۶۳۹ | ۵,۳۶۴ | ۳,۴۴۱ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۱ برای میکروارگانیزم‌ها (مانندگریدلی، اسیدفست و متنامین سیلور) | # | ۸۰۷۰۹۵ | ۷,۲۴۳ | ۵,۰۶۹ | ۲۱,۱۸۳ | ۱۶,۱۱۴ | ۱۱,۹۱۴ | ۶,۸۴۵ | ۱۳,۹۸۴ | ۸,۹۱۵ |
| رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۲ رنگ آمیزی‌های دیگر (مانند آهن و تری‌کروم) | # | ۸۰۷۱۰۰ | ۷,۲۴۳ | ۵,۰۶۹ | ۲۱,۱۸۳ | ۱۶,۱۱۴ | ۱۱,۹۱۴ | ۶,۸۴۵ | ۱۳,۹۸۴ | ۸,۹۱۵ |
| هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی (مانند مس و روی) | # | ۸۰۷۱۰۵ | ۷,۲۴۳ | ۵,۰۶۹ | ۲۱,۱۸۳ | ۱۶,۱۱۴ | ۱۱,۹۱۴ | ۶,۸۴۵ | ۱۳,۹۸۴ | ۸,۹۱۵ |
| هیستوشیمی یا سیتوشیمی برای تعیین آنزیم‌های تشکیل‌دهنده؛ هر یک | # | ۸۰۷۱۱۰ | ۷,۲۴۳ | ۵,۰۶۹ | ۲۱,۱۸۳ | ۱۶,۱۱۴ | ۱۱,۹۱۴ | ۶,۸۴۵ | ۱۳,۹۸۴ | ۸,۹۱۵ |
| رنگ‌آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس DNA به روشFlow و IMAG E | # | ۸۰۷۱۱۵ | ۴۰,۶۲۲ | ۲۸,۴۳۲ | ۱۱۸,۸۰۹ | ۹۰,۳۷۷ | ۶۶,۸۲۲ | ۳۸,۳۹۰ | ۷۸,۴۳۲ | ۵۰,۰۰۰ |
| مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند | # | ۸۰۷۱۲۰ | ۶۱,۱۵۵ | ۴۲,۷۹۵ | ۱۲۴,۶۵۰ | ۸۱,۸۵۵ | ۱۰۵,۳۰۰ | ۶۲,۵۰۵ | ۱۲۴,۶۵۰ | ۸۱,۸۵۵ |
| مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند | # | ۸۰۷۱۲۵ | ۱۱۰,۵۴۵ | ۷۷,۳۶۵ | ۲۸۱,۱۵۰ | ۲۰۳,۷۸۵ | ۱۸۵,۵۰۰ | ۱۰۸,۱۳۵ | ۲۱۸,۵۵۰ | ۱۴۱,۱۸۵ |
| فروزن سکشن و مشاوره در اتاق عمل | # | ۸۰۷۱۳۰ | ۱۵۵,۲۶۰ | ۱۰۸,۶۵۸ | ۳۸۹,۰۴۰ | ۲۸۰,۳۸۲ | ۲۶۱,۰۴۰ | ۱۵۲,۳۸۲ | ۳۰۷,۶۶۰ | ۱۹۹,۰۰۲ |
| ایمونوهیستوشیمی (شامل ایمونوپراکسید از بافتی)، هر آنتی‌بادی | # | ۸۰۷۱۳۵ | ۷۷,۱۳۳ | ۵۳,۹۸۲ | ۱۹۹,۰۹۰ | ۱۴۵,۱۰۸ | ۱۲۹,۱۸۰ | ۷۵,۱۹۸ | ۱۵۲,۱۴۰ | ۹۸,۱۵۸ |
| مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هرآنتی بادی، روش مستقیم (ایمنو هیستوشیمی) | # | ۸۰۷۱۴۰ | ۶۴,۴۰۵ | ۴۵,۰۷۶ | ۱۷۸,۷۳۰ | ۱۳۳,۶۵۴ | ۱۰۶,۷۸۰ | ۶۱,۷۰۴ | ۱۲۵,۵۲۰ | ۸۰,۴۴۴ |
| مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی‌بادی، روش غیرمستقیم (ایمنو هیستوشیمی) | # | ۸۰۷۱۴۵ | ۳۹,۳۶۳ | ۲۷,۵۵۰ | ۱۱۵,۱۲۵ | ۸۷,۵۷۵ | ۶۴,۷۵۰ | ۳۷,۲۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | ۴۸,۴۵۰ |
| میکروسکوپ الکترونی، تشخیص | # | ۸۰۷۱۵۰ | ۱۹۷,۵۶۰ | ۱۳۸,۲۸۰ | ۶۲۶,۰۰۰ | ۴۸۷,۷۲۰ | ۳۲۰,۸۰۰ | ۱۸۲,۵۲۰ | ۳۷۵,۶۰۰ | ۲۳۷,۳۲۰ |
| میکروسکوپ الکترونی، اسکنینگ | # | ۸۰۷۱۵۵ | ۲۴۶,۹۵۰ | ۱۷۲,۸۵۰ | ۷۸۲,۵۰۰ | ۶۰۹,۶۵۰ | ۴۰۱,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۵۰ | ۴۶۹,۵۰۰ | ۲۹۶,۶۵۰ |
| سطح ۱- آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت | # | ۸۰۷۱۶۰ | ۶,۲۹۸ | ۴,۴۰۸ | ۱۸,۴۲۰ | ۱۴,۰۱۲ | ۱۰,۳۶۰ | ۵,۹۵۲ | ۱۲,۱۶۰ | ۷,۷۵۲ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فورسکین (پره پوس)، به جز نوزاد | # | ۸۰۷۱۶۱ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: واریکوسل | # | ۸۰۷۱۶۲ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، به جز عقیمی | # | ۸۰۷۱۶۳ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ورید، واریکوزیتی | # | ۸۰۷۱۶۴ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لوله فالوپ، عقیم سازی | # | ۸۰۷۱۶۵ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، تروماتیک | # | ۸۰۷۱۶۶ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فوراسکین (پره پوس)، نوزاد | # | ۸۰۷۱۶۷ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساک فتق، درمحل | # | ۸۰۷۱۶۸ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساک هیدروسل | # | ۸۰۷۱۶۹ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پوست، ترمیم پلاستیک | # | ۸۰۷۱۷۰ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون سمپاتیک | # | ۸۰۷۱۷۱ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بیضه ها، اخته کردن (کاستراسیون) | # | ۸۰۷۱۷۲ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مخاط واژن، تصادف | # | ۸۰۷۱۷۳ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، عقیم سازی | # | ۸۰۷۱۷۴ | ۳۰,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۸۲,۹۲۵ | ۶۱,۶۴۰ | ۵۰,۵۵۰ | ۲۹,۲۶۵ | ۵۹,۴۵۰ | ۳۸,۱۶۵ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سقط، القایی | # | ۸۰۷۱۸۰ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آبسه | # | ۸۰۷۱۸۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آنوریسم-شریانی/ بطنی | # | ۸۰۷۱۸۲ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آنوس(مقعد)، تگ(زائده) | # | ۸۰۷۱۸۳ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آپاندیس | # | ۸۰۷۱۸۴ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شریان، پلاک آتروماتوس | # | ۸۰۷۱۸۵ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کیست غدد بارتولن | # | ۸۰۷۱۸۶ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بورسا، کیست | # | ۸۰۷۱۸۷ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت کارپال تانل | # | ۸۰۷۱۸۸ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: غضروف، تراشیدن | # | ۸۰۷۱۸۹ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلسته آتوما | # | ۸۰۷۱۹۰ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ملتحمه، بیوپسی | # | ۸۰۷۱۹۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: قرنیه | # | ۸۰۷۱۹۲ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت کالنژن کبد دمومئت بد | # | ۸۰۷۱۹۳ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فمور، به جز شکستگی | # | ۸۰۷۱۹۴ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شقاق(فیسور)/فیستول | # | ۸۰۷۱۹۵ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کیسه صفرا | # | ۸۰۷۱۹۷ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون کیست | # | ۸۰۷۱۹۸ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هماتوم | # | ۸۰۷۱۹۹ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هموروئید | # | ۸۰۷۲۰۰ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هیداتید مورگاگنی | # | ۸۰۷۲۰۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: دیسک بین مهره ای | # | ۸۰۷۲۰۲ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مفصل، لوزبادی | # | ۸۰۷۲۰۳ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: نوروما-مورتون/تروماتیک | # | ۸۰۷۲۰۴ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سینوس/کیست پایلونیدال | # | ۸۰۷۲۰۵ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پولیپ، التهابی-بینی/سینوس | # | ۸۰۷۲۰۶ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت نرم، دبریدمان | # | ۸۰۷۲۰۷ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اسپرماتوسل | # | ۸۰۷۲۰۸ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: تاندون/تاندون شیت(غلاف) | # | ۸۰۷۲۰۹ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: زائده بیضه | # | ۸۰۷۲۱۰ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ترومبوس یا آمبولی | # | ۸۰۷۲۱۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لوزه و/یا آدنوئید | # | ۸۰۷۲۱۲ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سقط-خودبخود/فراموش شده | # | ۸۰۷۲۱۶ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شریان، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۱۷ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اگزوستوز استخوان | # | ۸۰۷۲۱۸ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیون، ترماتیک | # | ۸۰۷۲۱۹ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لیومیوم، میومکتومی رحمی-بدون رحم | # | ۸۰۷۲۲۰ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جفت، به جز سه ماهه سوم | # | ۸۰۷۲۲۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۳۹,۶۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۰۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۰ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پستان، ماموپلاستی کاهنده | # | ۸۰۷۲۳۱ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: برونش، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۲ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سرویکس، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۳ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: کولون، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۴ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: دئودونوم، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۵ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: آندوسرویکس، کورتاژ/بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۶ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: آندومتر، کورتاژ/بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۷ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مری، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۳۸ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لوله فالوپ، حاملگی نابجا و یا تشخیصی | # | ۸۰۷۲۳۹ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سرفمور، شکستگی | # | ۸۰۷۲۴۰ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک | # | ۸۰۷۲۴۱ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لثه/مخاط دهان، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۴۲ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: دریچه قلب | # | ۸۰۷۲۴۳ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مفصل، رزکسیون | # | ۸۰۷۲۴۴ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حنجره، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۴۵ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لب، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج) | # | ۸۰۷۲۴۶ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ریه، بیوپسی ترانس برونشیال | # | ۸۰۷۲۴۷ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مخاط بینی، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۴۸ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: نازوفارنکس/اوروفارنکس، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۴۹ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ادنتوژنتیک / دنتال سیست | # | ۸۰۷۲۵۰ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: امنتوم (چادرینه)، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۵۱ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان همراه یا بدون لوله، غیر نئوپلاستیک | # | ۸۰۷۲۵۲ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج) | # | ۸۰۷۲۵۳ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده پاراتیروئید | # | ۸۰۷۲۵۴ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پریتوان(صفاق)، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۵۵ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تومور هیپوفیز | # | ۸۰۷۲۵۶ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پلور/پریکارد- بیوپسی/بافت | # | ۸۰۷۲۵۷ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پولیپ، سرویکال/آندومتریال | # | ۸۰۷۲۵۸ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پولیپ، معده/روده کوچک | # | ۸۰۷۲۵۹ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، بیوپسی سوزنی | # | ۸۰۷۲۶۰ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، تی یوآر(TUR) | # | ۸۰۷۲۶۱ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده بزاقی، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۶۲ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سینوس، پارانازال بیوپسی | # | ۸۰۷۲۶۳ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: روده کوچک، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۶۴ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: بافت نرم، به جز تومور/توده/لیپوم/دبریدمان | # | ۸۰۷۲۶۵ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: طحال | # | ۸۰۷۲۶۶ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: معده، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۶۷ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سینوویوم | # | ۸۰۷۲۶۸ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: بیضه، به جز تومور/ بیوپسی/اخته کردن(کاستراسیون) | # | ۸۰۷۲۶۹ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مجرای تیروگلوس/کیست شکاف برانکیال | # | ۸۰۷۲۷۰ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: زبان، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۱ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لوزه، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۲ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: نای(تراشه)، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۳ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حالب، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۴ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: اورترا(مجرای ادرار)، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۵ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۶ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: واژن، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۷ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: وولوا/لابیا، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۷۸ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: چشم، انوکلیشن | # | ۸۰۷۲۷۹ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ریه، بیوپسی گوه ای(وج) | # | ۸۰۷۲۸۰ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: میوکارد، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۸۱ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تومور ادونتوژنیک | # | ۸۰۷۲۸۲ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان با یا بدون لوله، نئوپلاستیک | # | ۸۰۷۲۸۳ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پانکراس بیوپسی | # | ۸۰۷۲۸۴ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: جفت، سه ماهه سوم | # | ۸۰۷۲۸۵ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، به جز رزکسیون رادیکال | # | ۸۰۷۲۸۶ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده بزاقی | # | ۸۰۷۲۸۷ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: روده کوچک، رزکسیون، به جز تومور | # | ۸۰۷۲۸۸ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: توده بافت نرم(به جز لیپوم)- بیوپسی / (اکسیژن) برداشتن ساده | # | ۸۰۷۲۸۹ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تیروئید، توتال/لوب | # | ۸۰۷۲۹۰ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حالب، رزکسیون | # | ۸۰۷۲۹۱ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، تی.یو.آر (TUR) | # | ۸۰۷۲۹۲ | ۱۱۷,۳۴۰ | ۸۲,۱۲۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۸۸۰ | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۱۵,۰۸۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلیه، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۹۵ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لنف نود، بیوپسی | # | ۸۰۷۲۹۶ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پوست | # | ۸۰۷۲۹۹ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: استخوان، بیوپسی یا کورتاژ | # | ۸۰۷۳۰۰ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مغز، بیوپسی | # | ۸۰۷۳۰۱ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مغز/مننژ، رزکسیون تومور | # | ۸۰۷۳۰۲ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، ماستکتومی-پارشیال/ساده | # | ۸۰۷۳۰۳ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سرویکس، کونیزاسیون(برداشتن مخاطی) | # | ۸۰۷۳۰۴ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک | # | ۸۰۷۳۰۵ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کبد، بیوپسی-سوزنی/گوه ای(وج) | # | ۸۰۷۳۰۶ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مدیاستن، توده ای | # | ۸۰۷۳۰۷ | ۱۴۸,۸۳۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۴۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۰ | ۲۹۳,۲۰۰ | ۱۸۹,۰۴۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آدرنال، رزکسیون | # | ۸۰۷۳۱۰ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلیه، نفروکتومی توتال/پارشیال | # | ۸۰۷۳۱۲ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: حنجره، پارشیال/توتال رزکسیون | # | ۸۰۷۳۱۳ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کبد، رزکسیون پارشیال | # | ۸۰۷۳۱۴ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لنف نود، رزکسیون رژیونال | # | ۸۰۷۳۱۵ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: رزکسیون استخوان | # | ۸۰۷۳۱۷ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، ماستکتومی، به همراه عقده های لنفاوی ناحیه | # | ۸۰۷۳۱۸ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کولون، رزکسیون سگمنتال به علت تومور | # | ۸۰۷۳۱۹ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کولون، رزکسیون توتال | # | ۸۰۷۳۲۰ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مری، رزکسیون پارشیال/توتال | # | ۸۰۷۳۲۱ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اندامها، دیس آرتیکولاسیون | # | ۸۰۷۳۲۲ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جنین، با دیسکسیون | # | ۸۰۷۳۲۳ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: حلق، رزکسیون پارشیال/توتال به همراه عقده های لنفاوی ناحیه | # | ۸۰۷۳۲۴ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ریه، رزکسیون توتال/لوب/سگمنت | # | ۸۰۷۳۲۵ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پانکراس، رزکسیون توتال/ساب توتال | # | ۸۰۷۳۲۶ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پروستات، رزکسیون رادیکال | # | ۸۰۷۳۲۷ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: روده باریک، رزکسیون به علت تومور | # | ۸۰۷۳۲۸ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: تومور بافت نرم، رزکسیون به علت تومور | # | ۸۰۷۳۲۹ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: معده، رزکسیون ساب توتال | # | ۸۰۷۳۳۰ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بیضه، تومور | # | ۸۰۷۳۳۱ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: زبان/لوزه- رزکسیون به علت تومور | # | ۸۰۷۳۳۲ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مثانه، رزکسیون پارشیال/توتال | # | ۸۰۷۳۳۳ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح ۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: رحم، با یا بدون لوله و تخمدانها | # | ۸۰۷۳۳۴ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وولوا، رزکسیون توتال/ساب توتال | # | ۸۰۷۳۳۵ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح ۶-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عضله، بیوپسی | # | ۸۰۷۳۳۹ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| سطح ۶-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عصب، بیوپسی تشخیص مدیکال | # | ۸۰۷۳۴۱ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۴۴۱,۲۵۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲۸۴,۷۵۰ |
| تشخیص تخمک از مایع فولیکولی | #* | ۸۰۹۰۱۵ | ۹۴,۴۷۰ | - | ۲۷۶,۳۰۰ | ۲۷۶,۳۰۰ | ۱۵۵,۴۰۰ | ۱۵۵,۴۰۰ | ۱۸۲,۴۰۰ | ۱۸۲,۴۰۰ |
| آماده سازی جنین برای انتقال با هر روش | #* | ۸۰۹۰۲۰ | ۷۸,۷۲۵ | - | ۲۳۰,۲۵۰ | ۲۳۰,۲۵۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
| تشخیص اسپرم از آسپیراسیون اپیدیدیم | #* | ۸۰۹۰۲۵ | ۷۴,۰۸۵ | - | ۲۳۴,۷۵۰ | ۲۳۴,۷۵۰ | ۱۲۰,۳۰۰ | ۱۲۰,۳۰۰ | ۱۴۰,۸۵۰ | ۱۴۰,۸۵۰ |
| انجماد جنین و تخمک تا سه جنین | #* | ۸۰۹۰۳۰ | ۲۳۸,۳۳۰ | - | ۷۰۹,۱۰۰ | ۷۰۹,۱۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | ۴۵۸,۷۰۰ | ۴۵۸,۷۰۰ |
| انجماد جنین و تخمک بیش از سه جنین | #* | ۸۰۹۰۳۵ | ۴۰۴,۴۰۰ | - | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۵۰۰ | ۷۷۳,۵۰۰ |
| انجماد اسپرم | #* | ۸۰۹۰۴۰ | ۱۱۲,۳۷۰ | - | ۳۴۰,۷۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ |
| آماده سازی اسپرم با روش ساده | #* | ۸۰۹۰۴۵ | ۸۳,۰۳۵ | - | ۲۶۶,۹۵۰ | ۲۶۶,۹۵۰ | ۱۳۴,۵۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰ | ۱۵۷,۴۰۰ | ۱۵۷,۴۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آماده سازی اسپرم با روش کمپلکس (گرادینت) | #* | ۸۰۹۰۵۰ | ۱۱۲,۳۷۰ | - | ۳۴۰,۷۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ |
| تشخیص اسپرم از بافت بیضه (تازه و منجمد) | #* | ۸۰۹۰۵۵ | ۱۳۰,۲۷۰ | - | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ |
| کشت تخمک و جنین | #* | ۸۰۹۰۶۰ | ۹۶,۶۲۵ | - | ۲۹۴,۶۵۰ | ۲۹۴,۶۵۰ | ۱۵۷,۹۰۰ | ۱۵۷,۹۰۰ | ۱۸۵,۱۰۰ | ۱۸۵,۱۰۰ |
| کشت IVM (In Vitro Maturation) | #* | ۸۰۹۰۶۱ | ۶۲,۹۸۰ | - | ۱۸۴,۲۰۰ | ۱۸۴,۲۰۰ | ۱۰۳,۶۰۰ | ۱۰۳,۶۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰ |
| هچینگ جنین | #* | ۸۰۹۰۶۲ | ۴۷,۲۳۵ | - | ۱۳۸,۱۵۰ | ۱۳۸,۱۵۰ | ۷۷,۷۰۰ | ۷۷,۷۰۰ | ۹۱,۲۰۰ | ۹۱,۲۰۰ |
| Co-Culture تخمک یا جنین | #* | ۸۰۹۰۶۳ | ۱۱۲,۳۷۰ | - | ۳۴۰,۷۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ |
| بررسی حرکت و موتیلیتی اسپرم در هیالورونیک اسید | #* | ۸۰۹۰۶۵ | ۲۳,۶۱۸ | - | ۶۹,۰۷۵ | ۶۹,۰۷۵ | ۳۸,۸۵۰ | ۳۸,۸۵۰ | ۴۵,۶۰۰ | ۴۵,۶۰۰ |
| آنالیز اسپرم با روش کروگی | #* | ۸۰۹۰۷۰ | ۲۳,۶۱۸ | - | ۶۹,۰۷۵ | ۶۹,۰۷۵ | ۳۸,۸۵۰ | ۳۸,۸۵۰ | ۴۵,۶۰۰ | ۴۵,۶۰۰ |
| آنالیز اسپرم حاصل از RE | #* | ۸۰۹۰۷۵ | ۲۳,۶۱۸ | - | ۶۹,۰۷۵ | ۶۹,۰۷۵ | ۳۸,۸۵۰ | ۳۸,۸۵۰ | ۴۵,۶۰۰ | ۴۵,۶۰۰ |
| انجماد بافت بیضه | #* | ۸۰۹۰۸۰ | ۲۲۴,۷۴۰ | - | ۶۸۱,۴۰۰ | ۶۸۱,۴۰۰ | ۳۶۷,۶۰۰ | ۳۶۷,۶۰۰ | ۴۳۱,۰۰۰ | ۴۳۱,۰۰۰ |
| ذخیره سازی جنین برای یکسال | #* | ۸۰۹۰۸۵ | ۶۷,۲۹۰ | - | ۲۲۰,۹۰۰ | ۲۲۰,۹۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ |
| ذخیره سازی اسپرم و SEX به مدت یکسال | #* | ۸۰۹۰۹۰ | ۶۷,۲۹۰ | - | ۲۲۰,۹۰۰ | ۲۲۰,۹۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ |
| ذخیره سازی بافت تولید مثلی (بیضه و تخمدان) | #* | ۸۰۹۰۹۵ | ۶۷,۲۹۰ | - | ۲۲۰,۹۰۰ | ۲۲۰,۹۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ |
| ذخیره سازی تخمک برای یکسال | #* | ۸۰۹۱۰۰ | ۶۷,۲۹۰ | - | ۲۲۰,۹۰۰ | ۲۲۰,۹۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۰۸,۶۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰ |
| ذوب جنین | #* | ۸۰۹۱۰۵ | ۲۴۶,۹۵۰ | - | ۷۸۲,۵۰۰ | ۷۸۲,۵۰۰ | ۴۰۱,۰۰۰ | ۴۰۱,۰۰۰ | ۴۶۹,۵۰۰ | ۴۶۹,۵۰۰ |
| ذوب اسپرم و یا مایع منی | #* | ۸۰۹۱۱۰ | ۱۳۴,۵۸۰ | - | ۴۴۱,۸۰۰ | ۴۴۱,۸۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰ | ۲۱۷,۲۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ |
| ذوب بافت بیضه و تخمدان | #* | ۸۰۹۱۱۵ | ۳۲۷,۸۳۰ | - | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۶۲۴,۲۰۰ | ۶۲۴,۲۰۰ |
| ذوب بافت بیضه یا اسپرم | #* | ۸۰۹۱۲۰ | ۱۶۶,۰۷۰ | - | ۵۳۳,۹۰۰ | ۵۳۳,۹۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰ | ۳۱۴,۸۰۰ | ۳۱۴,۸۰۰ |
| ذوب تخمک | #* | ۸۰۹۱۲۵ | ۲۴۲,۶۴۰ | - | ۷۴۵,۸۰۰ | ۷۴۵,۸۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۴۶۴,۱۰۰ | ۴۶۴,۱۰۰ |
| انجماد بافت تخمدان | #* | ۸۰۹۱۳۰ | ۶۹۷,۷۵۰ | - | ۱,۹۸۰,۵۰۰ | ۱,۹۸۰,۵۰۰ | ۱,۱۵۳,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۰۰۰ | ۱,۳۵۴,۵۰۰ | ۱,۳۵۴,۵۰۰ |
| پروسه میکروانجکشن تخمک برای هر بیمار | #* | ۸۰۹۱۹۶ | ۱۱۲,۳۷۰ | - | ۳۴۰,۷۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ |
| پروسه تلقیح آزمایشگاهی و باروری تخمک برای هر بیمار | #* | ۸۰۹۱۹۷ | ۷۸,۷۲۵ | - | ۲۳۰,۲۵۰ | ۲۳۰,۲۵۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ |
| تشخیص اسپرم از بافت بیضه به روش میکروسکوپی (Micro TESE) | #* | ۸۰۹۱۹۸ | ۴۷,۲۳۵ | - | ۱۳۸,۱۵۰ | ۱۳۸,۱۵۰ | ۷۷,۷۰۰ | ۷۷,۷۰۰ | ۹۱,۲۰۰ | ۹۱,۲۰۰ |
| بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی | #* | ۸۱۰۰۰۰ | ۱۳۰,۲۷۰ | - | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ |
| بررسی فاکتور۲ (Prothrombin G۲۰۲۱۰A) به تنهایی | #* | ۸۱۰۰۰۲ | ۱۳۰,۲۷۰ | - | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ |
| بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی | #* | ۸۱۰۰۰۴ | ۱۳۰,۲۷۰ | - | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ |
| نقص آلفا ۱ – آنتی ترپیسین | #* | ۸۱۰۰۰۶ | ۱۳۰,۲۷۰ | - | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ |
| بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر | #* | ۸۱۰۰۰۸ | ۱۳۰,۲۷۰ | - | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ |
| بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK۲، BRAF و ...)(بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی) | # | ۸۱۰۰۲۰ | ۱۷۹,۶۶۰ | - | ۵۶۱,۶۰۰ | ۵۶۱,۶۰۰ | ۲۹۲,۴۰۰ | ۲۹۲,۴۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ |
| بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور V، فاکتور II، MTHFR C۶۷۷T، MTFR A۱۲۹۸C، PAI-۱ و .... تا سقف ده موتاسیون در یک پانل) | #* | ۸۱۰۰۲۲ | ۳۲۷,۸۳۰ | - | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۶۲۴,۲۰۰ | ۶۲۴,۲۰۰ |
| بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF | # | ۸۱۰۰۲۴ | ۴۹۸,۲۱۰ | ۳۴۸,۷۲۰ | ۱,۶۰۱,۷۰۰ | ۱,۲۵۲,۹۸۰ | ۸۰۷,۰۰۰ | ۴۵۸,۲۸۰ | ۹۴۴,۴۰۰ | ۵۹۵,۶۸۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی (HFE) | # | ۸۱۰۰۲۶ | ۱۷۹,۶۶۰ | ۱۲۵,۷۵۰ | ۵۶۱,۶۰۰ | ۴۳۵,۸۵۰ | ۲۹۲,۴۰۰ | ۱۶۶,۶۵۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۲۱۶,۷۵۰ |
| بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y | # | ۸۱۰۰۲۸ | ۴۹۸,۲۱۰ | ۳۴۸,۷۲۰ | ۱,۶۰۱,۷۰۰ | ۱,۲۵۲,۹۸۰ | ۸۰۷,۰۰۰ | ۴۵۸,۲۸۰ | ۹۴۴,۴۰۰ | ۵۹۵,۶۸۰ |
| بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسی) | #* | ۸۱۰۰۳۰ | ۱۳۰,۲۷۰ | - | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ | ۲۴۸,۶۰۰ |
| بررسی سایر پانل های دارای ۲ تا ۱۰ واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت | #* | ۸۱۰۰۳۲ | ۳۲۷,۸۳۰ | - | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۶۲۴,۲۰۰ | ۶۲۴,۲۰۰ |
| بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی | #* | ۸۱۰۰۳۴ | ۴۱۷,۳۳۰ | - | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۷۸۹,۷۰۰ | ۷۸۹,۷۰۰ |
| بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی | #* | ۸۱۰۰۳۶ | ۴۱۷,۳۳۰ | - | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۷۸۹,۷۰۰ | ۷۸۹,۷۰۰ |
| بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز NRAS، KRAS، EGFR) | #* | ۸۱۰۰۵۰ | ۲۶۴,۸۵۰ | - | ۸۴۶,۹۰۰ | ۸۴۶,۹۰۰ | ۴۲۹,۴۰۰ | ۴۲۹,۴۰۰ | ۵۰۲,۶۰۰ | ۵۰۲,۶۰۰ |
| بررسی موتاسیون های KRAS | # | ۸۱۰۰۵۲ | ۲۶۴,۸۵۰ | ۱۸۵,۳۸۰ | ۸۴۶,۹۰۰ | ۶۶۱,۵۲۰ | ۴۲۹,۴۰۰ | ۲۴۴,۰۲۰ | ۵۰۲,۶۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰ |
| بررسی موتاسیون های NRAS | # | ۸۱۰۰۵۴ | ۲۶۴,۸۵۰ | ۱۸۵,۳۸۰ | ۸۴۶,۹۰۰ | ۶۶۱,۵۲۰ | ۴۲۹,۴۰۰ | ۲۴۴,۰۲۰ | ۵۰۲,۶۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰ |
| بررسی موتاسیون های ALK | # | ۸۱۰۰۵۶ | ۲۶۴,۸۵۰ | ۱۸۵,۳۸۰ | ۸۴۶,۹۰۰ | ۶۶۱,۵۲۰ | ۴۲۹,۴۰۰ | ۲۴۴,۰۲۰ | ۵۰۲,۶۰۰ | ۳۱۷,۲۲۰ |
| بررسی موتاسیون های EGFR | # | ۸۱۰۰۵۸ | ۳۲۷,۸۳۰ | ۲۲۹,۴۶۰ | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۸۰۱,۶۴۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۴۰ | ۶۲۴,۲۰۰ | ۳۹۴,۷۴۰ |
| بررسی موتاسیون با روش کمی | #* | ۸۱۰۰۶۰ | ۶۵۵,۶۶۰ | - | ۲,۰۶۲,۲۰۰ | ۲,۰۶۲,۲۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۴۰۰ | ۱,۲۴۸,۴۰۰ |
| بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون | # | ۸۱۰۰۶۲ | ۳۰۹,۹۳۰ | ۲۱۶,۹۳۰ | ۹۶۶,۷۰۰ | ۷۴۹,۷۷۰ | ۵۰۴,۶۰۰ | ۲۸۷,۶۷۰ | ۵۹۱,۱۰۰ | ۳۷۴,۱۷۰ |
| سایر موارد گروه سه (بررسی بیش از یک واریانت سوماتیک (همانند موتاسیون ژن های سرطانی) یا ترانسلوکاسیون در سرطان های خون و یاآزمایشاتی که از طریق PCR کمی انجام می شود) | #* | ۸۱۰۰۶۴ | ۲۶۴,۸۵۰ | - | ۸۴۶,۹۰۰ | ۸۴۶,۹۰۰ | ۴۲۹,۴۰۰ | ۴۲۹,۴۰۰ | ۵۰۲,۶۰۰ | ۵۰۲,۶۰۰ |
| بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۰۸۰ | ۳۲۷,۸۳۰ | ۲۲۹,۴۶۰ | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۸۰۱,۶۴۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۴۰ | ۶۲۴,۲۰۰ | ۳۹۴,۷۴۰ |
| بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۰۸۲ | ۳۲۷,۸۳۰ | ۲۲۹,۴۶۰ | ۱,۰۳۱,۱۰۰ | ۸۰۱,۶۴۰ | ۵۳۳,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۴۰ | ۶۲۴,۲۰۰ | ۳۹۴,۷۴۰ |
| بررسی آکندروپلازی | #* | ۸۱۰۰۸۴ | ۶۵۵,۶۶۰ | - | ۲,۰۶۲,۲۰۰ | ۲,۰۶۲,۲۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۴۰۰ | ۱,۲۴۸,۴۰۰ |
| جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماریها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد) | #* | ۸۱۰۰۸۶ | ۸۱۷,۴۲۰ | - | ۲,۵۵۹,۴۰۰ | ۲,۵۵۹,۴۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۰ |
| سایر موارد گروه چهار (بررسی یک موتاسیون نقطه ای به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و یا بدون فرزند) | #* | ۸۱۰۰۸۸ | ۸۱۷,۴۲۰ | - | ۲,۵۵۹,۴۰۰ | ۲,۵۵۹,۴۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۰ |
| بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش | # | ۸۱۰۱۰۰ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک | # | ۸۱۰۱۰۲ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون | # | ۸۱۰۱۰۴ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X | # | ۸۱۰۱۰۶ | ۱,۰۵۵,۷۵۰ | ۷۳۸,۹۵۰ | ۳,۲۶۸,۵۰۰ | ۲,۵۲۹,۵۵۰ | ۱,۷۲۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۵۰ | ۲,۰۱۶,۵۰۰ | ۱,۲۷۷,۵۵۰ |
| بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع SCA | # | ۸۱۰۱۰۸ | ۸۷۶,۷۵۰ | ۶۱۳,۶۵۰ | ۲,۶۲۴,۵۰۰ | ۲,۰۱۰,۸۵۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۵۰ | ۱,۶۸۵,۵۰۰ | ۱,۰۷۱,۸۵۰ |
| بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند | #* | ۸۱۰۱۱۰ | ۱,۰۶۸,۶۸۰ | - | ۳,۳۷۸,۶۰۰ | ۳,۳۷۸,۶۰۰ | ۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۲,۷۰۰ | ۲,۰۳۲,۷۰۰ |
| بررسی Inversion۲۲ در هموفیلی A | # | ۸۱۰۱۱۲ | ۱,۲۴۳,۳۷۰ | ۸۷۰,۲۹۰ | ۳,۹۸۵,۹۰۰ | ۳,۱۱۵,۶۱۰ | ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۷۱۰ | ۲,۳۵۸,۳۰۰ | ۱,۴۸۸,۰۱۰ |
| بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۱۴ | ۶۲۱,۶۸۵ | ۴۳۵,۱۴۵ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۵ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۵۷۲,۳۵۵ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۷۴۴,۰۰۵ |
| بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۱۶ | ۶۲۱,۶۸۵ | ۴۳۵,۱۴۵ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۵ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۵۷۲,۳۵۵ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۷۴۴,۰۰۵ |
| پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۱۸ | ۶۲۱,۶۸۵ | ۴۳۵,۱۴۵ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۵ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۵۷۲,۳۵۵ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۷۴۴,۰۰۵ |
| پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۲۰ | ۶۲۱,۶۸۵ | ۴۳۵,۱۴۵ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۵ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۵۷۲,۳۵۵ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۷۴۴,۰۰۵ |
| الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۲۲ | ۶۲۱,۶۸۵ | ۴۳۵,۱۴۵ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۵ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۵۷۲,۳۵۵ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۷۴۴,۰۰۵ |
| الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۲۴ | ۶۲۱,۶۸۵ | ۴۳۵,۱۴۵ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۵ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۵۷۲,۳۵۵ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۷۴۴,۰۰۵ |
| فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند | #* | ۸۱۰۱۲۶ | ۶۲۱,۶۸۵ | - | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ |
| فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند | #* | ۸۱۰۱۲۸ | ۶۲۱,۶۸۵ | - | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۹۹۲,۹۵۰ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۷,۵۰۰ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ | ۱,۱۷۹,۱۵۰ |
| سایر موارد گروه ۵ (بررسی ۲ تا ۱۰ موتاسیون شایع در یک منطقه و یا شناسایی جهش های دینامیک) | #* | ۸۱۰۱۳۰ | ۱,۲۴۳,۳۷۰ | - | ۳,۹۸۵,۹۰۰ | ۳,۹۸۵,۹۰۰ | ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۲,۳۵۸,۳۰۰ | ۲,۳۵۸,۳۰۰ |
| بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | #* | ۸۱۰۱۴۰ | ۴۰۸,۷۱۰ | - | ۱,۲۷۹,۷۰۰ | ۱,۲۷۹,۷۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۷۷۸,۹۰۰ | ۷۷۸,۹۰۰ |
| بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | #* | ۸۱۰۱۴۲ | ۴۰۸,۷۱۰ | - | ۱,۲۷۹,۷۰۰ | ۱,۲۷۹,۷۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۷۷۸,۹۰۰ | ۷۷۸,۹۰۰ |
| سایر موارد گروه ۶ (بررسی یک اگزون با روش تعیین توالی) | #* | ۸۱۰۱۴۴ | ۸۱۷,۴۲۰ | - | ۲,۵۵۹,۴۰۰ | ۲,۵۵۹,۴۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۰ | ۱,۵۵۷,۸۰۰ |
| بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۵۰ | ۶۲۸,۴۸۰ | ۴۳۹,۹۰۰ | ۲,۰۰۶,۸۰۰ | ۱,۵۶۶,۹۰۰ | ۱,۰۱۹,۲۰۰ | ۵۷۹,۳۰۰ | ۱,۱۹۳,۰۰۰ | ۷۵۳,۱۰۰ |
| بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۵۲ | ۶۲۸,۴۸۰ | ۴۳۹,۹۰۰ | ۲,۰۰۶,۸۰۰ | ۱,۵۶۶,۹۰۰ | ۱,۰۱۹,۲۰۰ | ۵۷۹,۳۰۰ | ۱,۱۹۳,۰۰۰ | ۷۵۳,۱۰۰ |
| بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۵۴ | ۶۲۸,۴۸۰ | ۴۳۹,۹۰۰ | ۲,۰۰۶,۸۰۰ | ۱,۵۶۶,۹۰۰ | ۱,۰۱۹,۲۰۰ | ۵۷۹,۳۰۰ | ۱,۱۹۳,۰۰۰ | ۷۵۳,۱۰۰ |
| بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۵۶ | ۶۲۸,۴۸۰ | ۴۳۹,۹۰۰ | ۲,۰۰۶,۸۰۰ | ۱,۵۶۶,۹۰۰ | ۱,۰۱۹,۲۰۰ | ۵۷۹,۳۰۰ | ۱,۱۹۳,۰۰۰ | ۷۵۳,۱۰۰ |
| بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۵۸ | ۷۰۲,۵۶۵ | ۴۹۱,۷۵۵ | ۲,۲۴۱,۵۵۰ | ۱,۷۴۹,۷۹۵ | ۱,۱۳۹,۵۰۰ | ۶۴۷,۷۴۵ | ۱,۳۳۳,۸۵۰ | ۸۴۲,۰۹۵ |
| بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۱۶۰ | ۷۰۲,۵۶۵ | ۴۹۱,۷۵۵ | ۲,۲۴۱,۵۵۰ | ۱,۷۴۹,۷۹۵ | ۱,۱۳۹,۵۰۰ | ۶۴۷,۷۴۵ | ۱,۳۳۳,۸۵۰ | ۸۴۲,۰۹۵ |
| بررسی دوپلیکاسیون PMP۲۲ در شارکوت ماری توث | #* | ۸۱۰۱۶۲ | ۱,۴۰۵,۱۳۰ | - | ۴,۴۸۳,۱۰۰ | ۴,۴۸۳,۱۰۰ | ۲,۲۷۹,۰۰۰ | ۲,۲۷۹,۰۰۰ | ۲,۶۶۷,۷۰۰ | ۲,۶۶۷,۷۰۰ |
| بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel-Lindau | #* | ۸۱۰۱۶۴ | ۱,۹۹۷,۱۵۰ | - | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر موارد گروه ۷ (بررسی ۲ تا ۵ اگزون با روش تعیین توالی) | #* | ۸۱۰۱۶۶ | ۱,۹۹۷,۱۵۰ | - | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ |
| بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر | # | ۸۱۰۱۸۰ | ۲,۰۵۲,۱۷۰ | ۱,۴۳۶,۳۹۰ | ۶,۴۷۱,۹۰۰ | ۵,۰۳۵,۵۱۰ | ۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۶۱۰ | ۳,۹۰۵,۳۰۰ | ۲,۴۶۸,۹۱۰ |
| بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP۲۱A۲) | #* | ۸۱۰۱۸۲ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی B | # | ۸۱۰۱۸۴ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۴,۱۹۰,۱۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۵۶,۶۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۲,۱۵۵,۶۰۰ |
| بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH۳A۲ | #* | ۸۱۰۱۸۶ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | - | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ |
| بررسی بیماری کاناوان ژن ASPA | #* | ۸۱۰۱۸۸ | ۱,۹۹۷,۱۵۰ | - | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ |
| بررسی سندروم SLOS ژن DHCR۷ | #* | ۸۱۰۱۹۰ | ۱,۰۳۰,۹۰۰ | - | ۳,۴۹۷,۰۰۰ | ۳,۴۹۷,۰۰۰ | ۱,۶۵۴,۰۰۰ | ۱,۶۵۴,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ |
| بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS۱ | #* | ۸۱۰۱۹۲ | ۱,۹۹۷,۱۵۰ | - | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۶,۴۴۳,۵۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ | ۳,۷۸۳,۰۰۰ |
| نقص فاکتور ۷ انعقادی، بررسی کامل ژن F۷ | #* | ۸۱۰۱۹۴ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | - | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ |
| نقص فاکتور ۱۰ انعقادی، بررسی ژن F۱۰ | #* | ۸۱۰۱۹۶ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | - | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ |
| سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای GP۱BA، GP۱BB و G۹ | #* | ۸۱۰۱۹۸ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | - | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ |
| سایر موارد گروه ۸ (بررسی ۶ تا ۱۰ اگزون با تعیین توالی) | #* | ۸۱۰۲۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | - | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ |
| بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۲۲۰ | ۱,۲۵۶,۳۰۰ | ۸۷۹,۳۵۰ | ۴,۰۹۶,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۶۵۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۶۵۰ | ۲,۳۷۴,۵۰۰ | ۱,۴۹۵,۱۵۰ |
| بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند | # | ۸۱۰۲۲۲ | ۱,۲۵۶,۳۰۰ | ۸۷۹,۳۵۰ | ۴,۰۹۶,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۶۵۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۶۵۰ | ۲,۳۷۴,۵۰۰ | ۱,۴۹۵,۱۵۰ |
| استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها | #* | ۸۱۰۲۲۴ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | - | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ |
| بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی | #* | ۸۱۰۲۲۶ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن ADA | #* | ۸۱۰۲۲۸ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی نقص prothrombinemia کامل ژن F۲ | #* | ۸۱۰۲۳۰ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| نقص فاکتور ۵ انعقادی، بررسی کامل ژن F۵ | #* | ۸۱۰۲۳۲ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقص فاکتور ۱۱ انعقادی، بررسی ژن F۱۱ | #* | ۸۱۰۲۳۴ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی ژن BLM در سندم بلوم | #* | ۸۱۰۲۳۶ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی ژن CDH۱ در Hereditary Diffuse Gastric Cancer | #* | ۸۱۰۲۳۸ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی ژن TP۵۳ در سندرم Li-Fraumeni | #* | ۸۱۰۲۴۰ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی ژن WAS در سندرم ویسکوت آلدریچ | #* | ۸۱۰۲۴۲ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| سایر موارد گروه ۹ (بررسی ۱۱ تا ۲۵ اگزون) | #* | ۸۱۰۲۴۴ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن | #* | ۸۱۰۲۶۰ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن | # | ۸۱۰۲۶۲ | ۱,۷۷۵,۰۵۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۰۰ | ۴,۱۹۰,۱۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۵۶,۶۰۰ | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | ۲,۱۵۵,۶۰۰ |
| بررسی ژن RB۱ در رتینوبلاستوما | #* | ۸۱۰۲۶۴ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی ژن CLCN۷ در بیماری اسئوپتروز | #* | ۸۱۰۲۶۶ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون | #* | ۸۱۰۲۶۸ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| سایر موارد گروه ۱۰ (بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون) | #* | ۸۱۰۲۷۰ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی همزمان ژنهای BRCA۱ و BRCA۲ در سرطان پستان وراثتی | #* | ۸۱۰۲۸۰ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی بیش از ۵۰ اگزون با روش تعیین توالی | #* | ۸۱۰۲۸۲ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| بررسی ۱ تا ۲۰ ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS | #* | ۸۱۰۳۰۰ | ۸۲۳,۰۵۰ | - | ۲,۴۳۱,۳۰۰ | ۲,۴۳۱,۳۰۰ | ۱,۳۵۱,۸۰۰ | ۱,۳۵۱,۸۰۰ | ۱,۵۸۶,۲۰۰ | ۱,۵۸۶,۲۰۰ |
| بررسی ۲۱ تا ۵۰ ژن توسط روش های NGS | #* | ۸۱۰۳۰۲ | ۱,۰۹۷,۱۸۰ | - | ۳,۲۶۹,۲۰۰ | ۳,۲۶۹,۲۰۰ | ۱,۷۹۹,۶۰۰ | ۱,۷۹۹,۶۰۰ | ۲,۱۱۱,۱۰۰ | ۲,۱۱۱,۱۰۰ |
| بررسی ۵۱ تا ۲۰۰ ژن توسط روش های NGS | #* | ۸۱۰۳۰۴ | ۱,۴۰۲,۸۰۰ | - | ۴,۱۹۹,۲۰۰ | ۴,۱۹۹,۲۰۰ | ۲,۲۹۹,۲۰۰ | ۲,۲۹۹,۲۰۰ | ۲,۶۹۶,۸۰۰ | ۲,۶۹۶,۸۰۰ |
| بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم) | #* | ۸۱۰۳۰۶ | ۱,۶۶۷,۶۵۰ | - | ۵,۰۴۶,۱۰۰ | ۵,۰۴۶,۱۰۰ | ۲,۷۲۸,۶۰۰ | ۲,۷۲۸,۶۰۰ | ۳,۱۹۹,۴۰۰ | ۳,۱۹۹,۴۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای) | #*+ | ۸۱۰۳۰۸ | ۶۶۵,۶۰۰ | - | ۱,۹۷۰,۸۰۰ | ۱,۹۷۰,۸۰۰ | ۱,۰۹۲,۸۰۰ | ۱,۰۹۲,۸۰۰ | ۱,۲۸۲,۲۰۰ | ۱,۲۸۲,۲۰۰ |
| بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای) | #*+ | ۸۱۰۳۱۰ | ۴۲۲,۳۰۰ | - | ۱,۳۰۷,۴۰۰ | ۱,۳۰۷,۴۰۰ | ۶۸۸,۴۰۰ | ۶۸۸,۴۰۰ | ۸۰۶,۶۰۰ | ۸۰۶,۶۰۰ |
| کاریوتایپ خون با حد تفکیک ۴۰۰ الی ۴۵۰ | # | ۸۱۰۳۲۰ | ۲۹۶,۳۴۰ | ۲۰۷,۴۲۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۷۳۱,۵۸۰ | ۴۸۱,۲۰۰ | ۲۷۳,۷۸۰ | ۵۶۳,۴۰۰ | ۳۵۵,۹۸۰ |
| کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد) | # | ۸۱۰۳۲۲ | ۴۱۳,۰۲۰ | ۲۸۹,۰۹۰ | ۱,۳۱۶,۴۰۰ | ۱,۰۲۷,۳۱۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۹۱۰ | ۷۸۴,۳۰۰ | ۴۹۵,۲۱۰ |
| کاریوتایپ خون بند ناف | # | ۸۱۰۳۲۴ | ۴۱۳,۰۲۰ | ۲۸۹,۰۹۰ | ۱,۳۱۶,۴۰۰ | ۱,۰۲۷,۳۱۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۹۱۰ | ۷۸۴,۳۰۰ | ۴۹۵,۲۱۰ |
| کاریوتایپ مغز استخوان | # | ۸۱۰۳۲۶ | ۴۱۳,۰۲۰ | ۲۸۹,۰۹۰ | ۱,۳۱۶,۴۰۰ | ۱,۰۲۷,۳۱۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۹۱۰ | ۷۸۴,۳۰۰ | ۴۹۵,۲۱۰ |
| کاریوتایپ مایع آمنیون | # | ۸۱۰۳۲۸ | ۸۳۰,۳۵۰ | ۵۸۱,۲۰۰ | ۲,۶۶۹,۵۰۰ | ۲,۰۸۸,۳۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۷۶۳,۸۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰ | ۹۹۲,۸۰۰ |
| کاریوتایپ پرز جفتی | # | ۸۱۰۳۳۰ | ۷۹۸,۸۶۰ | ۵۵۹,۱۶۰ | ۲,۵۷۷,۴۰۰ | ۲,۰۱۸,۲۴۰ | ۱,۲۹۳,۲۰۰ | ۷۳۴,۰۴۰ | ۱,۵۱۳,۲۰۰ | ۹۵۴,۰۴۰ |
| کاریوتایپ فیبروبلاست های پوستی | # | ۸۱۰۳۳۲ | ۷۹۸,۸۶۰ | ۵۵۹,۱۶۰ | ۲,۵۷۷,۴۰۰ | ۲,۰۱۸,۲۴۰ | ۱,۲۹۳,۲۰۰ | ۷۳۴,۰۴۰ | ۱,۵۱۳,۲۰۰ | ۹۵۴,۰۴۰ |
| کاریوتایپ بافت های solid (توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده) | # | ۸۱۰۳۳۴ | ۷۹۸,۸۶۰ | ۵۵۹,۱۶۰ | ۲,۵۷۷,۴۰۰ | ۲,۰۱۸,۲۴۰ | ۱,۲۹۳,۲۰۰ | ۷۳۴,۰۴۰ | ۱,۵۱۳,۲۰۰ | ۹۵۴,۰۴۰ |
| کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی | # | ۸۱۰۳۳۶ | ۵۱۶,۷۷۰ | ۳۶۱,۷۰۰ | ۱,۵۸۳,۷۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۰۰ | ۸۴۳,۸۰۰ | ۴۸۲,۱۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰ | ۶۲۷,۳۰۰ |
| بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از ۲۰ سلول تا سقف ۱۰۰ سلول) | #+ | ۸۱۰۳۳۸ | ۱۵۸,۱۱۰ | ۱۱۰,۶۵۰ | ۳۷۸,۱۰۰ | ۲۶۷,۴۵۰ | ۲۶۷,۴۰۰ | ۱۵۶,۷۵۰ | ۳۱۵,۵۰۰ | ۲۰۴,۸۵۰ |
| روش های نواربندی اختصاصی غیر از G-band(شامل مواردی همانند C-band، R-Band، NOR-Band و Q-band این روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند) | #+ | ۸۱۰۳۴۰ | ۱۷۰,۳۸۰ | ۱۱۹,۲۶۰ | ۵۷۰,۶۰۰ | ۴۵۱,۳۴۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۱۵۴,۷۴۰ | ۳۲۰,۲۰۰ | ۲۰۰,۹۴۰ |
| بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب | # | ۸۱۰۳۴۲ | ۲۹۶,۳۴۰ | ۲۰۷,۴۲۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۷۳۱,۵۸۰ | ۴۸۱,۲۰۰ | ۲۷۳,۷۸۰ | ۵۶۳,۴۰۰ | ۳۵۵,۹۸۰ |
| بررسی Metaphase FISH به ازای هرپروب | # | ۸۱۰۳۴۴ | ۲۹۶,۳۴۰ | ۲۰۷,۴۲۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۷۳۱,۵۸۰ | ۴۸۱,۲۰۰ | ۲۷۳,۷۸۰ | ۵۶۳,۴۰۰ | ۳۵۵,۹۸۰ |
| تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین | # | ۸۱۰۳۴۶ | ۴۱۷,۳۳۰ | ۲۹۲,۱۱۰ | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | ۱,۰۶۰,۹۹۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۳۸۲,۸۹۰ | ۷۸۹,۷۰۰ | ۴۹۷,۵۹۰ |
| آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون | #* | ۸۱۰۳۴۸ | ۲۸۷,۰۶۰ | - | ۹۴۸,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۰۰ | ۴۶۲,۸۰۰ | ۴۶۲,۸۰۰ | ۵۴۱,۱۰۰ | ۵۴۱,۱۰۰ |
| کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه | #+ | ۸۱۰۳۶۰ | ۱۰۰,۹۳۵ | ۷۰,۶۵۰ | ۳۳۱,۳۵۰ | ۲۶۰,۷۰۰ | ۱۶۲,۹۰۰ | ۹۲,۲۵۰ | ۱۹۰,۵۰۰ | ۱۱۹,۸۵۰ |
| PGDتعیین جنسیت تا سقف ۴ جنین | #* | ۸۱۰۳۷۰ | ۲,۵۱۲,۶۰۰ | - | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۸,۱۹۲,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ |
| PGD تعیین جنسیت هر جنین اضافه | #*+ | ۸۱۰۳۷۲ | ۴۱۳,۰۲۰ | - | ۱,۳۱۶,۴۰۰ | ۱,۳۱۶,۴۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۳۰۰ | ۷۸۴,۳۰۰ |
| PGD برای بررسی ترانسلوکاسیون هر جنین حداکثر تا ۸ جنین | #* | ۸۱۰۳۷۴ | ۱,۲۵۶,۳۰۰ | - | ۴,۰۹۶,۰۰۰ | ۴,۰۹۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۴,۵۰۰ | ۲,۳۷۴,۵۰۰ |

| شرح کد | نوع | کدملی | تعرفه دولتی | سهم بیمه | تعرفه خصوصی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه عمومی غیر دولتی | سهم بیمار بیمه شده | تعرفه خیریه | سهم بیمار بیمه شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGD برای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تایید موتاسیون و بررسی خانوادگی موتاسیون، بررسی بیش از ۶ مارکر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غیره و گاهی بررسی هویت افراد و تفسیر | #* | ۸۱۰۳۷۶ | ۱,۰۵۲,۱۰۰ | - | ۳,۱۴۹,۴۰۰ | ۳,۱۴۹,۴۰۰ | ۱,۷۲۴,۴۰۰ | ۱,۷۲۴,۴۰۰ | ۲,۰۲۲,۶۰۰ | ۲,۰۲۲,۶۰۰ |
| مرحله دوم انجام PGD برای بیماری های مولکولی تا ۵ جنین | #* | ۸۱۰۳۷۸ | ۱,۰۵۲,۱۰۰ | - | ۳,۱۴۹,۴۰۰ | ۳,۱۴۹,۴۰۰ | ۱,۷۲۴,۴۰۰ | ۱,۷۲۴,۴۰۰ | ۲,۰۲۲,۶۰۰ | ۲,۰۲۲,۶۰۰ |
| PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنین اضافه | #*+ | ۸۱۰۳۸۰ | ۶۷۷,۸۷۰ | - | ۲,۱۶۳,۳۰۰ | ۲,۱۶۳,۳۰۰ | ۱,۰۹۹,۴۰۰ | ۱,۰۹۹,۴۰۰ | ۱,۲۸۶,۹۰۰ | ۱,۲۸۶,۹۰۰ |
| PGS با روش array، NGS و یا امثالهم به ازای هر جنین | #* | ۸۱۰۳۸۲ | ۳۹۵,۷۸۰ | - | ۱,۱۶۹,۶۰۰ | ۱,۱۶۹,۶۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۷۰۰ | ۷۶۲,۷۰۰ |
| بررسی CNV به روش NGS با قدرت تفکیک و عمق بالا | #*+ | ۸۱۰۳۸۴ | ۹۱۱,۲۳۰ | - | ۲,۹۱۸,۱۰۰ | ۲,۹۱۸,۱۰۰ | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۷۰۰ | ۱,۷۲۸,۷۰۰ |