جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

فرم تدوین راهنمای تجویز (دی متیل فومارات)

نام دارو	کاربرد خدمت	تجویزکننده صاحب صلاحیت	شرط تجویز		تواتر خدمتی	مدت زمان ارائه	اقدامات قبل از ارائه خدمت	توصیه ها و شرایط تجویز	ملاحظات
			اندیکاسیون	کنترا اندیکاسیون					
دی متیل فومارات	سرپایی	نورولوژیست	خط اول دارو یی در بیمار مبتلا به ام اس عود کننده بهبود یابنده (RRMS)	- حساسیت به دارو	کپسول خوراکی ۱۲۰ ، بنا به تجویز پزشک در ۲ هفته تا یک ماه اول سپس درمان کپسول ۲۴۰ میلیگرم، ۲ بار در روز	بر حسب دستور پزشک به صورت نامحدود تا زمان عدم اثر بخشی و تغییر خط درمان	۱- چک CBC و تستهای عملکرد کبدی ۲- تست بارداری	۲- دارو ابتدا با دوز ۱۲۰ میلی گرم دو بار در روز شروع سپس بتدریج تا دوز ۲۴۰ میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد. ۳- چک منظم CBC، تستهای عملکرد کبدی در فواصل هر ۳ ماه و تعیین سطح لنفوسیت	*RRMS : شایعترین تیپ بیماری ام اس ا ست که بر اساس یافته های بالینی و تفسیر نتایج MRI یا CSF توسط نورولوژیست تأیید می شود

- اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.