دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آموزش های پس از ترخیص در حاملگی مول(بچه خوره)

روز پس از کورتاژ می توانید حمام سرپائی داشته باشید.

توصیه های پزشک را جدی گرفته و به آن عمل نمائید.

نمونه خارج شده جهت بررسی پاتولوژیک(آزمایشگاهی) به آزمایشگاه ارسال شده است بعد از دو هفته با در دست داشتن برگ خلاصه پرونده که به هنگام ترخیص به شما داده می شود ، به آزمایشگاه مراجعه کرده و پس از اخذ جواب پاتولوژی به پزشک معالج مراجعه کنید.

تا سه هفته پس از عمل از نزدیکی خودداری کنید.

هر هفته یک بار BHCG را چک کرده و نتیجه را به پزشک اطلاع دهید.

در هر بار مراجعه به پزشک ،خلاصه پرونده و جواب آزمایش BHCG را به همراه داشته باشید.

در صورت وجود سرفه ، خلط خونی ،تنگی نفس ،خونریزی غیر طبیعی ،ترشح چرکی از واژن،درد شکم و اختلال حسی و حرکتی ، به پزشک معالج مراجعه کنید.

بعلت خطر سوراخ شدن رحم و خونریزی و عفونت تا زمانی که HCG به سطح طبیعی (صفر)خود برگردد IUD نباید کار گذاشته شود.

در هفته اول شروع مصرف قرص ضد بارداری از یک روش پشتیبان نیز استفاده کنید.

حداقل تا یک سال بارداری ممنوع است . زمان اقدام به حاملگی ،توسط پزشک به شما اعلام خواهد شد.

داروهای مصرفی منزل:

زمان و مکان مراجعه بعدی:

کمیته اموزش وپژوهش بیمارستان اموزشی - درمانی نهم دی –واحدآموزش به بیمار

تلفن پاسخگو :۱۹-۵۲۲۲۶۰۱۶ داخلی ۳۳۰

پاییز۹۶