جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

فرم تدوین راهنمای تجویز میتوکسانترون در بیماری ام اس

نام دارو	کاربرد خدمت	تجویزکننده صاحب صلاحیت	شرط تجویز		محل ارائه خدمت	تواتر خدمتی	مدت زمان ارائه	اقدامات قبل از ارائه خدمت	ملاحظات
			اندیکاسیون	کنترا اندیکاسیون					
میتوکسانترون	بستری	نورولوژیست	۱-خط سوم دارویی در بیمار مبتلا به ام اس عود کننده بهبود یابنده (RRMS) ۲-خط دوم درمانی در بیمار مبتلا به ام اس عود کننده بهبود یابنده aggressive ۳-ام اس پیشرونده ثانویه	۱-وجود مشکلات قلبی (بخصوص در موارد نار سایی مزمن قلبی ۲-وجود عفونت فعال ۳-وجود آسیب کبدی ۴-بیماری خونی همزمان	بیمارستان / درمانگاه	به صورت تزریقی هر سه ماه یکبار به میزان ۲۰ میلی گرم حداکثر در ۷دوز به مدت ۲ تا ۳ سال * بنابه صلاحدید پزشک ممکن است ماهانه نیز تزریق شود	حداکثر ۷ دوز	۱-چک CBC و تستهای عملکرد کبدی ۲-انجام اکوکاردیوگرافی قبل از هر بار تزریق	*RRMS : شایعترین تیپ بیماری ام اس است که بر اساس یافته های بالینی و تفسیر نتایج MRI یا CSF توسط نورولوژیست تأیید می شود *PRMS : نوعی از ام اس که بیماری به صورت پیشرونده شروع شده و در سیر بیماری از آغاز حملات عود مشاهده می شود .

- تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.